

# 2020 年护考押题卷

## 实践能力

本试卷共 120 小题，满分 120 分，考试用时 100 分钟。

注意事项：

1. 答卷前考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将字迹的姓名、准考证号、座位号填写在答题卡上和试卷上。

每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其他答案标号。答在试卷上答案无效。

一. 以下每一道考题下面有 A. B. C. D. E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

C. 呼吸困难

D. 声音嘶哑

E. 吞咽困难

1. 胎儿成熟度的判断最可靠的方法是（ ）

A. B 超检查

B. 推算胎儿体重

C. 胎儿身长

D. 检测雌三醇值

E. 测量宫高、腹围

4. 小儿肺炎合并心力衰竭的主要原因是（ ）

A. 代谢性酸中毒

B. 电解质紊乱

C. 弥散性血管内凝血

D. 肺动脉高压和中毒性心肌炎

E. 缺氧、二氧化碳潴留

2. 切口疝最主要的发病原因是（ ）

A. 应用皮质激素类药物

B. 切口感染

C. 切口裂开

D. 术后咳嗽、腹胀

E. 有其他合并症

5. 心绞痛发作时心电图的典型表现是（ ）

A. ST 段弓背抬高

B. ST 段压低，T 波低平

C. T 波高尖

D. PR 间期延长

E. 出现病理性 Q 波

3. 纤维蛋白性心包炎的主要症状是（ ）

A. 心悸

B. 心前区疼痛

6. 患者，女，27 岁，今晨突感上腹部疼痛，伴呕吐，怀疑急性胰腺炎，最有诊断意义的实验室指标是（ ）

A. 血清钙

B. 血清钾

- C. 血清淀粉酶  
D. 血清脂肪酶  
E. 尿淀粉酶
7. 一般人群降压目标血压水平为 ( ) A.  
收缩压 < 110mmHg, 舒张压 < 70mmHg  
B. 收缩压 < 120mmHg, 舒张压 < 80mmHg  
C. 收缩压 < 130mmHg, 舒张压 < 85mmHg  
D. 收缩压 < 130mmHg, 舒张压 < 80mmHg  
E. 收缩压 < 140mmHg, 舒张压 < 90mmHg
8. 腹股沟斜疝与直疝最主要的鉴别之处是 ( )  
A. 发病年龄  
B. 疝块形状  
C. 嵌顿程度  
D. 疝块位置  
E. 与腹壁下动脉的关系
9. 类风湿关节炎最常见的累及关节是 ( )  
A. 手足小关节  
B. 膝关节  
C. 颈椎关节  
D. 腕、踝、肘关节  
E. 腰椎关节
10. 白血病的发病原因不正确的是 ( )  
A. 药物、化学因素  
B. 病毒因素  
C. 物理因素  
D. 遗传因素  
E. 气候因素
11. 1 岁小儿, 体检示体格发育正常, 护士为其测得头围约是 ( )  
A. 5cm  
B. 44cm  
C. 46cm  
D. 49cm  
E. 50cm
12. 有关新生儿窒息的说法, 正确的是 ( )  
A. 胎儿娩出后 1 分钟内仅有心搏而无呼吸, 或未建立规律呼吸的缺氧状态  
B. 胎儿娩出后 5 分钟内仅有心搏而无呼吸, 或未建立规律呼吸的缺氧状态  
C. 根据出生后 5 分钟 Apgar 评分, 分为青紫和苍白窒息  
D. 轻度窒息, 心搏不规则  
E. 重度窒息, 皮肤为青紫色
13. 引起尿毒症贫血最重要的原因是 ( )  
A. 失血过多  
B. 肾产生红细胞生成素减少  
C. 毒素使红细胞寿命缩短  
D. 造血原料缺乏  
E. 代谢产物抑制骨髓造血
14. 便秘患者不适宜食用 ( )  
A. 燕麦  
B. 玉米

- C. 麦麸
- D. 蔬菜
- E. 浓茶

15. 患者，女性，脉率 118/min，呼吸 27/min，体温 37.5℃，血压 130/75mmHg，表情兴奋、烦躁易怒、双手震颤，眼球凸出，皮肤潮湿，可能为（ ）

- A. 发热
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 心功能不全
- D. 脑血管病
- E. 甲状腺功能减低

16. 患者，男性，72 岁，突然剧烈头痛、呕吐、迅即昏迷，为鉴别病人是脑出血或是蛛网膜下腔出血，可从哪项评估资料中确诊（ ）

- A. 体温高低
- B. 是否肢体瘫痪
- C. 脑脊液是否为血性
- D. 白细胞多少
- E. 是否颈强直

17. 患者，女性，53 岁。乳腺癌。患者的癌肿已经侵犯了 Cooper 韧带，护士查体可观察

到的症状是（ ）

- A. 橘皮样改变
- B. 乳头溢液
- C. 波动感
- D. 湿疹样改变
- E. 酒窝

18. 患者，女，左侧胸壁外伤后，出现了明显的呼吸困难，伴发绀。护士观察患者胸部伤口时，发现随呼吸运动伤口有气体进出的响声。该护士在现场抢救中首先应该（ ）

- A. 封闭伤口
- B. 胸腔穿刺抽气
- C. 取端坐位
- D. 开胸探查
- E. 呼救

19. 肝性脑病最早出现的临床表现是（ ）

- A. 定向力障碍
- B. 轻度性格和行为失常
- C. 睡眠障碍
- D. 意识丧失
- E. 昏睡

20. 患者，男性，56 岁，因三度房室传导阻滞入院治疗。入院查体发现心室率为 35 次/分。根据该患者病情，其根本的治疗方法是（ ）

- A. 安装心脏起搏器
- B. 行射频消融术
- C. 给予胺碘酮
- D. 给予阿托品
- E. 给予异丙肾上腺素

21. 患者，女性，65 岁，长期便秘，突发腹痛、腹胀 3 天，未吐，少量黏液便 1 次，未排气，1 年前曾有类似发作，查体可见全腹高度膨胀，右下腹可见巨大肠型并有轻度压痛、反跳痛，肠鸣音亢进。为明确诊断，该患者应做的检查是（ ）

- A. 磁共振
- B. 腹部立位 X 线平片
- C. 剖腹探查
- D. 直肠指诊
- E. CT

22. 皮质醇增多症的特征性表现是 ( )

- A. 肢端肥大
- B. 多汗
- C. 皮肤紫纹
- D. 向心性肥胖
- E. 眼球凸出

23. 患者，女性，43 岁，患胆石症 6 年，2 年前因腹痛、寒战，高热和黄疸发作，门诊用抗生素、输液治疗无效入院，来院时发现患者神志不清，血压 75/50mmHg，考虑 ( )

- A. 急性坏疽性胆囊炎
- B. 急性重症胆管炎
- C. 慢性胆囊炎急性发作
- D. 胆道蛔虫伴感染
- E. 胆囊穿孔

24. 患儿，女，6 岁，诊断为猩红热，则其临床表现中不可能出现的是 ( )

- A. 皮疹间皮肤正常
- B. 口周苍白圈
- C. 杨梅舌
- D. 帕氏线
- E. 脱皮后无色素沉着

关于不协调性宫缩乏力的正确处理是 ( )

- A. 肌内注射哌替啶
- B. 人工破膜
- C. 静滴缩宫素
- D. 针刺和谷三阴交
- E. 支持疗法

25. 急性胰腺炎患者，上腹部剧烈疼痛伴呕吐、发热。体检：上腹部压痛明显，伴反跳痛。此时的饮食应为 ( )

- A. 低脂、适量蛋白、易消化流质饮食
- B. 低盐、高蛋白、适量脂肪流质饮食
- C. 高糖、低脂流质饮食
- D. 高生物效价、低蛋白流质饮食
- E. 胃肠外静脉营养

26. 患者，女，58，因“食管-胃底静脉曲张破裂出血”入院。对该患者饮食护理不妥的是 ( )

- A. 大出血期间应禁食
- B. 止血后即可渐进高热量饮食、高蛋白
- C. 避免粗糙、坚硬食物
- D. 避免刺激性食物
- E. 应细嚼慢咽

27. 阴道分泌物呈大量泡沫状，灰黄色，质稀薄伴腥臭味，最可能为 ( )

- A. 老年性阴道炎
- B. 念珠菌性阴道炎
- C. 外阴炎
- D. 滴虫阴道炎

- E. 宫颈糜烂
- A. 胰腺炎患者禁用吗啡镇痛的原因是 ( )  
 A. 导致呼吸抑制  
 B. 导致炎症扩散  
 C. 容易成瘾  
 C. 有配伍禁忌  
 D.  
 E. 引起 Oddis 括约肌痉挛, 加重疼痛  
 F.  
 G.
- H. 患者, 男性, 30 岁, 经商, 因“反复发热, 伴消瘦、腹泻 1 个多月”入院。入院诊断为艾滋病。护士在护理这位患者过程中不慎被该患者使用过的注射器针头扎了一下, 以下处理措施中先应 ( )  
 I.  
 J. 不用处理  
 K.  
 L. 立即去检测 HIV 抗体  
 M.  
 N. 尽量挤出损伤处血液, 然后行伤口消毒  
 D. 上报医院, 等待医院处理  
 O. E. 立即检测患者的病毒载量  
 P.  
 Q.
- R. 患儿, 女, 6 岁, 因“流行性脑脊髓膜炎”入院。病程中出现面色苍白, 四肢厥冷, 发绀, 皮肤呈花斑状, 脉搏细速, 血压测不出, 下列处理措施中不恰当的是 ( )  
 S.  
 T. A. 立即给患者吸氧  
 B. 立即建静脉通路  
 C. 给患者保暖  
 U. D. 遵医嘱大量补液  
 E. 患者平卧位休息  
 V.  
 W.
- X. Charcot 三联征发生的顺序是 ( ) A. 黄疸、寒战高热、腹痛
- Y. B. 腹痛、寒战高热、黄疸  
 C. 寒战高热、黄疸、腹痛  
 D. 黄疸、腹痛、寒战高热  
 E. 腹痛、黄疸、寒战高热  
 Z.  
 AA.
- AB. 膀胱结石的典型症状是 ( ) A. 进行性排尿困难  
 AC. 膀胱刺激症状  
 AD.  
 AE. 排尿突然中断, 伴会阴部放射痛  
 D. 疼痛性血尿  
 AF. E. 会阴部下坠感  
 AG.  
 AH.
- AI. 患儿, 男性, 5 岁, 排尿时突然尿流中断, 哭喊疼痛, 家长抱起后症状消失。考虑可能的疾病 ( )  
 AJ.  
 AK. A. 肾结石 B. 肾盂结石  
 AL. C. 输尿管结石  
 D. 膀胱结石 E. 尿道结石
28. 王女士, 36 岁, 近几天感到外阴搔痒, 白带增多, 呈稀薄泡沫状且有腥臭味。应建议她到医院作 ( )  
 A. 阴道分泌物悬滴检查  
 B. 子宫颈刮征  
 C. 子宫颈管涂片  
 D. 阴道侧壁涂片  
 E. 阴道窥器
29. 某初妇, 29 岁, 现孕 22 周, 经检查确诊为妊娠合并风湿性心脏病、心功能 II 级。根

据该孕妇情况，为防止心力衰竭，妊娠期监测的时间应重点放在（ ）

- A. 22~24 周
- B. 25~26 周
- C. 27~28 周
- D. 29~31 周
- E. 32~34 周

30. 患儿，男，9 岁，以急性肾小球肾炎收住入院，经治疗患儿目前水肿消退，血压正常，肉眼血尿消失，现可允许患儿（ ）

- A. 卧床休息
- B. 下床轻微活动
- C. 下床正常活动
- D. 可上学，但免体育活动
- E. 恢复正常生活

31. 女，75 岁，外出买菜时跌倒后发生 Colles 骨折，护士在接诊时最可能看到其局部典型表现是（ ）

- A. 方肩畸形 B. 垂腕畸形 C. 爪形手畸形
- D. 杜加试验阳性
- E. “餐叉”样畸形

32. 患儿，3 岁，因结核性脑膜炎入院治疗。目前表现为精神呆滞、睡眠不安、双目凝视、喜哭、性格改变。该患儿正处于（ ）

- A. 脑膜刺激征期
- B. 昏迷期
- C. 前驱期

- D. 中期
- E. 晚期

40. 5 岁患儿因吃不洁食物后突起高热、抽搐、昏迷收入院，确诊为中毒性细菌性痢疾，则其护理要点不包括（ ）

- A. 观察生命体征
- B. 用药前做大便培养 C. 防止肛门和直肠脱垂 D. 记录大便次数、性状 E. 做好抢救的准备

41. 患者，女性，23 岁，右足癣合并感染 1 周，2 天前开始出现右小腿有片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，指压退色，松手后红色很快恢复，右腹股沟淋巴结肿大，该患者可能为（ ）

- A. 疖
- B. 痈 C. 丹毒
- D. 急性蜂窝织炎
- E. 急性管状淋巴管炎

42. 下列选项不符合足月儿外观特点的是（ ）

- A. 皮肤红润，胎毛少
- B. 足底光滑，纹理少
- C. 耳壳软骨发育好 D. 乳晕明显，有结节 E. 指甲长过指端

43. 新生儿出生后哭声微弱，全身青紫，呼吸浅表，肌张力低下。阿普加评分为 4 分，

诊断为新生儿窒息，即刻进行复苏抢救，经清理气道和增加通气均无效，准备胸外按压心脏，操作者双拇指或示、中指放置的正确按压部位是（ ）

- A. 胸骨体上 1/2
- B. 胸骨体上 1/3
- C. 胸骨体下 1/3
- D. 胸骨体下 1/4
- E. 剑突下

44. 患儿，女，6岁，诊断为猩红热，则其临床表现中不可能出现的是（ ）

- A. 皮疹间皮肤正常
- B. 口周苍白圈
- C. 杨梅舌
- D. 帕氏线
- E. 脱皮后无色素沉着

45. 患者，女性，68岁。1年前因车祸导致脑外伤，术后成为植物人状态，长期卧床、极度消瘦，现给予鼻饲和深静脉营养，患者最可能发生的问题是（ ）

- A. 压疮
- B. 口腔溃疡
- C. 便秘
- D. 坠积性肺炎 E.
- 泌尿系统感染

46. 有机磷中毒患者急诊入院，洗胃后使用阿托品治疗，护士观察到下列哪种情况不属于阿托品化（ ）

- A. 颜面潮红
- B. 皮肤干燥、口干

- C. 烦躁不安、抽搐
- D. 瞳孔较前缩小 E.

肺部啰音消失

47. 高渗性脱水早期的主要表现是（ ）

- A. 皮肤弹性差
- B. 乏力
- C. 烦躁
- D. 口渴
- E. 幻觉、谵妄

48. 男性，25岁，外伤后出现肘部关节肿胀，可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节后脱位的表现是（ ）

- A. 有无手臂功能障碍 B.
- 肘部是否有剧烈疼痛C.
- 是否可摸到尺骨鹰嘴D.
- 肘后三点是否正常
- E. 跌倒后是否因手掌撑地受伤

49. 乳腺癌的首发症状是（ ）

- A. 乳头凹陷
- B. 橘皮样改变
- C. 无痛性肿块
- D. 乳房弥漫性增生
- E. 两侧乳头位置不对称

50. 结肠癌最早出现的症状是（ ）

- A. 排便习惯及粪便性状改变
- B. 腹痛

- C. 腹部包块 D.  
肠梗阻症状  
E. 全身中毒症状
51. 葡萄胎预防性化疗的指征不包括 ( )  
A. 年龄 > 40 岁  
B. 葡萄胎清除后血 HCG 始终处于较高值  
C. 葡萄胎以小水泡为主  
D. 子宫明显大于停经月份  
E. 第二次清宫仍有滋养细胞高度增生
52. 关于老年性阴道炎错误的说法是 ( )  
A. 阴道上皮变薄, 糖原含量减少  
B. 常为一般化脓性细菌的混合感染  
C. 可用碱性溶液冲洗阴道  
D. 可加用己烯雌酚局部治疗  
E. 如有血性白带, 需做防癌检查
53. 患者, 女性, 30 岁, 急性腹痛。在急诊留观期间, 应尤为注意观察的腹部体征是 ( )  
A. 肠鸣音变化  
B. 腹膜刺激征的产生 C.  
腹式呼吸运动的大小D.  
是否有腹部包块  
E. 肝浊音界的大小
54. 由门静脉高压引起的肛门疾病是 ( )  
A. 肛裂  
B. 肛瘘  
C. 痔  
D. 直肠肛管周围脓肿  
E. 直肠癌
55. 护士对门腔分流术 2 天内患者, 应注意观察的并发症是 ( )  
A. 血管吻合口破裂出血  
B. 肝性脑病  
C. 血小板计数降低  
D. 门静脉血栓形成  
E. 白细胞计数增高
56. 患者, 女性, 59 岁。患胃溃疡 15 年, 平素常有进食后剑突下烧灼样疼痛, 近 2 日疼痛持久, 失去节律性。其可能的原因是 ( )  
A. 劳累  
B. 受凉  
C. 合并有十二指肠溃疡  
D. 出血  
E. 癌变
57. 初孕妇, 32 岁, 妊娠 39 周。妊娠中期产前检查未见异常。妊娠 38 周开始自觉头痛、眼花。查血压 160/110mmHg, 24 小时尿蛋白 2.5g, 宫缩不规律, 胎心 134 次/分。此时应先采取的措施是 ( )  
A. 终止妊娠  
B. 静脉滴注硫酸镁  
C. 鼓励适度活动  
D. 人工破膜并静脉滴注缩宫素  
E. 急诊剖宫产



58. 患者，女性，35 岁。主诉白带呈乳白色，量增多。初步诊断为慢性宫颈炎，治疗前需排除的情况是（ ）

- A. 尿路感染 B. 子宫内膜癌
- C. 真菌性阴道炎
- D. 早期宫颈癌 E. 淋病

59. 男孩，6 岁，发热 4 天，双侧腮腺以耳垂为中心肿大 2 天。体检：体温 38.5℃，神志清楚，双侧腮腺 3cm×4cm，有压痛，咽红，腮腺管口有红肿，心、肺无异常，诊断为流行性腮腺炎。该病不常见的并发症是（ ）

- A. 脑膜脑炎
- B. 心肌炎 C. 胰腺炎 D. 卵巢炎 E. 睾丸炎

60. 苯巴比妥钠作为局部麻醉前用药，主要是因为（ ）

- A. 有镇静作用
- B. 减少局麻药用量
- C. 提高痛阈
- D. 能抑制平滑肌痉挛
- E. 能预防局麻药中毒反应

61. 患者，女性，33 岁，育有一子，既往月经正常。近半年经常转换工作地点，发生“闭经”。护士分析其最可能的原因为（ ）

- A. 宫颈炎
- B. 卵巢性

C. 垂体性 D.

下丘脑性

E. 子宫内膜异位

62. 患儿，8 岁，因“高热 3 天，昏迷、抽搐 1 天”于 8 月 3 日入院。查体：体温 39.8℃，脉搏 120 次/分，双侧瞳孔不等大，对光反射迟钝，颈强直（+）。下列做法中错误的是（ ）

A. 乙醇擦浴 B.

冰帽降温 C.

亚冬眠疗法

D. 0%甘露醇静脉推注

E. 立即行腰椎穿刺，进行脑脊液的相关检查

63. 由门静脉高压引起的肛门疾病是（ ）

A. 肛裂

B. 肛痿

C. 痔

D. 直肠肛管周围脓肿

E. 直肠癌

64. 护士对门腔分流术 2 天内的患者，应注意观察的并发症是（ ）

A. 血管吻合口破裂出血

B. 肝性脑病

C. 血小板计数降低

D. 门静脉血栓形成

E. 白细胞计数增高

65. 关于化脓性脑膜炎的脑积液检查结果，下列哪一项不会出现（ ）

- A. 压力升高
- B. 糖及氯化物含量升高
- C. 白细胞数明显升高
- D. 蛋白含量升高，糖含量降低
- E.

涂片革兰染色可以查到致病菌

66. 患者，男，20岁，脑损伤患者，该患者病情观察项目中最重要的是（ ）

- A. 意识
- B. 出血量
- C. 生命体征
- D. 肢体活动
- E. 瞳孔

67. 患者，男，60岁，诊断为原发性肝癌，行肝叶切除术后第3天，出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等，应考虑（ ）

- A. 胆汁性腹膜炎
- B. 膈下脓肿
- C. 肝性脑病
- D. 内出血
- E. 休克

68. 患者，男，68岁，因上腹部饱胀不适3个月就诊，诊断为胰腺癌，该患者出现腹痛、腹胀的原因是（ ）

- A. 消化不良
- B. 胰胆管梗阻
- C. 癌肿浸润腹膜
- D. 癌肿浸润神经丛

E. 肠管梗阻

69. 患者，男，28岁，左侧胸廓隆起，叩诊呈鼓音，语颤消失，呼吸音消失，气管移向右侧，可能是（ ）

- A. 左侧胸腔积液
- B. 肺气肿
- C. 气胸
- D. 支气管扩张
- E. 胸膜炎

70. 患者，男性，43岁，3次不同的门诊时间，测得其血压142~150/92~96mmHg。预约患者下次门诊的时间应在（ ）

- A. 2周后
- B. 1个月内
- C. 1周后
- D. 6个月内
- E. 1年后

71. 患者，女性，静脉补液后，护士为其测中心静脉压13.5cmH<sub>2</sub>O，血压正常，尿量每小时11ml，尿比重低于1.010，根据数据结果该护士应考虑患者出现（ ）

- A. 肺水肿
- B. 弥散性血管内凝血
- C. 酸中毒
- D. 肾功能不全
- E. 血容量过多

72. 患儿女，1岁。细菌性肺炎入院，目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱：吸氧。适宜该患儿的吸氧方式为（ ）

- A. 单侧鼻导管法
- B. 面罩法
- C. 鼻塞法
- D. 漏斗法
- E. 头罩法

73. 患者，男，32岁，反复间歇性上腹痛2年，诊断为十二指肠球部溃疡。缓解腹痛措施正确的是（ ）

- A. 睡前加餐
- B. 腹部热敷
- C. 取平卧体位
- D. 服用镇痛药物
- E. 尽早手术治疗

74. 流产胎儿约1000g，身长约35cm，护士估计孕周（ ）

- A. 12周
- B. 18周
- C. 24周
- D. 28周
- E. 32周

74. 答案：D

75. 患者，女性，54岁。近半年来上腹部疼痛，尤以空腹和夜间为重，进食可缓解。可明确诊断的检查是（ ）

- A. 肝、胆、脾超声
- B. 胃、肠钡剂检查
- C. 纤维胃镜检查
- D. 肝、胆、脾CT
- E. 腹部X线平片

76. 患者，女性，27岁。因寒战、高热、咳嗽、胸痛入急诊。胸部X线显示左上肺有云絮状阴影，查痰肺炎球菌（+），护士为其抽血检查的血象的结果可能是（ ）

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 淋巴细胞减少
- C. 中性粒细胞增加
- D. 单核细胞增加
- E. 嗜碱性粒细胞增加

77. 患者，男性，55岁，因心力衰竭收住入院，采用地高辛治疗。护士查房时，患者主诉食欲明显减退、视物模糊，护士测心率50次/分，心律不齐，上述症状最可能的原因是（ ）

- A. 心力衰竭加重
- B. 颅内压增高
- C. 心源性休克
- D. 低钾血症
- E. 洋地黄中毒

78. 患者，男性，52岁。吸烟25年，全麻下行直肠癌根治术后，已拔除气管插管，患者意识未完全恢复，护士目前采取的最重要的护理措施是（ ）

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 防坠床
- C. 观察神志的变化
- D. 密切观察生命体征的变化
- E. 保暖

79. 患者，男性，21岁。用燃气热水器淋浴时出现头痛，头晕，无力、胸闷，心悸、恶

心等症状。现场护士首要的抢救措施是（ ）

- A. 穿上衣物，注意保暖
- B. 卧床休息
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 吸氧
- E. 立即将患者搬离至空气新鲜处

80. 患儿，男，10岁。因急性肾小球肾炎收住院。病情较重，查体眼睑水肿，阵发性喘憋，呼吸困难，不能平卧，咳泡沫痰，尿量减少。估计患儿可能出现的并发症是（ ）

- A. 高血压脑病
- B. 急性肾衰竭
- C. 急性胸膜炎
- D. 气胸
- E. 严重循环充血

81. 急性炎症性脱髓鞘性神经炎患者特有的检查结果是（ ）

- A. 白细胞增多
- B. 脑脊液压力增高
- C. 脑脊液浑浊
- D. 脑脊液蛋白、细胞分离现象
- E. 血清免疫球蛋白下降

82. 患者，女，24岁，诊断为急性白血病，在化疗期间发生尿酸性结石，护士判断其排尿情况为（ ）

- A. 肉眼血尿
- B. 蛋白尿
- C. 少尿或无尿
- D. 酱油色尿

E. 镜下血尿

83. 患儿生后4天，反应差，哭声低，小腿及大腿出现硬肿，测体温33℃，腋-肛温差为正值，暖箱温度应调节预热到（ ）

- A. 25℃
- B. 28℃
- C. 30℃
- D. 35℃
- E. 38℃

84. 男性，47岁，从高处坠落后导致腹部闭合性损伤，疑有小肠破裂，在病情观察期间提示患者病情恶化需要手术的情况是（ ）

- A. 肠道出血停止
- B. 全身情况无恶化趋势
- C. 腹痛和腹膜刺激征进行性加重
- D. 肠鸣音正常，无减弱或消失
- E. 经积极抗休克治疗情况好转

85. 7岁女童，不慎跌倒后出现右侧肱骨髁上骨折，肘部肿胀严重，复位前需要先进行尺骨鹰嘴骨牵引，护理措施中正确的是（ ）

- A. 每天测量右臂长度
- B. 牵引重量可自行调节
- C. 牵引针滑移后直接推回原位
- D. 定期取下牵引锤放松右臂
- E. 去除针孔处的血痂

86. 某孕妇，孕38周，诊断为慢性羊水过多，下列说法不正确的是（ ）

- A. 多发生在妊娠中期

- B. 症状多较轻
- C. 查体孕子宫大于正常妊娠月份 D. 易并发胎位异常、胎膜早破和早产
- E. 产后可因子宫过大引起宫缩乏力而致产后出血
87. 患者，男，54岁，拟行直肠癌根治术，能否保留肛门取决于（ ）
- A. 肿瘤的大小
- B. 肿瘤距肛门的距离 C. 肿瘤局部侵犯的程度D. 肿瘤是否有远处转移E. 左半结肠长度
88. 患儿，男，5个月，发热、咳嗽4天以肺炎收住院，入院当晚出现呼吸加快，口唇发绀，医嘱予鼻导管给氧，其氧流量和氧浓度的选择是（ ）
- A. 氧流量 1L/min，氧浓度 <40%
- B. 氧流量 2~4L/min，氧浓度 <50%
- C. 氧流量 5~6L/min，氧浓度 <60%
- D. 氧流量 7~8L/min，氧浓度 <70%
- E. 氧流量 9~10L/min，氧浓度 <80%
89. 符合恶性肿瘤特点的描述是（ ）
- A. 细胞分化程度高
- B. 与周围组织无粘连
- C. 有完整包膜
- D. 边界清楚
- E. 瘤细胞呈异型或幼稚型
90. 患者，女，38岁。因车祸引起右胸部损伤，现场护士观察其出现极度呼吸困难，发绀，呼吸音消失，并有严重的皮下气肿，判断为张力性气胸，该护士应立即（ ）
- A. 包扎止血
- B. 胸腔闭式引流
- C. 输血
- D. 气管插管
- E. 胸腔穿刺排气
91. 新生儿，15天。拒乳，发热4天，皮肤黄染退而复现2天。精神萎靡，嗜睡，脐窝有少许脓性分泌物，诊断为败血症。护士应为患儿首先采取的护理措施是（ ）
- A. 清除脐部感染灶
- B. 少量多次喂水 C. 静脉营养支持 D. 物理降温
- E. 应用抗生素
92. 患者，男，52岁。吸烟25年，全麻下行直肠癌根治术后，已拔除气管插管，患者意识未完全恢复，护士目前采取的最重要的护理措施是（ ）
- A. 保持呼吸道通畅
- B. 防坠床
- C. 观察神志的变化
- D. 密切观察生命体征的变化
- E. 保暖
93. 患者，男，18岁。慢性肾炎。入院评估：患者小学文化，踝部水肿明显，尿蛋白（+）。经治疗患者症状消失拟于明日出院。下列提示护理措施存在缺陷的是（ ）
- A. 全身未见水肿

- B. 未发现感染等并发症
- C. 能说出药物的作用及不良反应
- D. 能说出自我护理方法
- E. 打算出院后长期低盐饮食
94. 患儿，13 个月。腹泻、呕吐，诊断为重型婴儿腹泻。补液 8 小时后排尿，但患儿精神萎靡心音低钝、四肢无力、腹胀、肠鸣音减弱。考虑该患儿可能并发（ ）
- A. 碱中毒
- B. 高血钠
- C. 低血 D.
- 高血钙E.
- 低血镁
95. 患者，女，29 岁，未婚。近期由于工作劳累紧张，心悸、多汗 2 个月余。查体：甲状腺 II 度肿大，有血管杂音，心率 130 次/分，FT3、FT4 升高，TSH 显著降低，首选治疗方案为（ ）
- A. 甲巯咪唑（他巴唑）+ 普萘洛尔
- B. 甲巯咪唑（他巴唑）
- C. 普萘洛尔
- D. 放射性碘治疗
- E. 甲状腺次全切除术
96. 患者，男性，52 岁。肝硬化，呕血后出现嗜睡及扑翼样震颤。为清除肠道积血给予灌肠。护士准备灌肠液时，要注意禁忌使用（ ）
- A. 4℃生理盐水
- B. “1，2，3”溶液
- C. 肥皂水
- D. 蛋清水
- E. 1%新霉素溶液
97. 某 4 岁男孩，婴儿期开始发现发绀，逐渐加重，有昏厥及抽搐史。查体：胸骨左缘第 3 肋间有 II 级收缩期杂音，有杵状指。最可能的诊断是（ ）
- A. 房间隔缺损 B.
- 室间隔缺损 C.
- 动脉导管未闭D.
- 法洛四联症 E.
- 肺动脉狭窄
98. 女性，58 岁，不慎从楼梯上跌落后发生左侧第 5、6、7 肋骨多处骨折，其呼吸时患处可能出现（ ）
- A. 呼气时外凸、吸气时正常
- B. 吸气和呼气时均外凸
- C. 吸气时外凸、呼气时内陷
- D. 吸气和呼气时均内陷
- E. 吸气时内陷、呼气时外凸
99. 类风湿关节炎患者后期可能出现的特征性体征是（ ）
- A. 腕关节固定在屈位
- B. 关节隆凸处出现类风湿结节
- C. 远端指间关节处皮下小结 D.
- 手指尺侧偏斜畸形
- E. 脊柱强直
100. 男性，25 岁，外伤后出现肘部关节肿胀，可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节后脱位的表现是（ ）
- A. 有无手臂功能障碍

- B. 肘部是否有剧烈疼痛
- C. 是否可摸到尺骨鹰嘴
- D. 肘后三点是否失去正常关系
- E. 跌倒后是否因手掌撑地受伤

- A. 血管痉挛，以功能性病变为主
- B. 血栓形成，部分堵塞血管
- C. 血管闭塞，侧支循环补充血供
- D. 血管完全闭塞，侧支循环不能满足肢体需要
- E. 血管壁和血管周围广泛纤维化

**二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。**

**(101~102 题共用题干)**

患者，女性，55 岁。糖尿病 10 年。今因糖尿病酮症酸中毒、脑血栓、半身不遂、尿失禁而入院。

101. 患者尿液的气味是 ( )

- A. 腥臭味
- B. 氨臭味 C.
- 烂苹果味 D.
- 腥甜味 E.
- 酸臭味

102. 患者每日尿量可达到 ( )

- A. 500ml 以上
- B. 1000ml 以上
- C. 1500ml 以上
- D. 2500ml 以上
- E. 5000ml 以上

**(103~104 题共用题干)**

患者，男性，38 岁，患血栓闭塞性脉管炎，处于局部缺血期。

103. 此期的病因是 ( )

104. 此期的典型表现是 ( )

- A. 静息痛
- B. 间歇性跛行 C.
- 屈膝抱足而坐
- D. 患肢胫后和足背动脉搏动消失
- E. 肢体远端形成经久不愈的溃疡

**(105~107 题共用题干)**

患者，女性，55 岁。疑为结肠癌，为进一步检查治疗入院。

105. 患者若为右半结肠癌，其临床表现除外 ( )

- A. 右腹隐痛，间歇痛逐渐转为持续痛 B.
- 腹泻与便秘交替出现，隐血试验阳性 C.
- 右腹部肿块
- D. 有消瘦、低热、乏力等全身症状 E.
- 腹泻以进食后加重，排便后减轻

106. 患者拟行结肠癌根治术，术前准备措施应除外 ( )

- A. 补充高蛋白、高热量、富维生素食物 B.
- 术前 2~3 日给予流质饮食
- C. 术前 2~3 日给予口服缓泻药
- D. 术前 2~3 日口服平衡电解质液全肠道灌洗

E. 术前 1 日下午口服 5%~10%甘露醇

107. 患者手术后的饮食治疗原则为 ( )

- A. 高脂、高热量、富纤维饮食
- B. 低脂、高糖、低渣饮食
- C. 低蛋白、高脂、富纤维饮食
- D. 高脂、高蛋白、高维生素饮食
- E. 低蛋白、低糖、无渣饮食

(108~110 题共用题干)

患者，女性，76 岁，因急性广泛前壁心肌梗死急诊入院，入院后经扩冠抗凝治疗，目前胸痛缓解，病情已平稳，1 小时前患者突感心悸，气短，不能平卧，咳粉红色泡沫痰。查体：血压 90/60mmHg，呼吸 28 次/分，神清，坐位口唇发绀，两肺满布湿啰音及哮鸣音。

108. 护士应给予患者的吸氧方法是 ( )

- A. 持续低流量吸氧
- B. 间断低流量吸氧
- C. 高流量吸氧
- D. 低流量 50%乙醇湿化吸氧
- E. 高流量 50%乙醇湿化吸氧

109. 应用洋地黄治疗期间，护理措施不妥的是 ( )

- A. 嘱患者按时服药
- B. 如果漏服药物，需要及时补服
- C. 嘱患者低盐饮食
- D. 给药前数患者的心率
- E. 观察心电图变化和血药浓度

该患者目前心功能为IV级，其休息方式应该是 ( )

- A. 活动没有任何限制
- B. 避免重体力活动
- C. 充分休息，增加睡眠时间
- D. 卧床休息为主，允许慢慢下床进行排尿、排便活动
- E. 绝对卧床休息

(111~112 题共用题干)

患者，男性，48 岁，反复反酸、嗝气 5 年。每次餐后中、上腹胀痛，持续 1~2 小时。近日，上腹部持续胀痛较以往严重。

110. 护士发现患者呕吐宿食，考虑其出现的并发症可能是 ( )

- A. 低钾血症
- B. 代谢性酸中毒
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 穿孔

111. 今晨，患者突然出现面色苍白、大汗淋漓、四肢厥冷、烦躁不安，测血压为 78/44mmHg (10.4/5.8kPa) 此时，护士考虑最支持诊断的粪便性状是 ( )

- A. 黏液便
- B. 脓血便
- C. 稀便
- D. 脂肪泻
- E. 柏油便

患儿，男，10 个月，平时发育营养正常，人工喂养。3 天来腹泻，大便每天 20 次，蛋花汤样，伴低热偶有呕吐，1 天来尿少，6 小时来无尿。查体：精神萎靡，口干，眼窝及前囟凹陷，皮肤弹性差，四肢凉，血压 64/40mmHg，血清钠 134mmol/L，血钾 3.3mmol/L。



112. 该患儿的临床诊断是 ( )

- A. 婴幼儿腹泻
- B. 婴幼儿腹泻、低钾血症
- C. 婴幼儿腹泻、高钾血症
- D. 消化不良轻型
- E. 消化不良重型

113. 对该患儿的治疗中, 不正确的是 ( )

- A. 调整饮食
- B. 控制肠道内、外感染
- C. 尽早使用止泻药
- D. 纠正水和电解质紊乱
- E. 加强护理, 防止臀红

(115~117 题共用题干)

患者, 男性, 38 岁, 患血栓闭塞性脉管炎, 处于局部缺血期。

114. 此期的病因是 ( )

- A. 血管痉挛, 以功能性病变为主
- B. 血栓形成, 部分堵塞血管
- C. 血管闭塞, 侧支循环补充血供
- D. 血管完全闭塞, 侧支循环不能满足肢体需要
- E. 血管壁和血管周围广泛纤维化

115. 此期的典型表现是 ( )

- A. 静息痛
- B. 间歇性跛行 C. 屈膝抱足而坐
- D. 患肢胫后和足背动脉搏动消失
- E. 肢体远端形成经久不愈的溃疡

116. 护士对患者日常生活中的健康指导内容正确的是 ( )

- A. 少吸烟
- B. 减少体位改变, 尽量维持同一姿势
- C. 坚持勃格运动
- D. 出现溃疡或坏疽时应增加患肢活动量E. 患肢疼痛时可任意服用止痛药

(118~120 题共用题干)

患者, 女性, 26 岁。慢性风湿性心脏病, 联合瓣膜病。患者自幼好发扁桃体炎, 5 年前于劳动时出现呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰并双下肢水肿。

117. 护士向患者解释双下肢水肿的原因是 ( )

- A. 左心衰竭
- B. 全心衰竭
- C. 呼吸衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 下肢静脉栓塞

118. 心尖区可听到舒张期杂音, 其病变是 ( )

- A. 肺动脉高压
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 三尖瓣狭窄

D. 二尖瓣关闭不全

E. 二尖瓣狭窄

119. 查体：水冲脉、毛细血管搏动征阳性。  
分析其原因是（ ）

A. 脉压增大 B.

肺动脉高压C.

病毒感染 D.

大循环淤血E.

呼吸衰竭

