

专业实务一

1. 某护士值班结束，书写交班报告时应先写**先出，后入，在手术**，eg:八床，患者贾，上午九时转入呼吸科
2. 护士准备用 5%苯扎溴铵加蒸馏水配消毒皮肤用溶液，所用的 10ml 苯扎溴铵加蒸馏水的量为 **490ml 苯扎溴铵消毒皮肤的浓度是 0.1%，因此 $5\% \times 10 \div 0.1\% = 10$**
- 3、下列那些方法可以预防新冠病毒感染 **75%酒精**
- 4、单纯性疱疹病毒性脑炎首选的治疗药物**阿昔洛韦**
- 5、插管操作结束后，为证实胃管在胃里，**1、将胃管末端接入无菌注射器回抽可抽出胃液 2、将导管末端放入盛有水的碗中，无气泡溢出，如有大量气泡证明误入气管 3、将听诊器放在病人胃部，用无菌注射器注入 10ml 空气，听到有气过水声**
- 6、中华人民共和国献血法规定，我国现行献血制度 **无偿献血制度**
- 7、扩血管作用的药物 **硝普纳**：速效和短时作用的血管扩张药用于降血压 **硝酸甘油**：用于心绞痛 **尼莫地平**：急性脑血管病恢复期血液的循环改善，缺血性神经元保护性和血管性痴呆，突发性耳聋 **利多卡因**：临床局麻急性心肌梗死，各种心脏病，快速性心律失常 **酚妥拉明**：作用温和，维持时间短暂，用于血管痉挛性疾病
- 8、行 12 导联心电图检查，其中 **V1 导联电极的安放位置为胸骨右侧第四肋**
- 9、以工作为中心进行岗位分工称为**功能制护理**
- 10、幽门梗阻患者洗胃通常于 **饭后 4-6 小时**
- 11、可使人体产生对结核菌获得免疫力的预防措施是 **进行卡介苗接种**
- 12、下列感知觉障碍中对精神分裂症的诊断最有价值的是 **言语性幻听**
- 13、乙型脑炎患者常见的护理问题 **气体交换受损、意识障碍、体温过高、有受伤的危险**
- 14、肝硬化内分泌失调时可导致 **色素沉着**：发生在面部，患者的手掌纹里和皮肤褶皱处也有色素沉着
- 15、SLE 典型表现是 **蝴蝶斑**
- 16、中药的四气 **寒热温凉**
- 17、风热感冒犯肺的是**辛凉解表** 症状：发热，咽喉痛，咳嗽有痰
- 18、急性枕骨大孔疝应采取的措施是 **快速输入脱水药**，原因是会导致颅内压增高，常见药物**甘露醇**
- 19、子宫脱水的病因主要为 **分娩损伤**，其他包括：产褥期过早体力劳动，腹压长期过高，盆地组织退行性变或发育不良
- 20、允许在医疗机构从事规范护理活动的人员是 **取得职业资格证书三年后、出国留学一年再次返回原医院的护士**
- 21、中医四诊 **望闻问切**
- 22、抑郁症患者最长伴随的躯体症状之一是 **睡眠紊乱**
- 23、昏迷患者用热时温度不可过高的原因是 **患者对热的敏感性差**
- 24、呼吸衰竭患者出现那种情况可以考虑使用呼吸兴奋剂 **吸氧后呼吸明显受到抑制，通气量不足时**
- 25、腹部手术后病人采取的卧位是 **床头抬高 30-50**
- 26、患者男 70 岁因 ARDS（集体处于高代谢状态应补充足够的营养）入住 ICU，在治疗过程中应给予静脉营养 **拔管后鼓励患者咳嗽咳痰，拔管后半坐卧位，不宜尽早恢复胃肠功能**
- 27、患者男 10 个月应发热咳嗽 3 天，诊断支气管炎入院，患儿突然烦躁哭闹不安，呼吸 62 次/分，心率 182 次/分，心音低顿，肝肋下 3.5cm 出现上述表现主要由于**肺动脉高压和中毒性心肌炎**，小儿肺炎合并心力衰竭

- 28、因胆囊结石行 B 超检查，检查前一晚宜进食的食物是 **清汤面**(午餐进行高脂肪饮食，晚餐进入无脂肪低蛋白清淡饮食)
- 29、患者女 20 岁，大学生，重感冒 2 周后出现胸闷心悸乏力症状，查体心率 102 次/分，血压高蛋白增高，诊断为病毒性心肌炎入院治疗，患者紧张焦虑，为缓解其情绪，护士应告知 **患者症状消失，血液学指标恢复正常后可增加活动量**
- 30、急诊是负责预检分诊，突然接到接诊十余位患者均有恶心呕吐腹泻腹痛的症状，该护士 **应立即通知护士长和医务部门**
- 31、患者男 53 岁，诊断为大量心包积液，治疗：给予安置心包引流管，心包积液引流量小于 25ml/d，可以考虑拔出心包引流管，若患者出现血压下降、心率增快应警惕患者发生心包填塞，保持心包引流管通畅避免折叠，引流袋要低于心包穿刺点，避免反流，第一次引流心包积液不宜超过 300ml
- 32、患者男 2 岁，肺炎治愈后返家，其母亲认真观察该患儿的精神状态，鼓励其多喝水，协助咳嗽，此时母亲的角色 **患儿治疗护理的参与者**
- 33、患儿 10 个月，晨起打喷嚏，午后发热，突然抽搐持续 5 分钟，入院后诊断为热性惊厥，首选抗惊厥药 **地西泮**
- 34、初产妇 33 岁，妊娠 38 周，正常阴道分娩，第二产程时宫缩频繁疼痛难忍应给予 **产妇安慰及鼓励，提供产程进展信息，给予喂水擦汗缓解其心理紧张，指导正确使用腹压**
- 35、患儿 4 岁，住院后出现尿床，吮允手指，这种表现属于 **退化性行为**
- 36、患者男 65 岁胃癌，行为胃大部分切除术，术中生命体征正常，术后回病房，应给予 **一级护理**
- 37、患者 16 岁，支气管扩张最常见的病因 **婴幼儿麻疹和支气管肺炎**
- 38、患者男 51 岁饮酒后突然疼痛，呕吐、意识障碍、颜面潮红、查体脉搏慢而有力，颈软，左侧肢体瘫痪，应考虑是 **脑出血**
- 39、中毒性细菌性痢疾选择有 **黏液脓血性粪便检查**
- 40、基础代谢率计算公式 **(脉率+脉压) - 111** 基础代谢率正常±10%；20%-30%轻度甲亢；30%-60%中度甲亢；>60%重度甲亢
- 41、肝炎住院患者，信件寄出前处理方法 **甲醛熏蒸发**
- 42、慢性阻塞性肺气肿每天吸氧时间 **大于 15 个小时，氧流量 1-2L/min**
- 43、患者男性 21 岁，运动时常有呼吸困难。体检：胸骨左缘第 3-4 肋间 III 级粗糙的喷射性收缩期杂音，父亲病故的原因是心性猝死，该患者所患疾病 **肥厚型心肌病** (有明显家族史)
- 44、患者 68 岁，气促，面色潮红，神志恍惚，球结膜充血水肿，心率 120 次/分，心律不齐，肝肋下 3cm，双下肢水肿，尿蛋白(+)，提示：慢性呼吸衰竭伴二氧化碳潴留，首选检查 **动脉血气分析**
- 45、初产妇，自妊娠 38 周开始自觉头痛眼花，查血压 160/110mmhg，尿蛋白 2.5/24h,宫缩不规律，胎心 134 次/分，此时患者属于子痫前期，**应滴注硫酸镁**
- 46、诊断为水痘，**使用抗生素，炉甘石洗剂，阿昔洛韦，维生素 D，避免使用糖皮质激素**，可导致病毒散播
- 47、留置针输液，用肝素封管，可导致封管堵塞的原因 **1、肝素过期 2、推注封管液速度过快 3、静脉输注高营养液 4、患者静脉压过高**
- 48、患者女 55 岁，膀胱高度膨胀，**导尿过多导致膀胱内压骤降，膀胱粘膜极具充血**，而使终末尿液呈洗肉样
- 49、支气管哮喘**先用支气管扩张药再用激素类药**
- 50、患者女 32，白血病，口腔有乳白色分泌物，患者属于真菌感染，**选用 1%-4%碳酸氢钠溶液漱口**

- 51、患者男，用力排便后出现肛门剧痛，无血便，检查见肛管皮下暗紫色肿块，有触痛，首先考虑 **血栓性外痔**
- 52、患者男 41 岁，颅脑外伤，主诉：剧烈头痛、头晕、视物不清，查体：呼吸 10 次/分，心搏有力 50 次/分，血压 160/120mmhg，护士应先解决健康问题是 **潜在并发症：脑疝**
- 53、患者自杀服用大量安眠药，应用 **1:5000 高锰酸钾溶液洗胃**
- 54、患者男 18 岁学生，晨跑后感左侧胸闷、胀痛、气促、出冷汗，查体：神清，面色苍白，唇发绀，呼吸 30 次/分，律齐，该患者诊断为**自发性气胸**
- 55、患者排尿开始时有血尿，以后逐渐变清表示病变部位在 **尿道**
- 56、患者男 67 岁，肺癌，给予环磷酰胺化疗，护士需要密切观察患者的不良反应是 **出血性膀胱炎**
- 57、老年男病人，进食偶发有吞噎感，胸骨后有刺痛，食后症状消失，近日来吞咽困难，米粥也难下咽，明显消瘦，首先考虑 **胃癌**
- 58、妊娠期患者出现咯血应禁用的止血药是 **垂体后叶素**（促进子宫收缩，导致流产）
- 59、患者女 48 岁，大面积烧伤 2 周，伴发感染性休克，护士在观察病情时发现皮肤上有瘀点、瘀斑，该患者神不清，脉搏细速、呼吸浅、血压 70/50mmhg，无尿，立即抽血进行实验室检查，结果血小板 $40 \times 10^9/L$ ，纤维蛋白原 1.0/L，凝血酶原时间延长，3P 试验阳性，该患者出血原因是 **发生了弥散性血管内凝血（DIC）**
- 60、细菌性肝脓肿，细菌侵入主要途径为**胆道系统**
- 61、患者女性 18 岁，昨日起持续性上腹剧痛，伴腹胀，呕吐，吐出蛔虫一条，体格检查：体温 38.8 度，血压 90/50mmhg,脉搏 120 次/分巩膜轻度黄染。上腹有压痛及反跳痛，尿中胆红素（2+），血钙 1.3mmol/L，该患者最可能诊断 **急性出血坏死型胰腺炎**
- 62、赵女士 52 岁，因患宫颈癌需行子宫切除术，青霉素皮试 2 分后，面色苍白、冷汗、发绀、脉搏 120 次/分，血压 9.21 6kPa 69/45mmhg,四肢麻木，烦躁不安，护士应给病人注射**盐酸肾上腺素** 出现上述表现的原因是**过敏体质**
- 63、王某，男，45 岁，患十二指肠溃疡，突然呕血吗，面色苍白，脉搏 120 次/分，血压 816kPa 60/45mmhg,医嘱：输血 400ml，给予患者输血目的是补充**血容量** 为患者输两袋血之间应输入少量 **0.9%氯化钠溶液**
- 64、压疮炎性浸润期典型表现，**尾骶部皮肤呈现紫色，有皮下硬结，并出现水疱**
- 65、患者男 46 岁，晚餐进食后突然出现上腹中部剧烈刀割样疼痛，向腰背部呈带状放射性，继而呕出胆汁，体检：急性痛苦面容，全腹疼痛，腹肌紧张，体温 38.5 度，应初步考虑该患者为 **急性胰腺炎** 首选**血淀粉酶测定检查** 最主要护理问题是**疼痛** **屈膝侧卧位** **避免暴饮暴食**
- 66、患者男 38 岁，上腹部持续饱胀不适感半年，餐后症状加重，但食欲与体重无明显变化。出现黑便三天每日一次，大便成形有光泽，查体：上腹部轻压痛，肝脾肋下未触及，无明显贫血面容，幽门螺旋杆菌阳性，诊断为**慢性胃窦胃炎** 首选有**黑便期间做急诊胃镜检查** 最可靠为**胃镜及胃黏膜活组织检查**