

中西医结合执业（含助理）医师资格考试 100 考题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 桑白皮汤
- B. 小青龙汤
- C. 涤痰汤、安宫牛黄丸或至宝丹
- D. 二陈汤合三子养亲汤
- E. 玉屏风散合六君子汤

1. 慢性阻塞性肺疾病之痰蒙神窍证，治疗应首选的方剂是

【答案】C

2. 慢性阻塞性肺疾病之痰浊阻肺证，治疗应首选的方剂是

【答案】D

3. 某女，发作性喉间痰鸣气喘 20 年，现症见气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高肋胀，口渴喜饮，口苦，痰多，咳吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A. 定喘汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 七味都气丸
- D. 苏子降气汤
- E. 小青龙汤

【答案】A

4. 某男，29 岁，因肺炎收入院。查体：血压 110 / 70 mmHg，T：39℃，急性病容，呼吸急促，口唇发绀，右下肺可听到支气管呼吸音。血常规：白细胞 $12.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 0.86。治疗措施错误的是

- A. 鼓励患者多喝水
- B. 首选青霉素 G
- C. 病人应卧床休息，宜食用营养而易消化的食物
- D. 剧烈胸痛者，可酌用少量镇痛药
- E. 应用大量退热剂，使体温尽快恢复正常

【答案】E

(5~6 题共用备选答案)

- A. 铁锈色痰
- B. 粉红色泡沫痰
- C. 砖红色胶冻状痰
- D. 脓性痰
- E. 粉红色乳状痰

5. 葡萄球菌肺炎可见

【答案】E

6. 克雷伯杆菌肺炎可见

【答案】C

(7~8 题共用备选答案)

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 吡嗪酰胺
- E. 乙胺丁醇

7. 其杀灭结核菌的机制在于抑制菌体的 RNA 聚合酶，从而阻碍 mRNA 合成的是

【答案】B

8. 具有杀菌作用强、价格低廉、副作用少、口服等优点的最重要的治疗结核病的药物是

【答案】A

9. 患者，女性 74 岁。确诊支气管肺癌 1 个月。现症见刺激性咳嗽，痰中带血，心烦，少寐，手足心热，盗汗，口渴，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 生脉饮合四逆散
- B. 血府逐瘀汤合射干麻黄汤
- C. 导痰汤合定喘汤

- D. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- E. 沙参麦冬汤合生脉散

【答案】D

10. 支气管哮喘发作时，可表现为

- A. 发作性伴有痰鸣音的呼气性呼吸困难
- B. 发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- C. 发作性伴有湿啰音的呼气性呼吸困难
- D. 发作性伴有哮鸣音的吸气性呼吸困难
- E. 发作性伴有痰鸣音的吸气性呼吸困难

【答案】B

11. 患者，男，23岁。有花粉过敏史。突然出现咳嗽，打喷嚏，呼吸困难，不能平卧，喉中痰鸣，发热，汗出，舌红苔黄，脉弦滑。对诊断最有意义的检查是

- A. 肺功能
- B. 心电图
- C. 血气分析
- D. 血常规
- E. 痰涂片镜检，培养

【答案】A

12. 治疗肺炎支原体肺炎热闭心神证，应首选

- A. 桑菊饮与青霉素
- B. 麻杏石甘汤与阿昔洛韦
- C. 清营汤与红霉素
- D. 生脉散与左氧氟沙星
- E. 竹叶石膏汤与麦迪霉素

【答案】C

13. 患者，男，18岁。因高热，胸痛，咳铁锈色痰入院，检查：急性热病病容，体温40℃，脉搏102次/min，X线胸片示左上肺大片片状阴影，白细胞 $19 \times 10^9/L$ 。治疗应首选

- A. 青霉素加麻杏石甘汤
- B. 输液加给氧
- C. 糖皮质激素
- D. 红霉素加庆大霉素
- E. 病毒唑加退热药



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



【答案】A

14. 患者素有水饮，复感风寒，恶寒发热，无汗，咳喘，痰多而稀，身体重痛，舌苔白滑，脉浮。治疗应选用

- A. 苓桂术甘汤
- B. 五苓散
- C. 小青龙汤
- D. 苏子降气汤
- E. 麻黄汤



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

【答案】C

15. 房颤伴心功能不全患者，应首选的药物是

- A. 普罗帕酮
- B. 胺碘酮
- C. 硫氮酮
- D. 氯化钾
- E. 异丙肾上腺素



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

【答案】B

16. 患者，男性，45岁。近来出现心动过速。查体：心率为180次/分，律规则，按压颈动脉窦后，心率突然减慢至90次/分，但运动后又增快至180次/分。其应首先考虑的诊断是

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性房性心动过速伴2:1房室传导



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

E. 心房扑动，2:1 房室传导

【答案】A

(17~18 题共用备选答案)

A. II度 I型房室传导阻滞

B. II度 II型房室传导阻滞

C. III度房室传导阻滞

D. 干扰性房室分离

E. II度 I型窦房传导阻滞

17. P-R 逐个延长，R-R 逐次缩短，直至 QRS 波脱落，其诊断是

【答案】A

18. P-P 规则，P-R 固定，QRS 波间歇性或周期性脱落，其诊断是

【答案】B

(19~20 题共用备选答案)

A. 天麻钩藤饮

B. 杞菊地黄丸

C. 半夏白术天麻汤

D. 济生肾气丸

E. 血府逐瘀汤

19. 高血压病肝阳上亢证，应首选的方剂是

【答案】A

20. 高血压病痰湿内盛证，应首选的方剂是

【答案】C

21. 病毒性心肌炎的肝脏首发症状为

A. 心力衰竭

B. 心律失常

C. 心源性休克

D. 心源性猝死

E. 心绞痛

【答案】B

22. 治疗慢性心律失常气阴两虚证，应首选

A. 人参养荣汤

B. 天王补心丹

C. 归脾汤

D. 养心汤

E. 炙甘草汤

【答案】E

23. 减慢心率从而降低心肌耗氧量，缓解心绞痛的药物是

A. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）

B. 硝苯地平（心痛定）

C. 胺碘酮

D. 美托洛尔

E. 硝酸甘油

【答案】D

（24~25 题共用备选答案）

A. 增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛

B. 无明显心肌需氧增加的条件下发生的心绞痛

C. 心绞痛发作时，心电图某些导联 ST 段抬高

D. 心尖部针刺样疼痛，发作时无心电图异常

E. 心前区压迫疼痛 15 分钟以上，心电图有病理型 Q 波

24. 劳力型心绞痛的诊断标准是

【答案】A

25. 变异型心绞痛的诊断标准是

【答案】C

26. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是

A. 沙参麦冬汤

B. 生脉饮

C. 滋水清肝饮

D. 益胃汤

E. 玉女煎

【答案】D

(27 ~ 28 题共用备选答案)

A. 翕影

B. 胃黏膜僵直

C. 钡剂潴留

D. 痉挛性切迹

E. 上腹疼痛

27. 消化性溃疡的直接征象是

【答案】A

28. 消化性溃疡的间接征象是

【答案】D

(29 ~ 30 题共用备选答案)

A. 柴胡疏肝散加减

B. 玉女煎加减

C. 开郁二陈汤加减

D. 膈下逐瘀汤加减

E. 海藻玉壶汤加减

29. 治疗胃癌肝胃不和证, 应首选的方剂是

【答案】A

30. 治疗胃癌胃热伤阴证, 应首选的方剂是

【答案】B

(31 ~ 32 题共用备选答案)

A. 异功散

B. 玉屏风散合金匱肾气丸



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

C. 附子理中丸

D. 杞菊地黄丸

E. 五苓散合五皮饮

31. 慢性肾炎水湿证, 治疗应首选的方剂是

【答案】E

32. 慢性肾炎脾肾气虚证, 治疗应首选的方剂是

【答案】A

33. 粗略估计 2~12 岁小儿体重的计算公式是

A. 体重(kg)=年龄 \times 2+5

B. 体重(kg)=年龄 \times 2+6

C. 体重(kg)=年龄 \times 2+8

D. 体重(kg)=年龄 \times 2+9

E. 体重(kg)=年龄 \times 2+10

【答案】C

34. 小儿前囟闭合的正常时间是

A. 6~7 个月

B. 8~9 个月

C. 9~11 个月

D. 12~18 个月

E. 19~20 个月

【答案】D

35. 小儿“稚阴稚阳”学说, 是指其生理状态为

A. 阳常有余, 阴常不足

B. 脏腑娇嫩, 形气未充

C. 生机蓬勃, 发育迅速

D. 脏气清灵, 易趋健康

E. 脾常不足, 肝常有余

【答案】B

36. 小儿指纹分三关，从虎口到食指端依次为

- A. 命关、气关、风关
- B. 气关、命关、风关
- C. 气关、风关、命关
- D. 风关、气关、命关
- E. 风关、命关、气关

【答案】D

37. 患儿，男，3岁。发热恶寒，鼻塞流涕，微咳，兼见腕腹胀满，不思乳食，呕吐酸腐，大便臭秽，舌苔厚腻。其诊断是

- A. 风热感冒
- B. 时行感冒
- C. 感冒夹痰
- D. 感冒夹惊
- E. 感冒夹食滞

【答案】E

(38 ~ 39 题共用备选答案)

- A. 清热利湿退黄
- B. 解表化湿退黄
- C. 温中化湿退黄
- D. 运脾燥湿退黄
- E. 利水渗湿退黄

38. 胎黄湿热熏蒸证的治法是

【答案】A

39. 胎黄寒湿阻滞证的治法是

【答案】C

40. 患儿，7岁。发热，无汗，头晕，头痛，鼻塞，身重困倦，胸闷泛恶，口渴心烦，食欲不振，恶心呕吐，泄泻，舌质红，苔黄腻，脉数。应首选的方剂是

- A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 大柴胡汤

D. 荆防败毒散

E. 新加香薷饮

【答案】E

(41 ~ 42 题共用备选答案)

A. 衣原体

B. 呼吸道合胞病毒

C. 流感病毒

D. 腺病毒

E. 柯萨奇病毒

41. 咽结合膜热的病原是

【答案】D

42. 疱疹性咽峡炎的病原是

【答案】E

(43 ~ 44 题共用备选答案)

A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

B. 银翘散

C. 葛根芩连汤

D. 炙甘草汤合生脉散

E. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散

43. 病毒性心肌炎气阴两虚证治疗首选方是

【答案】D

44. 病毒性心肌炎心阳虚弱证治疗首选方是

【答案】A

45. 小儿泄泻湿热泻的治法是

A. 疏风散寒，化温和中

B. 清肠解热，化湿止泻



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- C. 健脾益气, 助运止泻
- D. 健脾和胃, 消食化滞
- E. 清热化湿, 健脾止泻

【答案】B

(46~47题共用备选答案)

- A. 浮肿、少尿、血尿、蛋白尿
- B. 浮肿、少尿、血尿、高血压
- C. 浮肿、少尿、血尿、低蛋白血症
- D. 浮肿、血尿、蛋白尿、低蛋白血症
- E. 浮肿、蛋白尿、高脂血症、低蛋白血症

46. 急性肾小球肾炎的临床特点是

【答案】B

47. 肾病综合征的临床特点是

【答案】E

48. 小儿化脓性脑膜炎的脑脊液变化为

- A. 细胞数增高, 蛋白正常, 糖降低
- B. 细胞数增高, 蛋白升高, 糖降低
- C. 细胞数正常, 蛋白正常, 糖降低
- D. 细胞数增高, 蛋白升高, 糖升高
- E. 细胞数增高, 蛋白正常, 糖正常

【答案】B

49. 蛋白质-能量营养不良最为常见的并发症是

- A. 营养性贫血
- B. 感染
- C. 微量元素缺乏
- D. 自发性低血糖
- E. 佝偻病

【答案】A



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

50. 手术器械和敷料最常见且效果可靠的灭菌方法是

- A. 甲醛气体熏蒸法
- B. 紫外线消毒法
- C. 乳酸消毒法
- D. 高压蒸汽灭菌法
- E. 环氧乙烷熏蒸法

【答案】D

51. 治疗结肠癌湿热下注证，应首选的方剂是

- A. 桃红四物汤
- B. 槐角地榆汤
- C. 麻仁滋脾丸
- D. 清瘟败毒饮
- E. 益气固本解毒汤

【答案】B

52. 急性阑尾炎瘀滞证的中医治法是

- A. 通腑排毒，养阴清热
- B. 清热利湿，活血解毒
- C. 清热解毒，活血止痛
- D. 通腑泄热，利湿解毒
- E. 行气活血，通腑泄热

【答案】E

53. 治疗急性乳腺炎肝胃郁热证，应首选的方剂是

- A. 逍遥散
- B. 透脓散
- C. 托里消毒散
- D. 瓜蒌牛蒡汤
- E. 柴胡疏肝散

【答案】D



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

54. 动脉硬化性闭塞症寒凝血脉证的中医治法是

- A. 清热解毒，利湿通络
- B. 活血化瘀，通络止痛
- C. 清热凉血，疏通经络
- D. 温经散寒，活血化瘀
- E. 补肾健脾，益气养血

【答案】D

(55 ~ 56 共用备选答案)

- A. 瘙痒
- B. 便血
- C. 便秘
- D. 流脓
- E. 疼痛

55. 内痔的主要临床表现是

【答案】B

56. 血栓外痔的主要临床表现是

【答案】E

57. 下列切开法的注意事项中，错误的是

- A. 在关节部位，宜谨慎开刀，切口应越过关节
- B. 血瘤、岩肿不宜切开
- C. 患者体弱应先内服调补药，然后开刀
- D. 面部疔疮，尤其是口鼻部位，忌早期开刀
- E. 进刀时，刀头要求向上挑取，不宜向下割划

【答案】A

58. 下列各项，由禀赋不耐而发病的是

- A. 红丝疔
- B. 疔疮
- C. 药毒



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

D. 流注

E. 脱疽

【答案】C

59. 患者，男，78岁。腰痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿痛，小便混赤，口干欲饮。舌红，苔黄腻，脉弦数。可以服用如下哪种方剂

A. 八正散加减

B. 金铃子散加减

C. 石韦汤加减

D. 济生肾气丸加减

E. 六味地黄丸

【答案】A

60. 可引起血栓性深静脉炎的发病原因是

A. 吸烟

B. 寒冷

C. 长期站立

D. 手术

E. 静脉注射药液

【答案】D

61. 以下血管瘤的治疗方法错误的是

A. 穿刺

B. 手术

C. 放射

D. 硬化剂注射

E. 冷冻

【答案】A

62. 在慢性阻塞性肺疾病的治疗药物中，对重度和极重度患者可应用的药物是

A. 糖皮质激素

B. β_2 受体激动剂

- C. 肾上腺皮质激素[®]
- D. 抗生素
- E. 祛痰药

【答案】A

63. 患者，32岁。右乳房发现肿块1年，无疼痛。查体：右乳外下象限可扪及2.5cm × 1.5cm大小肿块，形如鸡卵，表面光滑，活动度好。应首先考虑的是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房结核
- C. 乳腺增生病
- D. 乳腺纤维瘤
- E. 乳腺导管内乳头状瘤

【答案】D

64. 首选用于治疗乳腺癌肝郁气滞证的方剂是

- A. 开郁散
- B. 逍遥散
- C. 香贝养荣汤
- D. 神效瓜蒌散
- E. 瓜蒌牛蒡汤

【答案】B

65. 湿疹湿热浸淫证的治疗主方

- A. 五味消毒饮
- B. 萆薢渗湿汤合三妙丸
- C. 除湿胃苓汤
- D. 当归饮子
- E. 四物消风饮

【答案】B

66. 患者，男，33岁。患银屑病，皮损色淡，部分消退，鳞屑较多，皮肤干燥；伴头晕眼花，面色白，口干，便干；舌淡红，苔薄白，脉细缓。其治法是

- A. 清热泻火，凉血解毒
- B. 清利湿热，解毒通络
- C. 活血化痰，解毒通络
- D. 养血和血，祛风润燥
- E. 清热凉血，解毒消斑



【答案】D

67. 沈某，男，28岁。外生殖器及肛门出现单个质坚韧丘疹，腹股沟部有杏核样大、色白坚硬之肿块，伴口苦纳呆，尿短赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦数。其证候是

- A. 肝经湿热
- B. 痰瘀互结
- C. 脾虚湿蕴
- D. 气血两虚
- E. 气阴两虚



【答案】A

68. 下列关于雌激素生理作用的描述错误的是

- A. 促进子宫肌细胞增生和肥大
- B. 促进子宫内膜腺体及间质增生
- C. 使宫颈口闭合，黏液分泌减少
- D. 促进卵泡发育
- E. 促进水钠潴留



【答案】C

69. 下列关于女性生殖器官肿瘤的叙述，正确的是

- A. 高危型 HPV 持续感染是子宫颈癌的主要危险因素
- B. II型子宫内膜癌即雌激素相关性，占多数，预后好
- C. 确诊子宫内膜癌的主要依据是宫腔镜检查
- D. 宫颈癌筛查的主要方法是宫颈和宫颈管活组织检查
- E. 子宫肌瘤最常见的变性是红色样变



【答案】A



70. 子宫内膜异位症的基本病机是

- A. 寒凝血瘀
- B. 气滞血瘀
- C. 脏腑功能失调
- D. 气血功能失常
- E. 瘀血阻滞冲任胞宫

【答案】E

71. 毓麟珠治疗不孕症的中医证型是

- A. 肾阴虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 肾气虚弱证
- D. 肝郁证
- E. 血瘀证

【答案】C

72. 急性盆腔炎患者[®]，出现神昏谵语，高热汗出，口渴欲饮，烦躁不宁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 白虎汤
- C. 青蒿鳖甲汤
- D. 清营汤
- E. 大黄牡丹皮汤

【答案】D

73. 患者，女，26岁，已婚。停经50天。5天来恶心呕吐酸水，口苦咽干，胸胁满痛，头胀而晕，舌红，苔黄，脉弦滑。尿妊娠试验(+)。B超：宫内早孕。其中医证型是

- A. 脾胃虚弱证
- B. 肝胃不和证
- C. 痰湿中阻证
- D. 肝气上逆证

E. 气阴两亏证

【答案】B

74. 患者，女，29岁，已婚。孕8月余，头晕头痛伴耳鸣，面部潮红，心烦失眠，口干咽燥，舌红少苔，脉弦细滑数。血压150/100mmHg。治疗应首选的方剂是

A. 半夏白术天麻汤

B. 杞菊地黄丸

C. 羚角钩藤饮

D. 知柏地黄汤

E. 牛黄降压丸

【答案】B

75. 患者，女，32岁。月经稀发，婚后未孕，带下量多，形体肥胖，多毛，四肢倦怠，胸闷泛恶，舌体胖大，色淡，苔白腻，脉滑。诊断为多囊卵巢综合征。其中医证型是

A. 寒湿凝滞证

B. 脾肾阳虚证

C. 痰湿阻滞证

D. 气滞血瘀证

E. 肝郁脾虚证

【答案】C

76. 患者，女，30岁，已婚。产后15天，乳汁量少、清稀，乳房柔软，无胀感，神疲纳少，舌淡，脉虚细。其中医治法是

A. 补气养血，佐以通乳

B. 疏肝解郁，通络下乳

C. 补肾益气，佐以通乳

D. 健脾和胃，佐以通乳

E. 理气活血，佐以通乳

【答案】A

(77~78题共用备选答案)

A. 宫颈

B. 子宫后壁

C. 输卵管

D. 卵巢

E. 盆腔腹膜

77. 异位妊娠最常发生的部位是

【答案】C

78. 子宫内膜异位症最常发生的部位是

【答案】D

79. 治疗子肿气滞湿阻证，应首选的方剂是

A. 天仙藤散

B. 白术汤合五苓散

C. 半夏白术天麻汤

D. 二陈汤

E. 五苓散

【答案】A

80. 妊娠期糖尿病需立即终止妊娠的指征是

A. 胎盘功能良好

B. 血糖控制良好

C. 胎儿宫内状况良好

D. 胎儿窘迫

E. 孕晚期无其他合并症

【答案】D

81. 治疗多囊卵巢综合征胰岛素抵抗，常用的药物是

A. 氯米芬

B. 二甲双胍

C. 螺内酯

D. 复方醋酸环丙孕酮

E. 妈富隆



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

【答案】B

82. 患者，女，31岁。妊娠5个月，多饮尿多，小便浑浊如膏，腰膝酸软，形寒畏冷，空腹血糖10 mmol/L，舌淡，少苔，脉沉细弱，治疗应首选的方剂是

- A. 玉女煎
- B. 归脾汤
- C. 金匱肾气丸
- D. 六味地黄丸
- E. 消渴方

【答案】C

83. 产后小便不通的发病机理是

- A. 膀胱气化不利
- B. 脾肺气虚，不能通调水道
- C. 肾阳不振，气化失司
- D. 气机阻滞，清浊升降失常
- E. 膀胱失约

【答案】A

84. 患者，女，29岁，已婚。近1周带下量多，色黄，质稠有臭味，伴少腹胀痛。胸胁胀痛，心烦易怒，口干苦，舌红，苔黄腻，脉滑数。妇科检查：宫颈充血水肿，有触痛。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤去木通
- B. 五味消毒饮
- C. 完带汤
- D. 四妙丸
- E. 止带方加味

【答案】A

85. 足三阴经在内踝上8寸以上的分布规律是

- A. 厥阴在前、太阴在中、少阴在后
- B. 少阴在前、厥阴在中、太阴在后

- C. 厥阴在前、少阴在中、太阴在后
- D. 太阴在前、厥阴在中、少阴在后
- E. 太阴在前、少阴在中、厥阴在后

85 【答案】D

86. 手阳明大肠经的主治特点是

- A. 后头、神志病
- B. 侧头、胁肋病
- C. 侧头、耳病, 胁肋病侧
- D. 前头、鼻、口、齿病
- E. 前头、咽喉病、胃肠病

【答案】D

87. 治疗急性胃痛应首选的腧穴是

- A. 梁门
- B. 梁丘
- C. 内庭
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【答案】B

88. 下列八脉交会穴所通奇经错误的是

- A. 后溪——督脉
- B. 外关——阳维脉
- C. 足临泣——阳跷脉
- D. 内关——阴维脉
- E. 照海——阴跷脉

【答案】C

89. 治疗肺系、咽喉、胸膈疾病宜选用

- A. 鱼际、曲池
- B. 外关、足临泣

C. 照海、列缺

D. 后溪、申脉

E. 内关、公孙

【答案】

90. 根据主客原络配穴法，治疗咳嗽兼便秘应选用

A. 太渊、列缺

B. 合谷、偏历

C. 太渊、偏历

D. 合谷、列缺

E. 支沟、照海

【答案】

91. 耳后两乳突之间的骨度分寸是

A. 4 寸

B. 6 寸

C. 8 寸

D. 9 寸

E. 12 寸

【答案】

92. 既可治疗咳嗽、气喘，又可治疗头项疾患的是

A. 中府

B. 尺泽

C. 列缺

D. 太渊

E. 少商

【答案】

93. 下列哪项不是内关的主治病证

A. 心痛、胸闷

B. 胃痛、呃逆



C. 遗尿、阳痿

D. 失眠、郁证

E. 中风、眩晕

【答案】C

94. 适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是

A. 单手进针法

B. 舒张进针法

C. 提捏进针法

D. 夹持进针法

E. 指切进针法

【答案】B

95. 治疗饮食停滞型胃痛,除主穴外,还应加用

A. 三阴交、内庭

B. 膈俞、胃俞

C. 胃俞、脾俞

D. 下脘、梁门

E. 气海、关元

【答案】D

96. 中风中经络宜选择下列哪组穴位

A. 印堂、神门、少府、太冲、阳陵泉、百会

B. 内关、水沟、三阴交、极泉、尺泽、委中

C. 风池、百会、太冲、行间、劳宫、尺泽

D. 百会、素髻、行间、丰隆、后溪、三阴交

E. 关元、水沟、大陵、神门、中冲、内关

【答案】B

97. 患者,女,53岁。右上齿痛半年,隐隐作痛,时作时止,脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上,还应加取的腧穴是

A. 外关、风池

- B. 内庭、二间
- C. 太溪、行间
- D. 风池、侠溪
- E. 风池、太冲

【答案】C

98. 患者,男,35岁。咽喉肿痛,咽干,口渴,便秘,尿黄,舌红,苔黄,脉洪大。治疗除少商、合谷、尺泽外,还应加取的腧穴是

- A. 关冲、风池
- B. 厉兑、天突
- C. 内庭、鱼际
- D. 照海、鱼际
- E. 太溪、曲池、鱼际

【答案】C

99. 治疗瘾疹的主穴是

- A. 曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交
- B. 大椎、曲池、太冲、风池、中脘
- C. 大椎、太冲、三阴交、血海、内庭
- D. 血海、内庭、足三里、气海、天枢
- E. 外关、风池、三阴交、大椎、膈俞

【答案】A

100. 治疗腰部扭伤,痛在腰部正中,舌质淡红,脉弦,宜选取

- A. 阿是穴、大肠俞、委中、太冲
- B. 阿是穴、大肠俞、委中、阳陵泉
- C. 阿是穴、大肠俞、委中、太溪
- D. 阿是穴、大肠俞、委中、手三里
- E. 阿是穴、大肠俞、委中、后溪

【答案】E