

实时更新 此版本 2021 年 4 月 17 11:02:50

2021 主管护师考试

(单选题) 基础知识

患者，女性，45 岁。肾移植术，术中肾血循环恢复 30 分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫、坏死，该病人出现的是

- A、 休克
- B、 超急性排斥反应**
- C、 急性排异反应
- D、 亚急性排异反应
- E、 慢性排异反应

为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A、 心电图
- B、 超声心动图冠状动脉造影
- C、 冠状动脉造影
- D、 右心室造影
- E、 胸部 X 线

流行性乙型脑炎的主要传播媒介是

- A、 鼠
- B、 猪
- C、 狗
- D、 蚊**
- E、 血吸虫

急性阑尾炎最常见的病因是

- A、 免疫力低下
- B、 胃肠道功能紊乱
- C、 淋巴小结增生
- D、 阑尾管腔阻塞**
- E、 结石压迫阑尾

十二指肠溃疡的好发部位是

- A、 球部**
- B、 降部
- C、 水平部
- D、 升部
- E、 降部和升部

孕妇，妊娠 36 周。因近日胎动减少就行无应激试验发现胎心基线 U0 次/分，胎心基线变异 <5 次/分，20 分钟内仅 1 次胎动，无胎心加速，并连续出现晚期减速。该监测结果提示 胎儿

- A、脐带绕颈
- B、脐带受压
- C、胎头受压
- D、宫内缺氧
- E、先天性心脏病学

哮喘发作的本质是

- A、基因遗传
- B、环境因素影响
- C、呼吸道慢性炎症
- D、呼吸道高反应性
- E、神经介质平衡失调

腰椎管狭窄症的后天发病因素中，最多见的是

- A、损伤
- B、妊娠椎管退行性变
- C、椎管退行性变
- D、腰棘韧带炎
- E、先天性颈椎管狭窄

正常成人的二尖瓣口面积为

- A、< 1.0cm²
- B、1.0~1.5cm²
- C、1.5~2.0cm²
- D、2.0~4.0cm²
- E、4.0~6.0cm²

急性阑尾炎最常见的病因是

- A、免疫力低下（押预测考点急性阑尾炎）
- B、胃肠道功能紊乱（典型症状：转移性的右下腹痛）
- C、淋巴小结增生（体征：麦氏点的压痛）
- D、阑尾管腔阻塞
- E、结石压迫 I 乱尾

为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A、心电图
- B、超声心动图
- C、冠状动脉造影
- D、右心室造影
- E、胸部 X 线

成人缺铁性贫血最常见的原因是

- A、铁需求量增加
- B、铁摄入不足
- C、铁吸收不良
- D、慢性失血
- E、肿瘤

脓尿是指每高倍视野含有脓细胞不少于

- A、10 个
- B、8 个
- C、7 个
- D、6 个
- E、5 个

患者，女性，45 岁。肾移植术中肾血循环恢复 30 分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫、坏死，该病人出现的是

- A、休克
- B、超急性排异反应（24 小时内）
- C、急性排异反应（1 个月）
- D、亚急性排异反应
- E、慢性排异反应（数年）

患者，女性，37 岁。因阴道分泌物增多及外阴瘙痒来就诊。诊断为滴虫阴道炎，拟采用自主冲洗器灌洗阴道的方法，护士为其介绍使用方法时，告知其最适宜的冲洗液是

- A、5.5% 醋酸溶液
- B、2% 呋喃西林
- C、灭菌生理盐水
- D、1% 乳酸溶液
- E、2% 碳酸钠溶液

孕妇，妊娠 36 周。因近日胎动减少行无应激试验发现胎心基线 100 次/分，胎心基线变异 < 5 次/分，20 分钟内仅 1 次胎动，无胎心加速，并连续出现晚期减速该监测结果提示胎儿

- A. 脐带绕颈
- B. 脐带受压
- C. 胎头受压
- D. 宫内缺氧
- E. 先天性心脏病

精子获能的主要部位是

- A. 卵巢
- B. 子宫颈
- C. 阴道
- D. 子宫和输卵管

E. 阴道后穹隆

26. 人体主要内分泌原不包括

- A. 下丘脑
- B. 垂体
- C. 甲状腺
- D. 肾上腺
- E. 肝脏

27. 产褥感染最常见的致病菌是

- A. 厌氧性链球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 葡萄球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 肺炎球菌



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM