

2023年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选真题

中医执业医师精选 600 题

金英杰医学教育

1.(B型题)83 用于止血，宜炒炭用的药物是

- A.紫苏
- B.荆芥
- C.香薷
- D.麻黄
- E.生姜

答案：B

解析：荆芥发表、透疹、消疮宜生用；止血宜炒用。麻黄发汗解表宜生用，止咳平喘多炙用。

2.(B型题)86 具有利尿功效的药物是

- A.白头翁
- B.大青叶
- C.穿心莲
- D.射干
- E.鱼腥草

答案：E

解析：白头翁清热解毒，凉血止痢。大青叶清热解毒，凉血消斑。穿心莲清热解毒，凉血，消肿，燥湿。射干清热解毒，祛痰，利咽。鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。

3.(B型题)88 可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案：C

解析：鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。主肺痈吐脓，痰热喘咳，喉蛾，热痢，痈肿疮毒，热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。

4.(B型题)90 醋制可增强止痛作用的药物是

- A.白茅根
- B.蒲黄
- C.白及
- D.郁金
- E.延胡索

答案：E

解析：白茅根凉血止血，清热利尿。用于血热出血证、水肿、热淋、黄疸、胃热呕吐、肺热咳嗽等，生用可治疗产后子宫收缩不良出血。故 89 题选 A。延胡索醋制可增强止痛作用。故 90 题选 E。

5.(B型题)93 治疗寒饮呕吐，宜选用

- A.白芥子
- B.杏仁
- C.半夏

D.桔梗

E.竹茹

答案：C

解析：A 温肺化痰，利气，散结消肿。B 止咳平喘，润肠通便。C 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。其主治证候有：①湿痰，寒痰证；②呕吐；③心下痞，结胸，梅核气；④癭瘤，痰核，痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D 宣肺，祛痰，利咽，排脓。E 清热化痰，除烦止呕。

6.(B 型题)96 白芥子具有的功效是

A.燥湿化痰

B.温肺化痰

C.降气化痰

D.宣肺化痰

E.清热化痰

答案：B

解析：旋覆花降气行水化痰，降逆止呕，适用于痰饮蓄结，胸膈痞满，噎气，呕吐等证，故 95 题选 C。白芥子温肺化痰，利气，散结消肿，故 96 题选 B。

7.(B 型题)98 具有益肾固精，养心安神功效的药物是

A.山茱萸

B.桑螵蛸

C.莲子

D.诃子

E.金樱子

答案：C

解析：A 补益肝肾，收敛固涩。B 固精缩尿，补肾助阳。C 固精止带，补脾止泻，益肾养心。D 涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。E 固精缩尿止带，涩肠止泻。

8.(A1 型题)1 按照君臣佐使含义分析，麻黄汤中的炙甘草是

A.臣药

B.佐药

C.使药

D.臣佐药（注：即臣药兼有佐药之用）

E.佐使药（注：即佐药兼有使药之用）

答案：E

解析：炙甘草既能调和麻、杏之宣降，又能缓和麻、桂相合之峻烈，使汗出不致过猛而耗伤正气，是使药而兼佐药之用。故本题选 E。

9.(A1 型题)4 桂枝汤的组成中不含有的药物是

A.麻黄

B.芍药

C.生姜

D.大枣

E.甘草

答案：A

解析：桂枝汤的组成有桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。故本题选A。

10.(A1型题)6 银翘散的功效是

- A.辛凉宣泄，清肺平喘
- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热，清肝明目

答案：C

解析：B属于桑菊饮的功效，A属于麻杏甘石汤的功效，辛凉透表，清热解毒，C属于银翘散的功。故本题选C。

11.(A1型题)8 银翘散和桑菊饮的组成中均含有的药物是

- A.银花、薄荷、桔梗、芦根
- B.连翘、薄荷、杏仁、芦根
- C.连翘、薄荷、桔梗、杏仁
- D.银花、薄荷、桔梗、生甘草
- E.连翘、薄荷、桔梗、生甘草

答案：E

解析：银翘散和桑菊饮均为治疗温病初起的辛凉解表方剂。组成中都有连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根五味，但银翘散有银花配伍荆芥穗、豆豉、牛蒡子、竹叶，解表清热之力较强；桑菊饮有桑叶配伍杏仁，宣肺止咳之力较大。故本题选E。

12.(A1型题)10 桑菊饮组成中不含有的药物是

- A.薄荷
- B.连翘
- C.杏仁
- D.桔梗
- E.双花

答案：E

解析：桑菊饮的组成是桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根。故本题选E。

13.(A1型题)12 下列除哪项外，均是大承气汤主治证的临床表现

- A.腹痛便秘
- B.小便频数
- C.潮热谵语
- D.手足汗出
- E.下利清水

答案：B

解析：①阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。②热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。故本题选B。

14.(A1 型题)15 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- D.柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
- E.半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣

答案：E

解析：半夏泻心汤：半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。小柴胡汤：柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏、生姜、大枣。故本题选 E。

15.(A1 型题)17 小青龙汤和竹叶石膏汤的组成中均含有的药物是

- A.芍药
- B.五味子
- C.半夏
- D.生石膏
- E.竹叶

答案：C

解析：小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。竹叶石膏汤：竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。故本题选 C。

16.(A1 型题)20 清胃散除清胃外，还具有的功效是

- A.滋阴
- B.活血
- C.解毒
- D.止呕
- E.凉血

答案：E

解析：清胃散的功效是清胃凉血。故本题选 E。

17.(A1 型题)22 肝胆湿热下注，阴肿阴痒，小便淋浊，带下黄臭者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：参见 21 题。故本题选 B。

18.(A1 型题)24 理中丸的组成药物中含有

- A.附子
- B.白术
- C.生姜
- D.大枣

E.饴糖

答案：B

解析：理中丸的组成有人参、干姜、甘草、白术。故本题选B。

19.(A1型题)27 脾虚夹湿便溏泄泻者可以选用的方剂是

A.参苓白术散

B.归脾汤

C.生脉散

D.炙甘草汤

E.玉屏风散

答案：A

解析：A 益气健脾，渗湿止泻，适用于脾虚湿盛之证。B 益气补血，健脾养心。C 益气生津，敛阴止汗。D 益气滋阴，通阳复脉。E 益气固表止汗。故本题选A。

20.(A1型题)28 一贯煎的功效是

A.补气养阴

B.补肾益阴

C.滋阴降火

D.补气生津

E.滋阴疏肝

答案：E

解析：一贯煎滋阴疏肝，适用于肝肾阴虚，肝气郁滞证。故本题选E。

21.(A1型题)31 越鞠丸的组成药物中含有

A.苍术、黄柏

B.苍术、厚朴

C.苍术、白术

D.苍术、羌活

E.苍术、川芎

答案：E

解析：越鞠丸的药物组成有香附、川芎、苍术、栀子、神曲。故本题选E。

22.(A1型题)33 朱砂安神丸中，配伍生地、当归的意义是

A.凉血活血

B.滋阴活血

C.凉血补血

D.补血活血

E.滋阴补血

答案：E

解析：朱砂安神丸主治心火亢盛，阴血不足证。方中生地黄甘苦大寒，滋阴清热；当归甘辛苦温，补养心血，配伍生地以补其不足之阴血，共为佐药。故本题选E。

23.(A1型题)35 四神丸的组成药物中含有

A.芡实

- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案：E

解析：四神丸的组成有肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。故本题选E。

24.(A1型题)38 生化汤主治证的病机是

- A.下焦蓄血
- B.血虚受寒
- C.气虚血滞
- D.冲任虚损
- E.血瘀气滞

答案：B

解析：生化汤的病机为血虚寒凝，瘀血阻滞证。主治产后恶露不行，小腹冷痛。故本题选B。

25.(A1型题)40 温经汤的组成药物中含有

- A.丹皮、熟地黄
- B.川芎、丹参
- C.当归、芍药
- D.吴茱萸、干姜
- E.半夏、陈皮

答案：C

解析：温经汤的组成有吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。故本题选C。

26.(A1型题)42 治疗跌打损伤，瘀血留于胁下，痛不可忍的常用方剂是

- A.桃核承气汤
- B.血府逐瘀汤
- C.生化汤
- D.补阳还五汤
- E.复元活血汤

答案：E

解析：复元活血汤主治跌打损伤，瘀血阻滞证。胁肋瘀肿，痛不可忍。本方证因跌打损伤，瘀血滞留胁肋，气机阻滞所致。胁肋为肝经循行之处，跌打损伤，瘀血停留，气机阻滞，故胁肋瘀肿疼痛，甚至痛不可忍。治当活血祛瘀，兼以疏肝行气通络。故本题选E。

27.(A1型题)44 小蓟饮子与八正散相同的功效是

- A.利尿通淋
- B.燥湿解毒
- C.凉血止血
- D.泻火养阴
- E.利湿化浊

答案：A

解析：小蓟饮子凉血止血，利水通淋。八正散清热泻火，利水通淋。故本题选 A。

28.(A1 型题)47 咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案：B

解析：咳血方的组成有青黛、瓜蒌仁、海粉、炒山栀子、诃子。故本题选 B。

29.(A1 型题)49 下列除哪项外，均是地黄饮子所治暗瘵证的临床表现

- A.舌强不能言
- B.足废不能用
- C.高热不能退
- D.口干不欲饮
- E.脉沉细而弱

答案：C

解析：地黄饮子主治下元虚衰、痰浊上泛之暗瘵证。临床表现为舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。故本题选 C。

30.(A1 型题)51 治疗虚劳肺痿，应首先考虑的方剂是

- A.清燥救肺汤
- B.炙甘草汤
- C.麦门冬汤
- D.百合固金汤
- E.养阴清肺汤

答案：B

解析：炙甘草汤具有滋养阴血，益气温阳，复脉止悸功效，能治疗虚劳肺痿，症见咳嗽，涎唾多，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗等。A 主治温燥伤肺证。C 主治由肺胃阴虚，痰涎不化所致的肺痿。D 主治肺肾阴虚，虚火上炎证。E 主治白喉。故本题选 B。

31.(A1 型题)54 藿香正气散的组成药物中，不含有的是

- A.陈皮
- B.枳壳
- C.厚朴
- D.大腹皮
- E.炙甘草

答案：B

解析：藿香正气散主治外感风寒，内伤湿滞证。A 燥湿和胃。C、D 可行气化湿，畅中除满。E 调和诸药。方中无枳壳，有桔梗宣肺理膈，既有益于解表，又有助于化湿。故本题选为 B。

32.(A1 型题)56 止嗽散的功效有

- A.疏表宣肺

- B.泻肺清热
- C.宣肺平喘
- D.疏风清热
- E.理气化饮

答案：A

解析：止嗽散的功效是宣利肺气，疏风止咳。故本题选 A。

33.(A1 型题)58 乌梅丸适用于

- A.久咳
- B.久痢
- C.久疟
- D.久瘀
- E.久痹

答案：B

解析：乌梅丸适用于久泻久痢，多呈脾胃虚寒，肠滑失禁，气血不足而湿热积滞未去之寒热虚实错杂证候，本方集酸收涩肠、温阳补虚、清热燥湿诸法于一方，切中病机，故每可奏效。故本题选 B。

34.(A2 型题)59 患者外感风寒，头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，口不渴，脉浮缓。治疗应选用

- A.麻黄汤
- B.桂枝汤
- C.银翘散
- D.桑菊饮
- E.麻杏甘石汤

答案：B

解析：上述症状为外感风寒、营卫不和所致。外感风邪，风性开泄，卫气因之失其固护之性，“阳强而不能密”，不能固护营阴，致令营阴不能内守而外泄，故恶风发热，汗出头痛，脉浮缓等；邪气郁滞，肺胃失和，则鼻鸣干呕；风寒在表，应辛温发散以解表，但本方证属表虚，腠理不固，故当解肌发表，调和营卫，即祛邪调正兼顾为治。故本题选 B。

35.(A2 型题)61 肠痈初起患者，右少腹疼痛拒按，右足屈而不伸，伸则痛甚，时时发热，身汗恶寒，舌苔黄腻。治疗应首选

- A.仙方活命饮
- B.大黄牡丹汤
- C.普济消毒饮
- D.阳和汤
- E.黄连解毒汤

答案：B

解析：上述症状多由肠中湿热郁蒸，气血凝聚所致。湿热与气血互结成痈，不通则痛，故右少腹疼痛拒按。喜屈右足而不伸，伸则痛剧，是为缩脚肠痈；时时发热，身汗恶寒，是肠痈已成；舌苔黄腻为湿热内蕴之征。本证属于肠痈初起，湿热瘀滞证，治宜泻热破瘀，散结消肿。故本题选 B。

36.(A2 型题)63 患者眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，脉弦长有力。治疗应选用

- A.川芎茶调散
- B.天麻钩藤饮
- C.半夏白术天麻汤
- D.镇肝熄风汤
- E.羚角钩藤汤

答案：D

解析：肝为风木之脏，体阴而用阳，肝肾阴虚，肝阳偏亢，阳亢化风，风阳上扰，故见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面红如醉；肾水不能上济心火，心肝火盛，则心中烦热。治法应以镇肝熄风，滋阴潜阳。故本题选 D。

37.(A2 型题)65 患者，男，58 岁。近日胸膈痞闷，脘腹胀痛，噯腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。治疗应首选

- A.藿香正气散
- B.平胃散
- C.半夏厚朴汤
- D.半夏泻心汤
- E.越鞠丸

答案：B

解析：脾为太阴湿土，居中州而主运化，其性喜燥恶湿，湿邪滞于中焦，则脾运不健，且气机受阻，故见胸膈痞闷，脘腹胀痛；胃失和降，上逆而为呕吐恶心、噯气吞酸；湿为阴邪，其性重着黏腻，故为肢体沉重、怠惰嗜卧。湿邪中阻，下注肠道，则为泄泻。治当燥湿运脾为主，兼以行气和胃，使气行则湿化。故本题选 B。

38.(B 型题)67 患者外感风寒湿邪，恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，治疗应选用

- A.防风通圣散
- B.九味羌活汤
- C.藿香正气散
- D.川芎茶调散
- E.败毒散

答案：B

解析：风寒湿邪侵犯肌表，郁遏卫阳，闭塞腠理，阻滞经络，气血运行不畅，故恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛；里有蕴热，故口苦微渴；苔白或微黄，脉浮是表证兼里热之佐证。治当发散风寒湿邪为主，兼清里热为辅。故 67 题选 B。风寒湿邪袭于肌表，卫阳被遏，正邪交争，故见憎寒壮热，无汗；客于肢体、骨节、经络，气血运行不畅，故头项强痛，肢体酸痛；风寒犯肺，肺气郁而不宣，津液聚而不布，故咳嗽有痰，鼻塞声重，胸膈痞闷；舌苔白腻，脉浮按之无力，正是虚人外感风寒兼湿之佐证。治疗应该散寒祛湿，益气解表。故 68 题选 E。

39.(B 型题)69 蒿芩清胆汤的功效是

- A.和解少阳，内泻热结
- B.和胃降逆，开结除痞

- C.寒热平调，消痞散结
- D.清胆利湿，和胃化痰
- E.理气化痰，清胆和胃

答案：D

解析：蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重，兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故 69 选 D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，具有和解和泻下双重功效。故 70 题选 A。

40.(B 型题)72 肝胆湿热下注，阴肿阴痒，小便淋浊，带下黄臭者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：A 镇肝熄风，滋阴潜阳。B 泻肝胆实火，清下焦湿热，用于肝胆实火上扰之证。C 清热泻火，利水通淋，用于湿热淋证。D 清胆利湿，和胃化痰。E 利湿化浊，清热解毒。

41.(B 型题)74 治疗热邪内陷心包，神昏谵语者，应首选

- A.羚角钩藤汤
- B.紫雪
- C.镇肝熄风汤
- D.苏合香丸
- E.生脉散

答案：B

解析：A 凉肝熄风，增液舒筋。B 清热开窍，熄风止痉，用于温热病，热闭心包及热盛动风之证。C 镇肝熄风，滋阴潜阳。D 芳香开窍，行气止痛。E 益气生津，敛阴止汗。适用于温热、暑热、耗气伤阴证以及久咳伤肺、气阴两虚证。

42.(B 型题)76 四物汤的功效是

- A.补血调血
- B.健脾养心
- C.敛阴止汗
- D.益气健脾
- E.温补肾阳

答案：A

解析：四君子汤益气健脾，适用于脾胃气虚证。四物汤补血和血，调经化瘀，适用于营血虚滞证。

43.(B 型题)78 咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳

E.五味子

答案：B

解析：四神丸的组成有：肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。咳血方的组成有：青黛、瓜蒌仁、海粉、山梔子、诃子。故 77 题选 E，故 78 题选 B。

44.(B 型题)80 患者头痛发热，烦渴欲饮，水入即吐，小便不利，舌苔白，脉浮。治疗应选用

A.猪苓汤

B.五苓散

C.防己黄芪汤

D.实脾散

E.真武汤

答案：B

解析：A 利水，养阴，清热，适用于水热互结证。B 利水渗湿，温阳化气。主治膀胱气化不利之蓄水证。C 益气祛风，健脾利水。D 温阳健脾，行气利水。E 温阳利水。

45.(A1 型题)1 下列关于十二经脉循行走向的描述，正确的是

A.手三阳从头走手

B.手三阳从手走头

C.手三阳从手走胸

D.足三阳从足走头

E.足三阴从胸走足

答案：B

解析：手三阴经络分布于上肢的内侧以及胸部，气血运行按“从胸走手”方向，下接手三阳经；手三阳经络分布在上肢的外侧以及头部，气血运行按“从手走头”方向，下接足三阳经；足三阳经络分布在头、身及下肢的外侧，气血运行按“从头走足”方向，下接足三阴经；足三阴经络分布在下肢的内侧以及胸腹部，气血运行按“从足走腹”方向，下接手三阴，循环往复。故本题选 B。

46.(A1 型题)4 下列腧穴中，属化痰要穴的是

A.丰隆

B.足三里

C.阴陵泉

D.内关

E.百会

答案：A

解析：丰隆和胃气，化痰湿，为化痰要穴；足三里调理脾胃，扶正培元，为保健要穴；阴陵泉运中焦、化湿滞，利水道，主治小便不利，水肿，腹寒胀气等；内关宁心安神，和胃宽胸，降逆止呕，主治失眠健忘，胸闷，胸痛，恶心呕吐等；百会平肝熄风，安神醒脑，开窍明目，升提阳气，主治眩晕，失眠健忘，中风，脱肛等。故本题选 A。

47.(A1 型题)5 下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

A.公孙、内关

B.后溪、申脉

C.足临泣、外关

D.列缺、照海

E.膻中、中脘

答案：A

解析：通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关，通合于心、胸、胃，对于气机不利，气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患，具有理气降逆，通肠和胃，宣通上下的功效，呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等，凡适用于上法者，均可取此二穴施治；通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉，通合于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱，两穴相配，主治头项、耳、目、肩、腰背疾患；通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣，通合于目锐眦、耳后、颈项、肩，二穴配伍，主治耳、目、颈项及肩部病；通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海，通合于肺系、咽喉和胸膈，二穴配伍，主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证；膻中利气，宽胸，催乳，主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等；中脘主治胃部疾患。故本题选A。

48.(A1型题)8 退热，首选的穴位是

A.天枢

B.大椎

C.足三里

D.太溪

E.丰隆

答案：B

解析：大椎解表清热，为退热的要穴；天枢理气消滞，治疗腹胀；足三里调理脾胃，治疗胃脘疾病，也是保健要穴；太溪益肾，用来补肾；丰隆化痰湿，主要用来治疗痰证。故本题选B。

49.(A1型题)10 下列哪项属于表里经配穴

A.咳嗽取尺泽、鱼际

B.感冒取列缺、合谷

C.膝痛取阳陵泉、阴陵泉

D.胃痛取中脘、内庭

E.痛经取地机、隐白

答案：B

解析：列缺为手太阴肺经穴，合谷为手阳明大肠经穴。肺与大肠相表里。故本题选B。

50.(A1型题)12 疼痛在腰脊中部，主要与哪条经脉相关

A.足太阳膀胱经

B.足少阴肾经

C.足少阳胆经

D.带脉

E.督脉

答案：E

解析：腰痛在腰脊正中部，为督脉病证；疼痛部位在腰脊两侧，为足太阳经证。故本题选E。

51.(A2型题)13 患者，男，40岁。突发胃痛，呕吐，腹胀，腹泻。治疗应首选

A.足三里

B.关元

- C.命门
- D.大椎
- E.肾俞

答案：A

解析：关元益肾气，利下焦，回阳救逆，主治真阳不足，下焦虚寒，休克早期等；命门利腰脊，温肾阳，理血，清热，主治腰脊痛，带下，消渴等；大椎升阳益气，退热补虚，主治外感发热，虚汗，盗汗等；肾俞益肾气，利腰脊，聪耳目，主治虚劳腰痛，小便不利，耳鸣等；足三里调理脾胃，降逆利气，扶正培元，主治脾胃疾病。患者胃痛，呕吐，腹胀，腹泻，表现为脾胃疾患，故治疗应首选足三里。故本题选A。

52.(A2型题)16 某男，63岁。头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

答案：D

解析：患者主诉头晕目眩，甚则昏眩欲仆，故可诊断为眩晕。耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细为肾精亏损之象。故治法以益气养血定眩。取穴时除风池、百会、肝俞、肾俞、足三里外，应配以太溪、悬钟、三阴交。故本题选D。

53.(B型题)19 属特殊作用中双相调节作用的是

- A.中脘治疗呕吐
- B.承泣治疗眼病
- C.内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓
- D.合谷治疗牙痛
- E.阿是穴治疗局部疼痛

答案：C

解析：腧穴的远治作用，主要指分布在十四正经四肢部的穴位通过经脉的联系，对头面躯干和内脏疾病起治疗影响。如合谷如位于手部，它不仅能够治疗手部病证，还可以治疗本经手阳明大肠经循行路过的颈部和头面部的病证。A、B、E都是近治作用，C是腧穴的双向调节作用。故18题选D。有些腧穴有特殊的双向调节作用，对机体的不同状态有着双向的良性调节作用，如内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓，针刺天枢既可止泻又可通便。故19题选C。

54.(B型题)21 特定穴中，多用于治疗表里两经病证的是

- A.原穴
- B.郄穴
- C.络穴
- D.井穴
- E.募穴

答案：C

解析：特定穴中，原穴可调整脏腑经络的功能，既可补虚，又可泻实；阴经郄穴有止血作用，

阳经郄穴偏于止痛；络穴一络通二经，即络穴不仅治本经病，也能治其相表里经的病证；井穴具有交通阴阳气血的作用，多用于急救，有开窍醒神，消炎镇痛之效；募穴可治本脏腑病及阳经经络病症。

55.(A1 型题)1 慢性支气管炎风热犯肺证的治法是

- A.清热解毒，泻肺除痰
- B.清热解毒，宣肺化痰
- C.清肺化痰，肃肺止咳
- D.辛凉解表，清肺化痰
- E.疏风清热，润肺止咳

答案：E

解析：风热犯肺证的治法是疏风清热，宣肺止咳。A 多用于治疗水饮停肺证。B 多用于邪毒壅肺证。C 多用于痰热郁肺证。D 多用于风热犯表证。故本题选 E。

56.(A1 型题)3 治疗慢性支气管炎痰湿蕴肺证，宜选用

- A.五苓散
- B.二陈汤
- C.三拗汤
- D.真武汤
- E.香砂六君子汤

答案：B

解析：慢性支气管炎痰浊阻肺证治以化痰燥湿，方用二陈汤合三子养亲汤。A 用于治疗蓄水证。C 用于治疗风寒袭肺证。D 用于治疗阳虚水泛证。E 用于治疗脾胃虚寒证。故本题选 B。

57.(A1 型题)5 哮病发生的病机主要是

- A.肺气虚弱
- B.外邪侵袭于肺，肺气不利
- C.饮食生冷，损伤肺气
- D.痰气相搏，气道被阻
- E.肾不纳气

答案：D

解析：哮病的病理基础是宿痰伏肺，因外邪、饮食、情志、劳倦等诱因引动而触发，以致痰壅气道，肺气宣降功能失常。故本题选 D。

58.(A1 型题)7 肺炎球菌肺炎发病 1~2 天后，其痰液特点

- A.白色黏液痰
- B.黏液泡沫痰
- C.黏液脓性痰
- D.铁锈色痰
- E.大量脓痰

答案：D

解析：肺炎球菌肺炎初期痰色为白色黏液痰或带血丝痰，经 1~2 天后可咳出铁锈色痰，最后进入消散期，痰量多稀薄色黄。B 多见于肺水肿或肺淤血。C 多见于支气管炎或支气管哮喘。E 多见于肺脓肿或支气管扩张。故本题选 D。

59.(A1 型题)9 肺炎热陷心包证，其主要临床表现除发热夜甚外，还有

- A.神昏谵语
- B.口燥咽干
- C.五心烦热
- D.大便秘结
- E.脉洪而数

答案：A

解析：肺炎热陷心包证主要表现为发热夜甚，身灼热，神昏谵语或昏聩不语，口燥咽干，大便秘结，小便短赤，舌绛，无苔或少苔干黄，脉洪而数。C 多是阴虚火旺证。故本题选 A。

60.(A1 型题)11 肺炎球菌肺炎风热犯肺证的治法是

- A.疏风清热，宣肺止咳
- B.清热化痰，宽胸止咳
- C.清热解毒，化痰开窍
- D.益气养阴，回阳固脱
- E.益气养阴，润肺化痰

答案：A

解析：肺炎球菌肺炎的风热犯肺证治以疏风清热、宣肺止咳，方用桑菊饮。B 是痰热壅肺的治法。C 是热闭心神的治法。D 是气阴欲脱的治法。E 是气阴亏虚的治法。故本题选 A。

61.(A1 型题)13 治疗肺结核肺阴亏损证，应首选的方剂是

- A.月华丸
- B.百合固金汤合秦艽鳖甲散
- C.保真汤
- D.补天大造丸
- E.千金苇茎汤

答案：A

解析：治疗肺结核肺阴亏损证，宜滋阴润肺，方用月华丸。B 用于治疗阴虚火旺证。C 治疗气阴耗伤证。D 用于阴阳两虚证。E 用于肺痛。故本题选 A。

62.(A1 型题)15 治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证，应首选的方剂是

- A.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B.血府逐瘀汤
- C.导痰汤
- D.沙参麦冬汤
- E.十枣汤

答案：D

解析：治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证，治以益气养阴，方用沙参麦冬汤。A 用于阴虚毒热证。B 多用于瘀血症。C 用于痰湿毒蕴。E 多用于伏饮积痰证。故本题选 D。

63.(A1 型题)17 慢性心功能不全的基本病因是

- A.严重心律失常
- B.感染

- C.心肌收缩、舒张功能受损
- D.钠盐摄入过多
- E.过度体力劳动

答案：C

解析：此题暂无解析

64.(A1型题)19 心力衰竭之心肾阳虚、痰饮上逆证的治法是

- A.补益心肺，活血通瘀
- B.温补心肾，通阳利水
- C.温补心肾，泻肺逐饮
- D.补益心肺，化痰逐饮
- E.温补心脾，祛痰活血

答案：B

解析：心力衰竭时心肾阳虚、痰饮上逆证的治法是温补心肾、通阳利水。A是心肺气虚血瘀证的治法。C是心肾阳虚，水饮伏肺的治法。D是心肺气虚，痰饮内停证的治法。E是心脾阳虚，痰瘀互结证的治法。故本题选B。

65.(A1型题)21 患者，男，55岁。患慢性冠状动脉供血不足5年。其心电图诊断之一为“Ⅰ度房室传导阻滞(房室传导延缓)”。其心电图表现应为

- A.P波增宽
- B.P-R间期延长
- C.QRS波群时限延长
- D.ST段延长
- E.Q-T间期延长

答案：B

解析：Ⅰ度房室传导阻滞心电图表现为①P-R间期 >0.20 秒；②每个P波后均有QRS波群。A是左房肥大的表现。C多提示心室肥大、心室内传导阻滞及预激综合征等。D、E多提示心肌缺血、心室肥大、心肌损害、心室内阻滞等。故本题选B。

66.(A1型题)23 急性心梗并发心力衰竭，24小时内禁用的是

- A.利尿剂
- B.ACEI
- C.洋地黄
- D.硝酸甘油
- E.硝普钠

答案：C

解析：洋地黄可能引起室性心率失常宜慎用。由于最早期出现的心力衰竭主要是心肌间质充血、水肿引起顺应性下降所致，而左心室舒张末期容量尚不增大，故在急性心梗并发心力衰竭，24小时内禁用洋地黄。故本题选C。

67.(A1型题)24 原发性高血压是指

- A.慢性肾炎引起的高血压
- B.肾动脉狭窄引起的高血压
- C.嗜铬细胞瘤引起的高血压

- D.原发性醛固酮增多症引起的高血压
- E.未明原因的高血压

答案：E

解析：原发性高血压是指原因不明的高血压，而A、B、C、D均是继发性高血压，即血压升高是某些疾病的一种临床表现，本身有明确而独立的病因。故本题选E。

68.(A1型题)26 眩晕肝阳上亢证的治法是

- A.滋阴平肝
- B.补肾填精
- C.平肝潜阳
- D.化痰祛湿
- E.滋阴补阳

答案：C

解析：眩晕肝阳上亢证应治以平肝潜阳。A多用于肝肾阴虚、肝阳上亢证。B多用于肾精不足证。D多用于痰湿阻滞证。E多用于阴阳两虚证。故本题选C。

69.(A1型题)28 治疗高血压病痰湿内盛证，应首选的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.天麻钩藤饮
- E.济生肾气丸

答案：A

解析：治疗高血压病痰湿内盛证，宜燥湿化痰，方用半夏白术天麻汤。B用于痰浊闭阻之胸痹。C多用于寒凝心脉证。D治疗肝阳上亢证。E多用于肾虚水肿证。故本题选A。

70.(A1型题)29 下列各项，除哪项外，均是引起冠心病的原因

- A.情志失调
- B.饮食不当
- C.寒邪内侵
- D.水湿内停
- E.脏气虚衰

答案：D

解析：冠心病相当于中医中的“胸痹”，通常认为其致病因素有年老体虚、饮食不当、情志失调、寒邪内侵致心肝脾肾功能失调，心脉痹阻而产生此病。故本题选D。

71.(A1型题)31 治疗心绞痛寒痰痹阻证，应首选

- A.大七气汤
- B.生脉散合温胆汤
- C.桃红四物汤
- D.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- E.保元汤

答案：D

解析：心绞痛寒痰痹阻证治以温阳泄浊、豁痰开结，方用瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤。A多用

于积聚。B多用于痰热互结伤阴证。C用于血虚血瘀证。E多用于气虚证。故本题选D。

72.(A1型题)35 风湿性心脏瓣膜病心气亏虚型，其治法是

- A.益气养阴
- B.滋阴补阳
- C.滋阴安神
- D.补益心气
- E.滋补肾阴

答案：D

解析：风湿性心脏病心气亏虚证宜治以补益心气。A是气阴两虚证的治法。B是阴阳两虚证的治法。C是虚火扰神的治法。E是肾阴虚证的治法。故本题选D。

73.(A1型题)36 治疗心肌梗死心阳欲脱证，应首选的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.参附龙牡汤
- E.当归四逆汤合苏合香丸

答案：D

解析：治疗心肌梗死心阳欲脱证宜益气温阳，回阳救逆，方用参附龙牡汤。A用于治疗风痰上扰证。B用于治疗痰浊闭阻证。C用于寒凝心脉证。E用于血虚寒厥证。故本题选D。

74.(A1型题)38 治疗慢性浅表性胃炎胃阴不足证应首选

- A.良附丸
- B.保和丸
- C.化肝煎
- D.失笑散
- E.益胃汤

答案：E

解析：慢性浅表性胃炎胃阴不足证，治以滋养胃阴，方用益胃汤。A多用于寒邪客胃证。B多用于饮食停滞证。C多用于肝胃郁热证。D多用于瘀血停滞证。故本题选E。

75.(A1型题)40 消化性溃疡肝胃郁热型的治法是

- A.疏肝理气，和胃止痛
- B.疏肝泻热，和胃止痛
- C.健脾益气，温中和胃
- D.活血化瘀，和胃止痛
- E.养阴益胃，和阳生津

答案：B

解析：消化性溃疡肝胃郁热证治以疏肝泻热、和胃止痛。A为肝胃不和证的治法。C多为脾胃虚寒证的治法。D多是瘀血停滞证的治法。E多为胃阴亏虚证的治法。故本题选B。

76.(A1型题)42 治疗消化性溃疡脾胃虚寒证，应首选

- A.理中丸合黄芪建中汤

- B.一贯煎
- C.化肝煎
- D.失笑散合丹参饮
- E.柴胡疏肝散

答案：A

解析：消化性溃疡脾胃虚寒证治以温中健脾、和胃止痛，方用理中丸和黄芪建中汤。B多用于胃阴亏虚证。C多用于肝胃郁热证。D多用于瘀血阻滞证。E多用于肝气犯胃证。故本题选A。

77.(A1型题)44 消化性溃疡胃阴不足证的治法是

- A.疏肝理气，健脾和胃
- B.温中散寒，健脾和胃
- C.健脾养阴，益胃止痛
- D.清胃泻热，疏肝理气
- E.活血化瘀，通络和胃

答案：C

解析：消化性溃疡胃阴不足证治宜健脾养阴，益胃止痛，方用一贯煎。A治疗肝胃不和证。B治疗脾胃虚寒证。D治疗肝胃郁热证。E治疗瘀阻胃络证。故本题选C。

78.(A1型题)46 胃癌肝胃不和证的治法是

- A.疏肝和胃
- B.理气化痰
- C.健脾和胃
- D.补气养血
- E.消食散结

答案：A

解析：胃癌肝胃不和证治以疏肝理气、和胃止痛。B治疗气滞痰阻证。C治疗脾胃虚弱证。D多治疗气血不足证。E治疗饮食停滞证。故本题选A。

79.(A1型题)48 溃疡型胃癌的胃肠X线，主要表现是

- A.胃壁出现双重阴影
- B.胃壁僵硬
- C.胃腔明显减少
- D.龛影
- E.黏膜皱襞平坦

答案：D

解析：X线检查对胃癌的诊断具有较大的价值。胃癌可表现为龛影。溃疡型胃癌主要发生在肿块上，故其龛影位于胃轮廓之内，龛影直径常大于2.5CM，边缘不整齐，可示半月征。龛影因癌性浸润而使边缘不齐，并为一圆形较透明带所环绕，称为环堤征，临近黏膜僵直，蠕动消失。故溃疡型胃癌的胃肠X线具有特征性。故本题选D。

80.(A1型题)51 确诊早期肝硬化最有价值的检查是

- A.B型超声波
- B.食道钡餐造影

C.CT

D.血清蛋白电泳

E.肝穿刺活体组织学检查

答案：E

解析：A 可提示肝硬化，但不能作为确诊依据，约 1/3 的肝硬化患者超声无异常发现，但可以作为早期筛查方法。B 是诊断门静脉高压的最可靠指标。C 在诊断肝硬化方面意义不大。D 对肝硬化的诊断特异性不高。E 仍是到目前为止诊断肝纤维化的最可靠方法。故本题选 E。

81.(A1 型题)53 肝硬化气滞湿阻证的治法是

A.温补脾肾，通阳利水

B.滋养肝肾，育阴利水

C.活血化瘀，利水消肿

D.运脾利湿，行气化水

E.疏肝理气，行湿散满

答案：E

解析：肝硬化气滞湿阻证常治以疏肝理气、行湿散满。余项参见 52 题。故本题选 E。

82.(A1 型题)54 治疗鼓胀肝肾阴虚型应首选

A.柴胡疏肝散

B.胃苓汤

C.一贯煎合猪苓汤

D.附子理中汤

E.济生肾气丸

答案：C

解析：鼓胀肝肾阴虚证应治以滋养肝肾，育阴利水，方用一贯煎合猪苓汤。A 用于治疗气滞湿阻证。B 用于治疗脾虚湿盛证。D 用于治疗脾肾阳虚证。E 治疗肾虚水肿证。故本题选 C。

83.(A1 型题)56 对于发现早期亚临床型肝癌最有价值的是

A.典型症状

B.AFP(甲胎蛋白)结合 B 超检查

C.典型体征

D.肝炎病史

E.明显消瘦

答案：B

解析：原发性肝癌起病隐匿，早期缺乏典型症状。临床症状明显者，病情多已进入中晚期。AFP 及 B 超现已广泛运用于原发性肝癌的普查、诊断、判断治疗效果及预测复发，是目前肝癌筛查的首选检查方法。故本题选 B。

84.(A1 型题)59 下列各项，对诊断急性肾小球肾炎最有意义的是

A.血尿

B.蛋白尿

C.水肿、高血压

D.血沉增快

E.血清补体 C₃ 下降，在肾炎症状出现后 8 周内恢复正常

答案：E

解析：在链球菌感染后1~3周发生血尿、蛋白尿、水肿和高血压，至少尿及氮质血症等急性肾炎综合征表现，伴血清C₃下降，病情于发病后8周内逐渐减轻到完全恢复正常者，即可诊断为急性肾炎。其中血清C₃的变化，对诊断本病的意义很大。故本题选E。

85.(A1型题)66 中医学认为泌尿系统感染的发病多由于

- A.气火郁于下焦
- B.肾虚下元不固
- C.湿热蕴结下焦
- D.湿热耗伤正气
- E.脾肾亏虚

答案：C

解析：参见65题。故本题选C。

86.(A1型题)69 治疗急性肾盂肾炎下焦湿热型，应首选

- A.知柏地黄汤
- B.猪苓汤
- C.程氏萆薢分清饮
- D.八正散
- E.真武汤

答案：D

解析：急性肾盂肾炎下焦湿热型应治以清热利湿通淋，方用八正散。A用于肝肾阴虚火旺证。B用于水热互结证。C用于膏淋实证。E用于阳虚水泛证。故本题选D。

87.(A1型题)72 丹栀逍遥散合石韦散治疗尿路感染的中医治法是

- A.疏肝理气，清热通淋
- B.清热利湿通淋
- C.健脾补肾
- D.滋阴益肾，清热通淋
- E.清心泻火，利湿通淋

答案：A

解析：丹栀逍遥散合石韦散可疏肝理气，清热通淋。B用八正散。C用无比山药丸。D用知柏地黄丸合猪苓汤。E用八正散。故本题选A。

88.(A1型题)76 下列哪项不是再生障碍性贫血的中医证型

- A.热入营血
- B.气血两虚
- C.阳虚水停
- D.脾肾阳虚
- E.肝肾阴虚

答案：C

解析：再生障碍性贫血即是中医学中的“髓劳”，一般分为热入营血、脾虚血亏证、脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、肾阴阳两虚证、血虚挟瘀证。故本题选C。

89.(A1 型题)79 治疗急性白血病热毒炽盛证，应首选

- A.玉女煎合丹参饮
- B.黄连解毒汤合清营汤
- C.知柏地黄汤合二至丸
- D.温胆汤合桃红四物汤
- E.五阴煎

答案：B

解析：急性白血病热毒炽盛证宜治以清热解毒、凉血止血，方用黄连解毒汤合清营汤。A 多用于阴虚血瘀证。C 多用于肝肾阴虚证。D 多用于痰热瘀阻证。E 多用于真阴亏损、脾虚失血证。故本题选 B。

90.(A1 型题)84 中医学认为，甲状腺功能亢进症的病因不是

- A.外感六淫
- B.饮食不节
- C.禀赋不足
- D.劳倦体虚
- E.情志内伤

答案：A

解析：中医学认为，甲状腺功能亢进的病因主要是情志内伤、饮食及水土失宜，但也与体质因素等有密切关系。故本题选 A。

91.(A1 型题)88 下列关于消渴病机的叙述，错误的是

- A.阴虚为本，燥热为标
- B.气阴两伤或阴阳俱虚
- C.多兼血瘀
- D.变证百出
- E.阴虚湿热

答案：E

解析：中医认为本病基本病机为本虚标实，阴虚为本，燥热为标，迁延日久，阴损及阳，则气阴两伤，阴阳俱虚，阴虚燥热，常见变证百出，此外消渴亦常与血瘀有关。故本题选 E。

92.(A1 型题)92 金匱肾气丸适用于治疗糖尿病的证型是

- A.胃热炽盛
- B.气阴两虚
- C.肺热津伤
- D.阴阳两虚
- E.肾阴亏虚

答案：D

解析：金匱肾气丸能温阳育阴，治疗糖尿病的阴阳两虚证。B 多选用生脉散。E 多选用六味地黄丸。故本题选 D。

93.(A1 型题)96 风湿热风寒湿阻证，治疗应首选的方剂是

- A.蠲痹汤
- B.独活寄生汤

- C.五阴煎
- D.白虎加桂枝汤
- E.防风汤

答案：A

解析：治疗风湿热风寒湿阻，治以祛风化湿，散寒宣痹，方选蠲痹汤加减。B用于风湿热气血两虚。C用于风湿热气阴两虚。D用于风湿热邪痹阻。故本题选A。

94.(A1型题)99 癫痫肝肾阴虚证的治法是

- A.补益肝肾，育阴熄风
- B.健脾和胃，化痰熄风
- C.活血化瘀，通络熄风
- D.清热化痰，熄风定痫
- E.清肝泻火，化痰熄风

答案：A

解析：癫痫肝肾阴虚证的治法宜补益肝肾，育阴熄风，方用左归丸。B为脾虚痰湿证的治法。C为瘀阻清窍证的治法。D为痰热内扰的治法。E为肝郁痰火证的治法。故本题选A。

95.(A1型题)101 下列各项，大脑中动脉病变不会出现的是

- A.病变对侧偏瘫
- B.病变对侧偏身感觉障碍
- C.嗅觉障碍
- D.病变对侧同向偏盲
- E.失语或失认

答案：C

解析：大脑中动脉主干闭塞出现典型的“三偏征”，即病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍和同向偏盲，优势半球病变伴失语。故本题选C。

96.(A2型题)104 患者，女，58岁。咳声重浊，反复发作，咯痰黏稠，色白量多，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉濡滑。其证型是

- A.痰湿蕴肺
- B.寒痰阻肺
- C.燥痰伤肺
- D.痰热郁肺
- E.肝火犯肺

答案：A

解析：患者以痰多色白质黏、胸闷、苔白腻、脉濡滑等为主要表现，因此辨证为痰湿蕴肺证。B型应表现为呼吸急促，喉间有哮鸣音，痰白而黏或稀薄多沫，胸膈满闷如室，面色晦暗带青，苔白滑，脉浮紧等。C以干咳少痰，痰黏难咯，口干咽燥，舌红少苔乏津，脉细数等为主要表现。D以咳嗽吐黄痰，口干，恶心呕吐，腹胀纳呆或腹部胀痛，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数等为主要表现。E主要与情志有密切关系。故本题选A。

97.(A2型题)107 患者，男，23岁。有花粉过敏史。突然出现咳嗽，打喷嚏，呼吸困难，不能平卧，喉中痰鸣，发热，汗出，舌红苔黄，脉弦滑。对诊断最有意义的检查是

- A.肺功能

- B.心电图
- C.血气分析
- D.血常规
- E.痰涂片镜检、培养

答案：A

解析：根据患者花粉过敏病史，及突然咳嗽、打喷嚏、喉中痰鸣等临床症状，高度怀疑此为支气管哮喘急性发作。A 对于急性发作的哮喘病人常明显受限，但属于诊断哮喘的依据。B 无明显意义。C 用于判断哮喘的严重程度。D 为一般检查，对哮喘的诊断意义不大。E 对于哮喘的诊断意义不及肺功能。故本题选 A。

98.(A2 型题)109 患者，男，64 岁。患哮喘 20 年，胸痹 5 年。今日突感鼻痒，随即出现呼吸困难，张口抬肩，汗出。查体：心率 112 次/分，双肺满布哮鸣音。错误的处理是

- A.吸氧
- B.静滴氨茶碱
- C.静滴氢化可的松
- D.口服硝苯地平
- E.皮下注射吗啡

答案：E

解析：支气管哮喘急性发作时处理有①氧疗；②解痉平喘：氨茶碱、抗胆碱药、 β_2 受体激动剂；③纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱；④抗生素；⑤糖皮质激素；⑥其他药物：防治支气管哮喘的药物，如硝苯地平、维拉帕米等。E 多用于治疗心源性哮喘。故本题选 E。

99.(A2 型题)111 患者，女，21 岁。突感胸闷，呼吸困难，大汗。查体：口唇微绀，呼吸急促，听诊双肺布满干啰音，心率 96 次/分。既往有类似发作，有时休息后可缓解。为缓解症状，应首选的措施是

- A.喷吸激素(二丙酸氯地米松)
- B.口服强的松
- C.吸氧
- D.静脉注射安定
- E.吸入沙丁胺醇或舒喘灵气雾剂

答案：A

解析：此患者发病急，以呼吸困难为主要表现，且有该疾病史。考虑是支气管哮喘急性发作。糖皮质激素是目前控制哮喘发作最有效的药物，首选吸入，吸入无效时口服。当糖皮质激素效果不佳时可加 β_2 受体激动剂。故本题选 A。

100.(A2 型题)113 患者，男，25 岁。因淋雨后高热畏寒，今日高热骤降，大汗肢冷，胸痛不止，咳嗽气急，咯铁锈色痰，唇甲青紫，神情淡漠，舌红少津，脉微细欲绝。应首选考虑的是

- A.干性胸膜炎
- B.休克型肺炎
- C.心绞痛
- D.胃溃疡穿孔
- E.急性心肌梗死

答案：B

解析：患者年纪轻，有受凉史，有肺部感染的表现，如咳嗽气急、咯铁锈色痰、胸痛等，另有大汗肢冷、神情淡漠、唇甲青紫、脉微欲绝等外周循环障碍的休克表现，考虑为休克型肺炎。A 以胸痛为主要表现，多无休克表现。C 多能自行缓解，无休克表现。D 以腹膜刺激征为主要表现。E 可有休克表现，但发病多有诱因，且肺部感染不明显。故本题选 B。

101.(A2 型题)116 患者，男，63 岁。因刺激性咳嗽，痰中带血 3 周就诊。气短自汗，纳呆便溏，查痰找到癌细胞，舌淡胖有齿痕，脉沉缓。其证型是

- A.脾肺气虚
- B.肺肾气虚
- C.肺肾阴虚
- D.脾肾阳虚
- E.气血两虚

答案：A

解析：患者已确诊为肺癌。根据气短自汗、纳呆便溏，此患者可辨为脾肺气虚证。B 多表现为短气喘息。C 表现为咳嗽痰少或痰中带血，口燥咽干，或声音嘶哑，腰膝酸软，或见骨蒸潮热，盗汗颧红。D 多表现为泄泻或水肿。E 表现为黏膜皮肤苍白、四肢倦怠、食欲减退、头昏眼花等。故本题选 A。

102.(A2 型题)119 患者，男，53 岁。慢性肺源性心脏病史，咳嗽痰多，色白黏腻，气短喘息，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质淡，苔薄腻，脉滑。其中医治法是

- A.清肺化痰，降逆平喘
- B.涤痰开窍，熄风止痉
- C.温肾健脾，化饮利水
- D.补肺纳肾，降气平喘
- E.健脾益肺，化痰降气

答案：E

解析：本患者症状经辨证属于痰湿阻肺兼脾虚证，故治宜健脾益肺，化痰降气。A 多用于痰热壅盛证。B 多用于痰扰心神证。C 多用于阳虚水泛证。D 多用于肺肾气虚证。故本题选 E。

103.(A2 型题)121 患者，女，23 岁。活动后气促半年。查体：颧部紫红，心尖区听到局限性舒张期隆隆样杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进。应首先考虑的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.二尖瓣关闭不全合并狭窄
- D.主动脉瓣狭窄
- E.肺动脉瓣狭窄

答案：B

解析：此患者颧部紫红，心尖部可听到舒张期杂音即为二尖瓣狭窄的表现。余参见 123 题。故本题选 B。

104.(A2 型题)124 患者，女，35 岁。风湿性二尖瓣闭锁不全 10 年，现下肢水肿，喘促气短，腰膝酸软，形寒肢冷，心悸胸闷，小便短少，舌淡苔腻，脉沉细。治疗应首选

- A.真武汤
- B.葶苈大枣泻肺汤

- C.保元煎
- D.参附汤
- E.通脉四逆汤

答案：A

解析：患者久病伤阳，肾阳虚衰，不能蒸腾气化，水湿内停于下，泛滥肌肤，而见下肢水肿、小便短少。肾虚不纳气而见喘促气短。阳虚温煦失职见腰膝酸软、形寒肢冷。水气凌心，抑遏心阳，则见心悸，水湿内停见胸闷。舌脉均为肾阳虚兼湿停之证，辨证为阳虚水泛，方用真武汤。B用于水饮停肺证。C用于气虚证。D用于阳气虚脱证。E用于阴盛格阳证。故本题选A。

105.(A2型题)127 患者，男，62岁。患高血压病8年，突发气促，端坐呼吸，咯吐粉红色泡沫痰。检查：双肺广泛水泡音，血压160/90mmHg。治疗应首选

- A.氨茶碱
- B.螺内酯（安体舒通）
- C.地高辛
- D.吗啡
- E.多巴酚丁胺

答案：B

解析：参见22题。故本题选B。

106.(A2型题)130 患者，女，65岁。因冠心病心绞痛反复发作3年住院。胸痛绵绵，心悸失眠，气短乏力，潮热多汗，口干，伴头晕耳鸣，舌红少苔，脉细数无力。首选

- A.保元汤
- B.肾气丸
- C.生脉散
- D.大七气汤
- E.温胆汤

答案：C

解析：患者已明确是心绞痛。心气阴虚无以濡养心脉及心神，故见胸痛绵绵、心悸失眠。气虚而见气短乏力多汗，阴虚阴液不足见口干、潮热。舌红少苔、脉细数无力均为气阴两虚的表现。故辨证为气阴两虚证，方用生脉散。A多用于痛疽之气虚证。B多用于肾阳不足证。D多用于积聚证。E多用于痰热内盛证。故本题选C。

107.(A2型题)132 患者，男，65岁。胸闷刺痛，痛有定处，恶心呕吐，口中黏腻，头晕目眩，心悸气短，面部暗青，舌质紫暗，舌体胖大，苔白腻，脉弦滑。其治法是

- A.豁痰化瘀，行气止痛
- B.通阳泄浊，豁痰散结
- C.益气养阴，活血化痰
- D.健脾化湿，祛痰通络
- E.温阳补肾，活血祛痛

答案：D

解析：患者年逾六旬，痰瘀互结，胸阳不运而见胸闷刺痛，痛有定处。胸阳不展心气被遏故见心悸气短。寒湿上泛于口，见口中黏腻。湿聚困脾，致脾失健运，痰湿阻滞中焦而见恶心呕吐，痰湿上泛于清窍而头晕目眩。面部暗青舌质紫暗为血瘀之证，舌苔脉象均为痰瘀阻络

之证。故辨证为脾虚湿阻、痰瘀互结证，治以健脾化湿、祛痰通络。故本题选 D。

108.(A2 型题)134 患者，男，46 岁。心胸阵作隐痛，疾走则发，胸闷气短，动则尤甚，心悸，倦怠无力，神疲懒言，面白易出汗，舌淡胖苔薄白，脉虚细缓。心电图示 ST 段压低，T 波倒置。应考虑的诊断是

- A.心绞痛，心气不足
- B.心绞痛，心阴亏虚
- C.心绞痛，心虚胆怯
- D.心肌梗死，心气不足
- E.心肌梗死，心阴亏虚

答案：A

解析：患者心电图提示心肌缺血，无心肌梗死之症。心气亏虚，致心气鼓动无力，见胸部阵作隐痛。劳则气耗，故见疾走则发、动则尤甚。气虚不能推动营血，而见神疲懒言、倦怠无力、面白。气虚固摄无力而见汗出。舌脉均为气虚之证。辨证为心气不足。故本题选 A。

109.(A2 型题)136 患者，男，70 岁。既往有高血压和糖尿病病史。经常感体乏少力，气短懒言，今洗衣服时突然心前区疼痛，伴有心悸汗出，含服硝酸甘油 2 分钟疼痛缓解。舌淡暗有齿痕，脉沉细。心电图示 V₃~V₆ 导联 T 波倒置。心肌酶谱正常。应首先考虑的诊断是

- A.冠心病心绞痛气虚血瘀证
- B.冠心病心绞痛痰浊内阻证
- C.冠心病心肌梗死气滞血瘀证
- D.冠心病心肌梗死寒凝心脉证
- E.冠心病心肌梗死心肾阳虚证

答案：A

解析：本患者因劳累使心肌张力增加、心肌收缩力增加、心率增快，致心肌耗氧量增加，心肌对血液的需求增加，冠状动脉血流量进一步减少，引起心绞痛。心绞痛疼痛可波及大部分心前区，持续时间为 1~5 分钟，含服硝酸甘油疼痛可缓解。由于患者平时感体乏少力，气短懒言，辨证为气虚型；舌淡暗有齿痕为血瘀之象。故可辨证为气虚血瘀证。故本题选 A。

110.(A2 型题)138 患者，男，60 岁。3 年前患急性广泛性前壁心肌梗死，现又见持续剧烈胸痛，甚则心痛彻背，背痛彻心，形寒肢冷，神疲气怯，伴心悸气促，手足青紫厥冷，舌紫暗苔滑润，脉沉细。其治法是

- A.益气养阴，化痰通络
- B.益气温阳，开痹散寒
- C.温阳泻肺，活血利水
- D.益气温阳，清热祛痰
- E.滋阴逐饮，化痰通络

答案：B

解析：患者有急性心肌梗死病史，且以剧烈胸痛为主证，中医诊断为真心痛。阳虚之体，胸阳不振，阴寒之邪乘虚侵袭，胸阳被遏，导致心脉闭阻而见胸痛剧烈。阳气不能转行于背，故见心痛彻背、背痛彻心。阳虚故见形寒肢冷、神疲气怯。胸阳被遏而见心悸气促。寒主收引见手足青紫厥冷，舌脉亦为阳虚寒凝之证。辨证为心阳虚、阴寒凝滞。治以益气温阳、散寒开痹。故本题选 B。

111.(A2型题)140 患者，女，25岁。风心病二尖瓣狭窄。近来感冒后病情加重，心悸，胸闷，气短，心率110次/分。此外，还可能出现的症状是

- A.呼吸困难，咳嗽，咯血
- B.低热，气急，心尖搏动向左下移动
- C.胸痛，晕厥，水冲脉
- D.枪击音，毛细血管搏动
- E.收缩压高，脉压增大

答案：A

解析：风湿性二尖瓣狭窄常表现为在体力劳动、呼吸道感染、情绪激动或心房颤动时出现端坐呼吸，阵发性夜间呼吸困难和肺水肿。咳嗽、咯血，出血的数量多少不等。查体可见二尖瓣面容，心前区可隆起，心浊音界可能向左扩大。听诊检查心尖区可听到二尖瓣狭窄引致的舒张中晚期隆隆样杂音及开瓣音。C、D、E为主动脉关闭不全的典型表现。故本题选A。

112.(A2型题)142 患者，男，50岁。患萎缩性胃炎15年，并发巨幼红细胞性贫血。其贫血发生的机理，是因为缺乏

- A.铁
- B.盐酸
- C.胆盐
- D.维生素D
- E.内因子

答案：E

解析：慢性萎缩性胃炎因胃黏膜腺体萎缩减少，可以使胃酸和内因子的分泌减少，首先胃酸缺乏，铁吸收减少就会导致贫血，其次因维生素B₁₂的吸收必须有一种称为内因子的物质参与才能完成，内因子由胃黏膜产生，如果内因子缺乏，维生素B₁₂的吸收障碍，也会导致贫血。而巨幼红细胞性贫血主要因缺乏维生素B₁₂或叶酸所致，所以说慢性萎缩性胃炎引起巨幼红细胞贫血主要是因为内因子的缺乏。故本题选E。

113.(A2型题)145 患者，女，24岁。反复饥饿痛、夜间痛1年，再发1周伴呕吐，呕吐物为大量酸臭宿食。查体：心率80次/分，上腹部有振水音。应首先考虑的诊断是

- A.胃窦癌
- B.急性肠梗阻
- C.消化性溃疡合并幽门梗阻
- D.急性胆囊炎
- E.急性胰腺炎

答案：C

解析：患者胃痛特点是饥饿痛，考虑是溃疡。幽门梗阻临床表现主要有：上腹疼痛及饱胀感，多在进食后发生，入晚尤甚，暖气带有臭味。常于餐后上腹疼痛加重，随着胃潴留的出现，变为上腹弥漫性胀痛或饱胀不适。呕吐为幽门梗阻最突出的症状，呕吐多发生在下午和晚间，梗阻程度愈重，呕吐次数愈多。呕吐物含有宿食。患者于呕吐后症状减轻或完全消失，故喜自行诱发呕吐。本患者症状属于此病，诊断为幽门梗阻。故本题选C。

114.(A2型题)150 患者，男，50岁。肝硬化腹水。症见：腹膨大，按之坚满，脘闷腹胀纳呆，大便溏泄，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是

- A.疏肝理气，利湿散满

- B.运脾利湿，化气行水
- C.活血化瘀，利水消肿
- D.调脾行气，清热利湿
- E.温补肾阳，通阳利水

答案：B

解析：脾虚，湿浊中阻则腹胀按之坚满。湿邪伤脾，脾运不健而见脘闷腹胀纳呆。脾运化失职，清气不升，浊气不降，清浊不分，而见小便不利、大便溏泄。舌脉均为湿阻之证。辨证为水湿内停证，治以运脾利湿，化气行水。故本题选B。

115.(A2型题)152 患者，男，52岁。间歇发作右上腹钝痛2个月。实验室检查：甲胎球蛋白310ng/ml。为明确诊断，应首先考虑的检查是

- A.肝功能
- B.癌胚抗原
- C.腹腔镜
- D.B型超声波
- E.腹部X线

答案：D

解析：参见58题。故本题选D。

116.(A2型题)155 患者，男，29岁，浮肿少尿，纳呆泛恶4年。面色晦暗，舌暗红有瘀点，苔薄白，脉弦细。实验室检查：尿蛋白(++++)。治疗应首选

- A.猪苓汤
- B.桂枝茯苓丸
- C.当归芍药散合泽兰汤
- D.五苓散
- E.当归芍药散

答案：C

解析：水湿内停，见浮肿少尿，湿致脾土受困，运化障碍，而见纳呆泛恶。日久阻遏气机，气滞血瘀，而见面色晦暗，舌脉均为瘀血证的表现。辨证为血瘀水阻。故本题选C。

117.(A2型题)158 患者，女，26岁。产后第3天出现寒战，高热，腰痛，下腹痛，排尿痛。检查：肾区叩击痛，耻骨上压痛，尿白细胞30个/高倍视野，尿蛋白(+)，血白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞86%。下列哪项检查对确诊最有帮助

- A.尿细胞计数
- B.尿细菌培养
- C.静脉肾盂造影
- D.膀胱镜检查
- E.肾脏B超

答案：B

解析：妊娠后易发生尿路感染，根据患者的临床表现及尿细胞、尿蛋白阳性及血常规等均提示有感染，故考虑尿路感染。凡有感染症状、腰部不适、尿液改变，若再有真性细菌尿者，就可诊断尿路感染。真性细菌尿的诊断主要依靠尿细菌学检查。故本题选B。

118.(A2型题)162 患者，男，72岁。慢性淋巴细胞白血病1年余，经化疗后病情有缓解。现

症见气短懒言、乏力、低热、手足心热，腰膝酸软，皮肤瘀点、瘀斑，舌淡，脉沉细。治疗应首选

- A.桃红四物汤
- B.四君子汤合沙参麦冬汤
- C.加味瓜蒌散
- D.归脾汤
- E.银翘散

答案：B

解析：气虚而见气短懒言、乏力。肾阴虚而见低热、手足心热、腰膝酸软。阴虚虚热内生，血行较缓，而成瘀滞，溢于皮下而见皮肤瘀点瘀斑。舌脉均为气虚之象，故辨证为气阴两虚证，方用四君子汤合沙参麦冬汤。A 治疗血瘀兼血虚证。C 治疗气血不足、肝气郁结、经脉瘀阻证。D 治疗心脾两虚证。E 治疗风热犯表证。故本题选 B。

119.(A2 型题)164 患者，男，15 岁。反复鼻出血，广泛皮肤紫癜 1 周。检查：肝、脾无肿大，血红蛋白 115g/L，白细胞 $90 \times 10^9/L$ ，血小板 $10 \times 10^9/L$ ，骨髓幼稚型巨核细胞比例增高。其诊断是

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.急性白血病
- C.慢性白血病
- D.再生障碍性贫血
- E.缺铁性贫血

答案：A

解析：患者以出血为主要表现，伴有血小板严重下降及骨髓幼稚型巨核细胞比例增高，可推断为特发性血小板减少性紫癜。B 多以贫血、发热、出血、肝脾肿大等为主要表现，骨髓象提示有核细胞增生明显或轻度活跃。C 以乏力、低热、多汗、消瘦为主要表现，骨髓象示各系细胞极度增生，其中以粒系为主。D 以贫血、发热、出血为主要表现，网织红细胞计数极低。E 主要表现为贫血，铁代谢检查、储备铁检查等有明显下降。故本题选 A。

120.(A2 型题)167 患者，女，40 岁。患有特发性血小板减少性紫癜。下肢皮肤紫斑，月经色紫暗有血块，伴腹痛，头晕目眩，面色黧黑，舌紫暗，脉细涩。治疗应首先考虑的方剂是

- A.归脾汤
- B.桃红四物汤
- C.茜根散
- D.犀角地黄汤
- E.保元汤

答案：B

解析：根据患者临床症状，可辨证为瘀血内阻证，治宜活血化瘀止血，方用桃红四物汤。余参见 169 题。故本题选 B。

121.(A2 型题)169 患者，女，26 岁。心悸，多汗，多食，失眠 2 年。检查：甲状腺 II 度肿大，血管杂音 (-)，尿糖 (+)，血糖正常。对确诊最有意义的检查是

- A.T₃、T₄ 测定
- B.血脂
- C.基础代谢率

D.空腹血糖

E.甲状腺 B 型超声波

答案：A

解析：诊断甲状腺功能亢进症主要有几方面：有甲状腺激素分泌过多证候群、弥漫性甲状腺肿和眼征等表现；血清 FT₄、FT₃ 升高，TSH 下降，TRAb 阳性，这是明确甲亢诊断，尤其是临床表现不典型以及淡漠型甲亢的重要依据。故本题选 A。

122.(A2 型题)171 患者，女，45 岁。患糖尿病 8 年，面色晦暗，消瘦乏力，胸中闷痛，肢体麻木、刺痛，夜间加重，唇紫，舌暗有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选

A.生脉散

B.消渴方

C.桃核承气汤

D.黄连温胆汤

E.桃红四物汤

答案：E

解析：该患者症状以瘀为特点。瘀血内积，气血运行受阻，不通则痛，而见胸中闷痛，肢体麻木、刺痛。夜间阳气不足，推动血行无力，故见夜间加重。血行瘀滞，而见面色晦暗。舌脉亦为血瘀之象。故辨证为瘀阻脉络，治以活血化瘀，方用桃红四物汤。A 治疗气阴两虚证。B 治疗阴虚燥热证。C 治疗瘀热互结证。D 治疗痰热证。故本题选 E。

123.(A2 型题)175 患者，45 岁。患类风湿性关节炎 20 年，反复关节肿痛，渐涩硬变形，屈伸不利，疼痛固定，痛如锥刺，昼轻夜重，口干不欲饮，舌紫暗苔白腻，脉细。治疗应首选

A.蠲痹汤

B.大秦芫汤

C.桃红饮

D.三痹汤

E.独活寄生汤

答案：C

解析：患者痹病日久耗气伤血，损阴伤津致血停为瘀，湿凝为痰，阻闭经络，不通则痛而出现关节肿痛、涩硬变形、屈伸不利、疼痛固定、痛如锥刺。夜间阳气不足，阴气更无力推动血行，血阻更甚而见昼轻夜重。湿邪内聚而见口干不欲饮。舌脉亦为瘀、湿之象，辨证为痰瘀痹阻证，治以化痰行瘀，蠲痹通络，方用桃红饮加味。故本题选 C。

124.(A2 型题)177 患者，男，60 岁。劳动中突发左侧头痛，伴呕吐，面赤，舌强语蹇，舌红苔黄，脉弦数。查体：血压 195/105mmHg，右侧上、下肢瘫痪，右下肢病理反射阳性。应首先考虑的是

A.痫证

B.中风

C.痿证

D.厥证

E.痹证

答案：B

解析：中风是以突然昏厥，不省人事，伴有口眼歪斜，语言不利，半身不遂或仅有半身不遂为主要表现的疾病。其特点是发病急骤，变化迅速。根据患者临床症状，不难诊断为中风。

A、D 多醒后不留有后遗症。C 只是肢体萎废无力。E 只表现为活动不利，无神志等神经系统改变。故本题选 B。

125.(A2 型题)179 患者，女，69 岁。看电视时突然倒地，呼之不应。查体：深昏迷，左侧瞳孔大于右侧瞳孔，血压 170/90mmHg。应首先考虑的是

- A.高血压
- B.脑血栓形成
- C.脑出血
- D.脑栓塞
- E.蛛网膜下腔出血

答案：B

解析：患者发病急，有神志昏迷，血压高，两侧瞳孔大小不等提示出现脑出血、脑血栓、脑肿瘤等，由此推断为脑血栓形成。A 一般不引起神志及瞳孔的改变。C 多在情绪激动或活动时发生。D 无相关病史栓子没有来源。E 多发生在年轻人，且有剧烈头痛。故本题选 B。

126.(A2 型题)181 患者，女，68 岁。既往有高血压病史。今晨起床时发现右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁，舌暗，舌苔薄白，脉浮数。查体：血压 170/80mmHg。头颅 CT 检查未见异常。应首先考虑的诊断是

- A.高血压病痰热腑实，风痰上扰证
- B.高血压病阴虚风动证
- C.高血压病脑出血痰热腑实，风痰上扰证
- D.高血压病脑梗塞风痰瘀血，痹阻脉络证
- E.高血压病脑梗塞肝阳暴亢，风火上扰证

答案：D

解析：本患者未出现头痛症状，因此排除脑出血疾患；而右侧偏瘫，口眼歪斜，言语不利，头晕，手足麻木，肌肤不仁为中风（脑梗塞）的表现。由于患者未出现眩晕的症状，故不属于风痰上扰证；且未出现热证，故不属于风火上扰证。故本题选 D。

127.(B 型题)187 普萘洛尔（心得安）禁用于治疗

- A.心源性哮喘
- B.支气管哮喘
- C.慢性支气管炎
- D.原发性支气管癌
- E.肺脓肿

答案：B

解析：吗啡禁用于慢性阻塞性肺疾患、支气管哮喘、肺源性心脏病；急性左心衰竭晚期并出现呼吸衰竭时忌用。心得安禁用于支气管哮喘、心源性休克、心传导阻滞(II 至 III 度房室传导阻滞)、重度心力衰竭、窦性心动过缓。故 186 题选 B，187 题选 B。

128.(B 型题)190 治疗急性肺水肿，利尿剂应首选

- A.氢氯噻嗪（双氢克尿噻）
- B.呋塞米（速尿）
- C.巯甲丙脯酸（开搏通）
- D.甘露醇

E.氨苯喋啶

答案：B

解析：急性肺水肿发作时，应进行快速利尿，因此选用速尿。充血性心力衰竭时禁用甘露醇，会加重肺淤血或肺水肿。A用于水肿和高血压病人。C用于高血压及心力衰竭病人。E用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水。故190题选B，191题选D。

129.(B型题)193 心房颤动的心房率是

A.80次/分

B.100~150次/分

C.150~350次/分

D.250~300次/分

E.350~600次/分

答案：E

解析：典型房扑的心房率通常是150~350次/分；而正常心率为60~100次/分；心房颤动的心房率是350~600次/分；房速的心房率为150~200次/分。故192题选D，193题选E。

130.(B型题)196 心绞痛遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡暗，苔薄白，脉结代。证属

A.阴寒凝滞

B.心血瘀阻

C.气虚血瘀

D.痰浊内阻

E.气阴两虚

答案：C

解析：心绞痛遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡为气虚证；舌暗，脉结代属于血瘀证，辨为气虚血瘀证，治以补气活血。痰浊盘踞，胸阳失展，故胸闷痛如室；脾主四肢，痰浊困脾，脾气不运，故肢体沉重；舌苔浊腻，脉滑为痰浊内阻之象。治宜通阳泄浊，豁痰开窍，方用瓜蒌薤白白酒汤。故196题选C，197题选D

131.(B型题)199 治疗真心痛之气阴亏损、心络瘀阻型，应首选

A.生脉散合血府逐瘀汤

B.柴胡疏肝散

C.参附龙牡汤合桃红饮

D.当归四逆汤

E.参附汤合枳实薤白桂枝汤

答案：A

解析：真心痛之阳气虚衰、寒凝心络型，应治以温补肾阳、散寒通络，方用参附汤合枳实薤白桂枝汤。气阴亏损、心络瘀阻型应治以益气养阴、活血通络，方用生脉散合血府逐瘀汤。B多用于肝郁气滞证。C多用于虚阳浮越之痹证。D多用于血虚寒厥证。故198题选E，199题选A。

132.(B型题)201 治疗风心病心肾阳虚证，应首选

A.保元汤

B.天王补心丹

C.真武汤

D.苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤

E.五味子汤合桃仁红花煎

答案：C

解析：风心病水气凌心射肺证，应治以温阳化气，泻肺利水，方用苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。心肾阳虚证，治以温补心肾，方用真武汤。A多用于气虚证。B多用于心肾阴虚证。E多用于肺气不足证。故200题选C，201题选D。

133.(B型题)204 治疗消化性溃疡肝胃不和证，应首选

A.柴胡疏肝散合五磨饮子

B.黄芪建中汤

C.一贯煎合芍药甘草汤

D.化肝煎合左金丸

E.活络效灵丹合丹参饮

答案：A

解析：治疗消化性溃疡肝胃不和证，宜疏肝和胃，方用柴胡疏肝散合五磨饮子；治疗消化性溃疡脾胃虚寒证，宜温补脾胃，方用黄芪建中汤。C治疗胃阴亏虚证。D治疗肝胃郁热证。E治疗瘀阻胃络证。故204题选A，205题选B。

134.(B型题)206 与雌激素增加有关的肝硬化，可见

A.贫血

B.出血倾向

C.腹水

D.肝昏迷

E.蜘蛛痣

答案：E

解析：肝硬化时，肝脏对雌激素的灭活能力下降，故男性可见性功能减退，男性乳房发育，女性可发生闭经、不孕，皮肤可见蜘蛛痣、肝掌等。肝硬化时，肝脏对氨的代谢能力明显减退，血氨浓度升高，氨能干扰脑细胞的代谢，而易发展为肝性脑病，表现为肝昏迷。A多是出血后引起的。B多与肝脏合成凝血因子减少及脾功能亢进有关。C多由于门静脉高压引起。故206题选E，207题选D。

135.(B型题)208 急性胰腺炎肝郁气滞证，治疗应首选的方剂是

A.小柴胡汤

B.清胰汤合龙胆泻肝汤

C.大承气汤

D.桃仁承气汤

E.大柴胡汤

答案：A

解析：A用于急性胰腺炎肝郁气滞证。B用于急性胰腺炎肝胆湿热证。C用于急性胰腺炎肠胃热结证。D、E均不是急性胰腺炎的适用方。故208题选A，209题选B。

136.(B型题)210 慢性肾小球肾炎普通型的特点是

A.中度蛋白尿

- B.贫血及高脂血症
- C.中度以上舒张压升高
- D.全身高度水肿，血脂增高
- E.肾衰竭

答案：A

解析：慢性肾小球肾炎分为五型。其中普通型较为常见，病程迁延，病情相对稳定，多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害，尿蛋白（+~+++），离心尿红细胞>10个/高倍视野和管型尿等。而肾病型除具有普通型的表现外，主要表现为肾病综合征，24h尿蛋白定量>3.5g，血清白蛋白低于30g/L，水肿一般较重和伴有或不伴高脂血症。B是肾病综合征的特点。C是高血压型的特点。E是急性发作型的特点。故210题选A，211题选D。

137.(B型题)213 对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

- A.24小时尿蛋白定量
- B.尿培养及菌落计数
- C.肾功能检查
- D.摄腹部平片
- E.静脉肾盂造影

答案：B

解析：肾病综合征诊断要点为①大量蛋白尿>3+，24h尿蛋白定量>3.5g；②血浆白蛋白≤30g/L；③血脂升高；④浮肿可轻可重。以上①②为必备条件，因此对尿蛋白的定量是最有意义的。而诊断泌尿系感染，取清洁中段尿行细菌培养、菌落计数及药物敏感度测定，革兰阴性杆菌菌落计数≥10万/ml者有诊断意义。故212题选A，213题选B。

138.(B型题)215 水肿的治疗原则中，“开鬼门”是指

- A.逐水
- B.降浊
- C.利尿
- D.通下
- E.发汗

答案：E

解析：内经中提到水肿的治疗原则有洁净府、开鬼门及去菀陈莖。其中“洁净府”意指利尿，“开鬼门”意指发汗，“去菀陈莖”原意为去瘀阻，现意指攻下逐水。故214题选C，215题选E。

139.(B型题)217 再生障碍性贫血的关联脏腑是

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.骨髓
- D.心、肝、脾、肾
- E.肺、心、脾、肾

答案：D

解析：再障属于中医“虚劳”、“髓劳”、“髓枯”范畴。病变部位在骨髓，与肾脏的关系密切。其病机主要为热入营血、脾虚失摄、脾肾阳虚和肝肾阴虚。故216题选C，217题选D。

140.(B型题)220 慢性粒细胞性白血病阴血亏虚证的治法是

- A.补气养血
- B.滋阴补血
- C.补肾助阳
- D.滋阴降火
- E.活血化瘀

答案：B

解析：慢性粒细胞阴血亏虚证治以滋阴补血，瘀血内阻证治以活血化瘀。A用于气血两虚证。C用于肾阳亏虚证。D用于阴虚火旺证。故220题选B，221题选E。

141.(B型题)222 抗血小板抗体增加，见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.慢性粒细胞白血病

答案：A

解析：抗血小板抗体增加常见于原发性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、败血症、高 γ 球蛋白血症、肝病、母婴血小板不合等。造血原料缺乏常见于缺铁性贫血。故222题选A，223题选C。

142.(B型题)225 正常白细胞减少，骨髓中异常原始细胞大量增殖并浸润各器官组织，见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.急性白血病

答案：E

解析：特发性血小板减少性紫癜血象表现为急性型发病时血小板计数可明显减少，常低于 $20 \times 10^9/L$ ；慢性血小板计数一般在 $50 \times 10^9/L$ 左右。骨髓象表现为急性型骨髓巨核细胞正常或增多，幼稚型巨核细胞比例增多，体积小，无血小板形成；慢性型骨髓巨核细胞增多，以颗粒型巨核细胞增多为主，体积正常，血小板形成减少。急性白血病血象表现为贫血一般呈正细胞正色素型，网织红细胞计数减少，也有轻度增高者。血小板计数大多降低，白细胞一般早期常偏低。骨髓象表现为有核细胞增生明显或轻度活跃，具有决定性诊断价值。故224题选A，225题选E。

143.(B型题)227 治疗糖尿病气阴两虚证，应首选

- A.消渴方合玉女煎
- B.生脉散合六味地黄丸
- C.金匱肾气丸
- D.桃红四物汤
- E.生脉散合参附汤

答案：B

解析：糖尿病阴虚热盛证治以清热生津止渴，方用消渴方合玉女煎。气阴两虚证治以补气滋

阴，方用生脉散合六味地黄丸。C用于阴阳两虚证。D用于气滞血瘀证。E用于阴阳衰微证。故226题选A，227题选B。

144.(B型题)229 糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者，治疗应首选

- A.六味地黄丸
- B.杞菊地黄丸
- C.六味地黄丸合生脉散
- D.知柏地黄丸
- E.金匱肾气丸

答案：B

解析：糖尿病气阴两虚证治以益气养阴，方用六味地黄汤合生脉散。糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者，因其主要病机为肝肾精血不足，不能上承耳目所致，宜滋补肝肾、益精补血，方用杞菊地黄丸加减。故228题选C，229题选B。

145.(B型题)231 糖尿病阴阳两虚，治疗首选

- A.生脉散
- B.桃红四物汤
- C.金匱肾气丸
- D.消渴方
- E.归脾汤

答案：C

解析：此题暂无解析

146.(B型题)233 脑血栓形成急性期的血液稀释疗法，应首选

- A.甘露醇
- B.低分子右旋糖酐
- C.川芎嗪
- D.阿司匹林
- E.肝素

答案：B

解析：脑CT显示基底节区低密度影及周围有水肿带，视神经乳头水肿提示脑梗死，并有颅内压增高的表现。故治以降低颅内压，选用甘露醇。而脑血栓形成急性期的血液稀释法，选用低分子右旋糖酐，可以扩充血容量，降低血液黏滞性，改善微循环。C有抗血小板聚集作用，可用于脑血栓形成，但不属于血液稀释疗法。D对血小板聚集有抑制作用，阻止血栓形成，临床常用于预防暂时性脑缺血发作。E有较强抗凝血作用，对无出血倾向者，可采用此法。故232题选A，233题选B。

147.(B型题)235 患者起病急，头痛重，伴有呕吐，意识障碍，克匿格征阳性。应首先考虑的是

- A.短暂性脑缺血发作
- B.脑血栓
- C.脑栓塞
- D.脑出血
- E.蛛网膜下腔出血

答案：E

解析：患者有长期卧床史，突发意识障碍、偏瘫及偏身感觉障碍。长期卧床易使血液高凝，而形成栓子，故首先考虑脑栓塞。而患者起病急，以头痛为主要表现，伴有呕吐、脑膜刺激征，亦不难判断为蛛网膜下腔出血。故 234 题选 C，235 题选 E。

148.(A1 型题)1 在下列外科致病因素中，毒蛇咬伤属于

- A.外感六淫
- B.外来伤害
- C.情志内伤
- D.房室损伤
- E.感受特殊之毒

答案：E

解析：特殊之毒包括虫毒、蛇毒、疯犬毒、药毒、食物、疫毒。故本题选 E。A 包括风、寒、湿、燥、火。B 包括直接伤害人体的理化因素，如跌仆损伤、沸水、寒冷等。C 包括喜、怒、忧、思等超过人体调节的情志活动。D 是指房事过度所致的损伤。

149.(A1 型题)4 下列损伤按致伤因素分类，错误的是

- A.机械性
- B.物理性
- C.化学性
- D.车祸性
- E.生物性

答案：D

解析：损伤按致伤因素分类可分为机械性、物理性、化学性、生物性四类。故本题选 D。

150.(A1 型题)8 补托法的代表方剂是

- A.透脓散
- B.托里消毒散
- C.异功散
- D.四君子散
- E.右归丸

答案：B

解析：补托法分益气托毒法和温阳托毒法，益气托毒法的代表方剂是托里消毒散。透脓散是内托法的代表方剂。异功散是调胃法的代表方剂。四君子散是补益法益气方的代表方剂。右归丸是补益法助阳方的代表方剂。故本题选 B。

151.(A1 型题)13 治疗肿疡期肿而有结块，应选用的药物是

- A.生肌白玉膏
- B.金黄膏
- C.九一丹
- D.无极膏
- E.皮质类固醇激素软膏

答案：B

解析：金黄膏适用于阳证，肿疡、肛门周围痈疽，具有清热解毒、消肿散结的作用。而生肌

白玉膏用于一切溃疡或烧伤，腐肉未脱，新肉未生，或日久不能收口。九一丹、无极膏拔脓祛腐，用于疮疡溃破之初。故治疗肿疡期肿而有结块，用金黄膏。故本题选 B。

152.(A1 型题)17 婴儿面部的皮肤消毒，应采取

- A.2.5%碘酊擦涂 2 次
- B.0.75%碘酊擦涂 2 次
- C.0.1%新洁尔灭擦涂 2 次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂 1 次
- E.70%酒精擦涂 1 次

答案：C

解析：对婴儿、口腔、肛门、外生殖器、面部皮肤等不能使用碘酊消毒处，可选用 0.1%新洁尔灭，0.1%洗必泰，0.1%硫柳汞酊，0.75%PVP-I 等涂擦 2~3 遍，以免刺激皮肤或黏膜。故本题选 C。

153.(A1 型题)20 下列各项，不属局部麻醉的是

- A.局部浸润麻醉
- B.静脉麻醉
- C.表面麻醉
- D.区域阻滞麻醉
- E.神经阻滞麻醉

答案：B

解析：局部麻醉包括表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞麻醉、神经阻滞麻醉。静脉麻醉属全身麻醉中的非吸入性麻醉。故本题选 B。

154.(A1 型题)23 正常成人每日所需的水量是

- A.500~1000ml
- B.1000~1500ml
- C.1500~2000ml
- D.2000~2500ml
- E.2500~3000ml

答案：D

解析：正常成人 24 小时出入量 2000~2500ml。故本题选 D。

155.(A1 型题)27 急性呼吸性酸中毒最先应进行的治疗是

- A.肺部感染，使用大量抗生素
- B.进行人工呼吸
- C.应用呼吸中枢兴奋剂
- D.解除呼吸道梗阻，改善肺通气功能
- E.给予碱性液体

答案：D

解析：急性呼吸性酸中毒患者机体对呼吸性酸中毒的代偿能力较差，而且常合并存在缺氧，对集体的危害性极大，因此除需要治疗原发病因之外，还要采取积极措施改善病人的通气功能。故本题选 D。

156.(A1 型题)30 脾破裂可引起的休克是

- A.感染性
- B.过敏性
- C.损伤性
- D.失血性
- E.疼痛性

答案：D

解析：失血性休克常见病因有上消化道出血、宫外孕破裂出血、动脉瘤破裂以及肝、脾和大动脉破裂出血，脾破裂会导致大量血液流失，容易致失血性休克。感染性休克系因外科脓毒血症和败血症引起的休克。过敏性休克多发生于对青霉素、普鲁卡因、血清制剂和疫苗过敏者。损伤性休克常见病因有严重烧伤、骨折、内脏损伤、软组织挤压伤。疼痛性休克常因剧烈疼痛而引起。故本题选 D。

157.(A1 型题)34 急性硬膜外血肿典型的意识改变是

- A.伤后昏迷-清醒-再昏迷
- B.持续性昏迷
- C.伤后无昏迷
- D.短暂昏迷
- E.持续深昏迷

答案：A

解析：硬脑膜外血肿的典型意识改变是有中间清醒期，即昏迷-清醒或好转-再昏迷。故本题选 A。

158.(A1 型题)37 有头疽的致病菌主要是

- A.大肠杆菌
- B.类杆菌
- C.变形杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.溶血性链球菌

答案：D

解析：一般化脓性感染多为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。而有头疽的致病菌主要是金黄色葡萄球菌。皮下蜂窝组织炎多为溶血性链球菌致病。故本题选 D。

159.(A1 型题)41 外科感染应用抗生素的原则是

- A.选择抗革兰阳性菌的抗生素
- B.选择抗革兰阴性菌的抗生素
- C.选择广谱抗生素
- D.根据病灶细菌培养和药物敏感试验选用抗生素
- E.早期、大剂量使用抗生素

答案：D

解析：外科感染应用抗生素要根据细菌培养及抗生素敏感试验结果指导选用抗菌药物，尽量停用广谱抗生素，改用对感染有效的窄谱抗生素。故本题选 D。

160.(A1 型题)45 治疗急性阑尾炎瘀滞证，应首选青霉素加

- A.五味消毒饮
- B.阑尾化瘀汤
- C.阑尾清化汤
- D.阑尾清解汤
- E.黄连解毒汤

答案：B

解析：急性阑尾炎瘀滞证治宜行气活血，通腑泻热。应选用阑尾化瘀汤。故本题选B。

161.(A1型题)49 治疗肠梗阻痞结证，应首选

- A.调胃承气汤
- B.大承气汤
- C.小承气汤
- D.增液承气汤
- E.大黄牡丹皮汤

答案：B

解析：肠梗阻痞结证治宜清热通里攻下，当选大承气汤。故本题选B。

162.(A1型题)53 手术治疗乳晕部浅表脓肿，切口应在

- A.脓肿最软处作纵形切口
- B.脓腔最低位作放射状切口
- C.沿乳晕边缘作弧形切口
- D.波动感最明显处作斜形切口
- E.脓肿最高处作纵形切口

答案：C

解析：乳晕下脓肿应沿乳晕边缘作弧形切口。故本题选C。

163.(A1型题)57 膀胱结石的主要症状是

- A.尿频、尿急
- B.脓尿
- C.尿痛
- D.排尿中断
- E.血尿

答案：D

解析：膀胱结石典型症状为排尿突然中断，并感疼痛。尿频、尿急、尿痛为膀胱刺激征，与血尿、脓尿均见于尿路感染。故本题选D。

164.(A1型题)61 下列哪种疾病的早期可出现无症状性全程血尿

- A.膀胱炎
- B.前列腺炎
- C.肾癌
- D.膀胱结核
- E.膀胱结石

答案：C

解析：肾癌多见突发性无痛全程血尿。前列腺炎除血尿外还伴见疼痛和尿路刺激症状。膀胱

炎和膀胱结核伴膀胱刺激征。膀胱结石主要症状为排尿中断，并感疼痛，少见血尿。故本题选 C。

165.(A1 型题)65 脑复苏的主要治疗措施不包括

- A.巴比妥类药物治疗
- B.抗生素类药物治疗
- C.钙离子拮抗药治疗
- D.高压氧治疗
- E.低温-脱水疗法

答案：B

解析：脑复苏的主要治疗措施包括：巴比妥类药物治疗、钙离子拮抗药治疗、高压氧治疗、低温-脱水疗法以及其他药物治疗（皮质激素、自由基清除剂、催醒药、脑细胞营养药等）。故本题选 B。

166.(A2 型题)67 患者，女，35 岁。左腋下化脓性淋巴结炎溃破，疮口仍有较多脓腐。治疗应首选

- A.白降丹
- B.三石散
- C.九一丹
- D.平胬丹
- E.五五丹

答案：A

解析：白降丹为腐蚀药，适用于溃疡疮口太小、脓腐难去者。三石散为清热收涩药，适用于急性皮肤病渗液不多者。九一丹和五五丹为提脓祛腐药，适用于溃疡初期腐肉不脱、新肉不生者。平胬丹属平胬药，具平复胬肉作用，能使疮口增生的胬肉回缩。故本题选 A。

167.(A2 型题)71 患者，72 岁。烧伤 1 周后，神识淡漠，面色苍白，呼吸急促，口唇淡紫，体温 36.5℃，四肢厥冷，脉细缓。其证型是

- A.气阴两伤
- B.阴损及阳
- C.胃阴伤败
- D.气血两亏
- E.热入营血

答案：B

解析：阴损及阳证表现为面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，自汗肢冷，体温不升反降，脉细缓。气阴两伤证表现为精神疲倦，气短懒言，口干喜饮，自汗，盗汗，舌淡苔少，脉细弱。胃阴伤败证表现为面色萎黄，纳呆食少，腹胀便溏，口干少津或口舌生糜，舌干红，苔花剥或无苔，脉细数。气血两亏证表现为神疲倦卧，气短懒言，形体消瘦，面色无华，创面愈合迟缓，舌淡，苔薄白或薄黄，脉细弱。热入营血证表现为壮热躁动，口干唇燥，大便秘结，小便短赤，舌红绛而干，苔黄或黄糙或焦干起刺，脉洪数。故本题选 B。

168.(A2 型题)74 患者，男，20 岁。初起颜面部红肿热痛，肿势局限，可见一个脓头，3~5 日化脓，出脓即愈。应首先考虑的是

- A.疔

- B.痈
- C.急性淋巴管炎
- D.急性淋巴结炎
- E.痤疮

答案：A

解析：疔的局部症状为初起有红、肿、热、痛的小结节，逐渐肿大，数天后脓栓脱落，脓液排出，炎症随之消退而愈。痈早期在局部呈片状稍隆起的紫红色浸润区，随后中央形成多个脓栓，破溃后呈蜂窝眼状，相当于中医的有头疽。急性淋巴管炎浅部见一条或数条“红线”，硬且明显压痛，深部肢体明显肿胀和压痛，淋巴管走行部位压痛更明显。急性淋巴结炎早期有局部淋巴结肿大和压痛，后局部红肿热痛加剧。痤疮初为坚实丘疹，挤之有白色粉样物质，反复挤压形成大小不等的结节，病程较长。故本题选A。

169.(A2型题)77 患者，男，41岁。头面丹毒，红肿，恶寒发热，口渴，便秘溲黄，舌红苔黄，脉洪数。其证型是

- A.风热化火
- B.气血两燔
- C.湿热化火
- D.热毒蕴结
- E.热毒入营

答案：A

解析：丹毒风热化火证发于头面部，发热恶寒，口干舌燥，舌红，苔薄黄，脉洪数。故本题选A。

170.(A2型题)81 患者，男，38岁。转移性腹痛2天。检查：全腹压痛、反跳痛及轻度肌紧张，肠鸣音减弱，舌红苔黄腻，脉洪数。其治法是

- A.通里攻下，泻火解毒
- B.活血化瘀，疏肝理气
- C.活血化瘀，行气止痛
- D.清营解毒，泻热养阴
- E.理气开郁，疏肝利胆

答案：A

解析：该患者辨证为急性腹膜炎胃肠实热证，故治宜通里攻下，泻火解毒。故本题选A。

171.(A2型题)84 患者，男，32岁。酗酒后突感左上腹剧痛，并向左腰部放射，伴发热，恶心呕吐。查体：腹平软，左上腹呈束带式压痛，肝、脾不大。应首先考虑的是

- A.现为右上腹阵发性绞痛。C伴腹泻。D腹部无压痛，查心电图及心肌酶谱等可鉴别。E为中上腹持续性剧痛，与酗酒无关。
- B.急性胰腺炎
- C.急性肠炎
- D.心肌梗死
- E.急性胃炎

答案：B

解析：急性胰腺炎腹痛剧烈，起始于中上腹，也可偏重于右上腹或左上腹，放射至背部，累及全胰则呈腰带状向腰背部放射痛，伴恶心、呕吐、腹胀，可有发热、腹膜炎体征、黄疸等。

172.(A2型题)87 患者，女，26岁。左侧急性乳腺炎7天，现左乳房红肿，疼痛剧烈，呈持续性搏动性疼痛，伴高热，口渴喜饮，舌苔黄，脉弦数。其治法是

- A.疏肝清胃，通乳散结
- B.清热解毒，通乳透脓
- C.疏肝理气，化痰软坚
- D.调理气血，通乳散结
- E.行气活血，软坚散结

答案：B

解析：此为急性乳腺炎热毒炽盛证，且乳房里脓肿已成，治法应清热解毒，通乳透脓。故本题选B。

173.(A2型题)90 患者，女，21岁。发现右侧乳腺外上象限一单个肿块3个月，呈卵圆形，约4cm×5cm大小，表面光滑，边缘清楚，质地坚韧，易推动，无压痛。应首先考虑的是

- A.急性乳腺炎
- B.乳腺囊性增生病
- C.乳腺纤维腺瘤
- D.乳房结核
- E.乳腺癌

答案：C

解析：乳腺纤维腺瘤肿块较硬，边界清楚，表面光滑，活动度好，无压痛。急性乳腺炎包块边界不清，活动不受限，有明显疼痛。乳腺囊性增生病肿块边界不清，质韧，推之可移，有压痛。乳房结核肿块质硬，边界不清，往往和皮肤有粘连。乳腺癌肿块质硬，活动性差，边界不清。故本题选C。

174.(A2型题)93 患者，女，45岁。1周前发现右乳外上结节，直径约2.5cm，较硬，不易推动，无压痛，乳头轻度内陷，皮肤呈橘皮样，右侧腋下触及一直径0.8cm的淋巴结，表面光滑，活动度好。应首先考虑的中医诊断是

- A.乳癖
- B.乳核
- C.乳岩
- D.乳癆
- E.乳痈

答案：C

解析：乳腺癌包块质硬，表面不光滑，边界不清，活动度差，无压痛，局部皮肤可有酒窝征，橘皮样改变，乳头可内陷、溢液，乳腺癌相当于中医学上的乳岩。乳腺囊性增生病，属于中医乳癖。乳房纤维腺瘤属中医乳核范畴，肿块圆形，表面光滑，边界清楚，活动度大。乳癆是乳房部的慢性化脓性疾病，相当于西医的乳房结核，肿块边界不清，皮肉相连，日久破溃。乳痈是指乳房部的急性化脓性病变。故本题选C。

175.(A2型题)96 患者，男，45岁。既往有溃疡病史。突然大量呕血，面色苍白，冷汗出，手足冷，表情淡漠，舌淡苔白，脉细无力。其中医治法是

- A.清胃泻火
- B.益气固脱

- C.清肝泻火
- D.益气健脾
- E.温经散寒

答案：B

解析：患者因大量呕血导致气血不足，出现虚脱的症状，宜益气固脱，方用独参汤。故本题选B。

176.(A2型题)99 患者，男，32岁。阴囊潮红，睾丸肿痛2天，伴发热恶寒，舌红苔黄腻，脉弦数。其治法是

- A.清热利湿，解毒消肿
- B.疏肝解毒，活血散结
- C.疏肝解郁，清热消肿
- D.凉血解毒，活血散结
- E.扶正托毒，散结解毒

答案：A

解析：据患者症状可诊断为睾丸炎湿热下注证，治宜清热利湿，解毒消肿。故本题选A。

177.(A2型题)102 前列腺增生症患者，小便点滴不尽，小腹胀满疼痛，舌质紫暗，脉涩。治疗应首选

- A.五神汤加减
- B.枸橘汤加减
- C.抵当丸
- D.龙胆泻肝汤
- E.知柏地黄丸

答案：C

解析：此属前列腺增生血瘀证，法应活血化瘀止痛，选用抵当丸。故本题选C。

178.(A2型题)105 患者Ⅱ期内痔，便血鲜红，便时有物脱出，口渴，大便秘结，舌苔黄，脉数。治疗应首选

- A.龙胆泻肝汤
- B.五神汤
- C.归脾汤
- D.小承气汤
- E.凉血地黄汤

答案：E

解析：此属Ⅱ期内痔热伤肠络证，法应清热凉血，选用凉血地黄汤。故本题选E。

179.(B型题)106 外科疾病中，风痛的特点是

- A.痛无定处，忽此忽彼，走注甚速
- B.皮色不红，不热，酸痛，得暖则痛缓
- C.灼热疼痛，遇冷则痛减
- D.肿势急胀，痛无止时，如有鸡啄，按之中软应指
- E.皮色紫暗而胀痛

答案：A

解析：风痛特点为痛无定处，忽彼忽此，走注甚速。化脓痛的特点为痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指。B为寒痛特点。C为热痛特点。E为瘀血痛特点。故106题选A，107题选D。

180.(B型题)109 清热法的代表方是

- A.荆防败毒散
- B.托里消毒散
- C.五味消毒饮
- D.龙胆泻肝汤
- E.香贝养营汤

答案：C

解析：托里消毒散是益气托毒法代表方，用于肿疡毒势方盛，正气已虚，不能托毒外出。五味消毒饮是清热解毒法的代表方，用于热毒之证。A是解表法中辛温解表法的代表方。D是理湿法之清热利湿法的代表方。E是祛痰法之养营化痰法的代表方。故108题选B，109题选C。

181.(B型题)112 口腔黏膜消毒，应首选

- A.甲醛
- B.石炭酸
- C.0.1%新洁尔灭
- D.0.5%亚硝酸钠
- E.2.5%碘酊

答案：C

解析：口腔黏膜消毒应选用0.1%新洁尔灭，皮肤消毒一般选用2.5%碘酊。故112题选C，113题选E。

182.(B型题)114 椎管内麻醉平面过高，可致

- A.血压下降
- B.呼吸抑制
- C.恶心呕吐
- D.头痛
- E.尿潴留

答案：A

解析：血压下降常发生于麻醉范围过广或高部位阻滞。呼吸抑制多见于高位硬膜外阻滞。恶心呕吐常由于血压骤降或手术牵拉内脏引起。头痛与脑脊液由针眼不断外渗到硬膜外腔有关，是椎管内麻醉的常见术后并发症。尿潴留是因支配膀胱排尿功能的神经恢复最慢或伤口致膀胱括约肌反射性痉挛。故114题选A，115题选D。

183.(B型题)117 在短时间内输入所需血量者，适用于

- A.大出血
- B.中度缺水
- C.纠正贫血和低蛋白血症
- D.严重感染
- E.凝血异常

答案：A

解析：单纯贫血者应输红细胞混悬液，合并低蛋白血症者宜用全血，输血量取决于红细胞丢失的程度。急性大量失血患者应迅速恢复血容量并输红细胞。凝血异常除输新鲜血外，更重要还要输有关的凝血因子。严重感染要替换血液中的有害物质。故 116 题选 C，117 题选 A。

184.(B 型题)119 属感染性休克的是

- A.机械性肠梗阻引起的休克
- B.注射青霉素引起的休克
- C.麻醉引起的休克
- D.急性重症胆囊炎引起的休克
- E.心肌梗死引起的休克

答案：D

解析：机械性肠梗阻可见呕吐，致体液丢失，有效循环血量减少，引起低血容量性休克。急性胆囊炎是胆囊管梗阻和细菌感染引起的炎症，易致感染性休克。B 属过敏性休克。C 属神经源性休克。E 属心源性休克。故 118 题选 A，119 题选 D。

185.(B 型题)122 烧伤患者，高热灼手，汗多气粗，口渴头痛，烦躁不安，舌红绛苔黄，脉洪数。其证型是

- A.火热伤津
- B.气阴两伤
- C.阴损及阳
- D.气营两燔
- E.热入营血

答案：E

解析：热入营血证表现为壮热躁动，口干唇燥，大便秘结，小便短赤，舌红绛而干，苔黄或黄糙或焦干起刺，脉洪数。火热伤津证候表现为壮热，口干唇燥，口渴喜饮，大便秘结，小便短赤，舌红而干，苔黄少津，脉细数。故 122 题选 E，123 题选 A。

186.(B 型题)125 西医学的颈部急性淋巴结炎，相当于中医学的

- A.蛇眼疔
- B.红丝疔
- C.颈痈
- D.有头疽
- E.烂疔

答案：C

解析：急性淋巴结炎相当于中医学的外痈，长于颈部的外痈称为颈痈。蛇眼疔相当于西医学的甲沟炎。红丝疔相当于西医学的急性淋巴管炎。西医学的痈中医学称为有头疽。烂疔相当于西医学的气性坏疽。故 126 题选 D，127 题选 C。

187.(B 型题)127 发于新生儿的丹毒，其病机多为

- A.风热毒蕴
- B.胎火蕴毒
- C.湿热毒蕴
- D.火毒炽盛

E.肝经郁火

答案：B

解析：丹毒的风热毒蕴证发生于头面部。胎火蕴毒证发生于初生儿。湿热毒蕴证发生于下肢。肝经郁热证发生于腰胯肋下。故 126 题选 A，127 题选 B。

188.(B 型题)130 来自间叶组织的恶性肿瘤，称为

A.癌

B.瘤

C.肉瘤

D.临界瘤

E.纤维瘤

答案：C

解析：肉瘤是来自于间叶组织的恶性肿瘤。癌是来自上皮组织的恶性肿瘤。瘤是来自于上皮组织的良性肿瘤。介于良性与恶性肿瘤间的过渡性肿瘤称为临界瘤。纤维瘤是良性肿瘤。故 130 题选 C，131 题选 A。

189.(B 型题)133 急性阑尾炎湿热证，右下腹疼痛，口渴不多饮，大便溏而不爽，舌苔黄腻，脉弦数。治疗以通里攻下为主，还应

A.行气祛瘀，佐以清热解毒

B.活血祛瘀，佐以清热利湿

C.清热利湿，佐以行气活血

D.清热解毒，佐以行气凉血

E.行气凉血，佐以利湿消肿

答案：C

解析：急性阑尾炎瘀滞证治法以行气活血，通腑泻热为主，脘腹胀闷，大便秘结为胃肠热毒积聚，故应佐以清热解毒。急性阑尾炎湿热证治法以通腑泻热，利湿解毒为主，同时为防湿热致气血瘀滞，故佐以行气活血。故 132 题选 A，133 题选 C。

190.(B 型题)135 最易嵌顿的疝，是指

A.腹股沟斜疝

B.腹股沟直疝

C.股疝

D.肠梗阻

E.睾丸鞘膜积液

答案：A

解析：腹股沟斜疝肿块常在站立、行走、咳嗽或劳动时出现，多呈带蒂柄的梨形，并可降至阴囊或大阴唇，平卧时肿块可向腹腔回纳而消失。腹股沟直疝当病人直立时，在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿物，平卧时可消失。嵌顿性疝通常发生在斜疝，强劳力或排便等腹内压骤增是其主要原因，临床上表现为疝块突然增大，并伴有明显疼痛，平卧或用手推送不能使肿物回纳，肿物紧张发硬，且明显触痛。故 134 题选 A，135 题选 A。

191.(B 型题)137 患者左输尿管结石，停留日久不移，外形不整，腰部胀痛，舌有瘀点，脉沉涩。其治法是

A.滋阴清热，通淋排石

- B.行气利水，通淋排石
- C.清热利湿，消石通淋
- D.理气祛瘀，软坚排石
- E.健脾益气，通淋排石

答案：D

解析：肾结石患者证属脾虚气滞，治法应为健脾益气，通淋排石。输尿管结石患者证属气滞血瘀，法应理气祛瘀，软坚排石。故 136 题选 E，137 题选 D。

192.(A1 型题)1 女性外阴发生感染时，最易形成炎症及脓肿的部位是

- A.大阴唇
- B.小阴唇
- C.前庭大腺
- D.阴道前庭
- E.处女膜

答案：C

解析：前庭大腺位于阴道口的两侧，大阴唇的后部，腺管开口与前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内，此处容易细菌滋生和存活，所以一旦女性外阴发生感染时，细菌容易侵犯腺体导致其形成炎症及脓肿。故本题选 C。

193.(A1 型题)3 下列叙述，正确的是

- A.子宫古称产户
- B.阴道古称产道
- C.外阴古称毛际
- D.处女膜古称阴户
- E.子宫颈口古称阴门

答案：B

解析：子宫古称胞宫，又名女子胞、子处、子宫、血室、胞脏等。阴道，又名子肠、产道、地道。子门，又名子户，是指子宫颈口的部位，是排出月经和娩出胎儿的关口。阴户，又名四边，即外阴，系指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。玉门，又名龙门、胞门，是指外生殖器的阴道口及处女膜的部位。阴阜古称毛际。故本题选 B。

194.(A1 型题)6 胞宫的功能是

- A.产生卵子
- B.主月经
- C.司血海，主疏泄
- D.主第二性发育
- E.产生性激素

答案：B

解析：它具有蓄经、行经、育胎、分娩的功能。故本题选 B。

195.(A1 型题)10 雌激素的生理功能是

- A.使阴道上皮细胞增生、角化
- B.使增生期子宫内膜转变为分泌期内膜
- C.促进卵发育，使成熟卵泡排卵

D.促进黄体发育生成

E.刺激生乳素的分泌

答案：A

解析：①子宫：能促使子宫发育，子宫内膜增生和肌层增厚；增加子宫平滑肌对缩宫素的敏感性；使子宫颈管黏液分泌量增加，质变稀薄，拉丝度延长，以利于精子的通过，宫颈涂片干燥后镜检可见羊齿植物叶状结晶。②卵巢：协同促卵泡素促进卵泡发育。③输卵管：增强输卵管的蠕动，有利于孕卵的输送。④阴道：使上皮细胞增生、角化，细胞内糖原增加，保持阴道弱酸性环境。⑤乳房：使乳腺腺管增生，乳头和乳晕着色。大剂量雌激素可抑制乳汁分泌。⑥垂体：通过对下丘脑的正负反馈作用，影响脑垂体促性腺激素的分泌。⑦促使女性第二性征发育。⑧促进水钠潴留。⑨促进骨中钙的沉积，加速骨骺闭合。故本题选A。

196.(A1型题)13 黄体发育成熟的时间，大约在排卵后的

A.4~5天

B.7~8天

C.9~10天

D.11~12天

E.13~14天

答案：B

解析：黄体发育成熟的时间，大约在排卵后的7~8天。故本题选B。

197.(A1型题)16 中医学的“居经”是指

A.月经1月两行

B.月经2月一行

C.月经3月一行

D.终身不来月经而能受孕

E.受孕之初，仍按月少行经

答案：C

解析：参见15题。故本题选C。

198.(A1型题)19 下列关于枕前位分娩机制，判定产程进展的重要标志是

A.衔接

B.下降

C.内旋转

D.俯屈

E.仰伸

答案：B

解析：由于下降动作贯穿于分娩全过程。下降动作成间歇性，宫缩时胎头下降，间歇时胎头又稍退缩。而其他选项均未贯穿分娩全过程。故本题选B。

199.(A1型题)22 治疗肝肾不足、冲任损伤导致妇产科疾病的常用方剂有

A.养精种玉汤、左归饮、内补丸

B.左归饮、内补丸、一贯煎

C.养精种玉汤、左归饮、调肝汤

D.调肝汤、左归饮、内补丸

E.调肝汤、一贯煎、养精种玉汤

答案：E

解析：肝肾不足，冲任损伤导致妇产科疾病的常用方剂调肝汤、一贯煎、养精种玉汤。故本题选 E。

200.(A1 型题)24 妊娠剧吐，除哪项外，均应考虑终止妊娠

A.经积极治疗病情无改善

B.体温高于 38℃

C.心率大于 120 次/分

D.呕吐物中有胆汁

E.出现黄疸

答案：D

解析：妊娠剧吐出现体温高于 38℃、心率大于 120 次/分、持续黄疸或蛋白尿、精神萎靡不振，经积极治疗病情无改善应考虑终止妊娠。故本题选 D。

201.(A1 型题)30 中医学认为，异位妊娠最主要的病因病机是

A.冲任虚弱

B.肾气不足

C.寒凝气滞

D.痰湿阻胞

E.少腹血瘀

答案：E

解析：中医认为本病的病因病机：一因虚，主要是脾肾气虚，不能把孕卵及时送达胞宫；二因阻，孕卵受到阻滞，不能送达胞宫。由于孕卵未能移行至胞宫，而居于胞脉，久而胞脉破损，血溢妄行，离经之血淤积少腹，气机阻滞，不通则痛，形成少腹血瘀证。最主要的病因病机为少腹血瘀。故本题选 E。

202.(A1 型题)33 治疗子肿脾虚证的代表方剂是

A.参苓白术散

B.全生白术散

C.鲤鱼汤

D.四君子汤

E.天仙藤散

答案：B

解析：参见 32 题。故本题选 B。

203.(A1 型题)35 白术散适用于妊娠高血压综合征的哪种证型

A.脾虚湿盛

B.肾虚水泛

C.气滞湿阻

D.脾虚肝旺

E.阴虚肝旺

答案：A

解析：参见 32 题。故本题选 A。

204.(A1 型题)38 产后发热感染邪毒证的治法是

- A.清热解毒，泻下逐瘀
- B.清热解毒，活血化瘀
- C.解毒排脓，逐瘀通腑
- D.清热透邪，生津止渴
- E.清营解毒，凉血养阴

答案：B

解析：产后发热感染邪毒证的治法为清热解毒，活血化瘀，主方用五味消毒饮合失笑散加减。

205.(A1 型题)42 滴虫性阴道炎带下的特点是

- A.黄绿色脓性
- B.匀质稀薄状
- C.赤白带相兼
- D.白色豆腐渣样
- E.灰黄色泡沫样

答案：E

解析：滴虫性阴道炎妇科检查可发现阴道内有较多黄绿或灰黄色带泡沫的分泌物，阴道黏膜充血，重者可出现出血点。A、B 见于细菌性阴道病。C 见于老年性阴道炎。D 见于念珠菌阴道炎。故本题选 E。

206.(A1 型题)44 治疗霉菌性阴道炎，应首选

- A.柏己片塞药加 3%小苏打液冲洗
- B.制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗
- C.灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D.柏己片塞药加 1%乳酸液冲洗
- E.灭滴灵塞药加 3%小苏打液冲洗

答案：B

解析：治疗念珠菌阴道炎宜首选制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗。故本题选 B。

207.(A1 型题)47 治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂)，应首选

- A.外用黄蜈散 II 号加物理疗法
- B.外用制霉菌素栓加塌痒方
- C.灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D.口服知柏地黄汤加 1%醋酸液冲洗
- E.外用制霉菌素栓加 1%乳酸液冲洗

答案：A

解析：治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂)应该药物加物理疗法同时应用，宜外用黄蜈散 II 号加物理疗法。故本题选 A。

208.(A1 型题)52 疑子宫内膜脱落不全者，取子宫内膜送病检的时间是

- A.经来潮 24 小时内
- B.月经来潮第 5 天
- C.月经干净后 3 天

- D.月经干净后 7 天
- E.月经干净后 10 天

答案：B

解析：子宫内膜不规则脱落者，月经第 5~6 天诊刮，刮出内膜送检提示仍可见分泌期改变内膜，且与出血期及增殖期内膜并存。故本题选 B。

209.(A1 型题)55 治疗排卵期出血肾阳虚证，应首选

- A.健固汤加孕激素
- B.举元煎加雄激素
- C.健固汤加雄激素
- D.健固汤加雌激素
- E.举元煎加孕激素

答案：D

解析：排卵期出血肾阳虚证宜补脾渗湿，配合补充雌激素，方选健固汤加雌激素。故本题选 D。

210.(A1 型题)57 治疗黄体功能不全脾气虚弱证，应首选

- A.补中益气汤
- B.两地汤合二至丸
- C.当归补血汤
- D.四君子汤
- E.左归丸合二至丸

答案：A

解析：黄体功能不全脾气虚弱证宜益气摄血固冲，方选补中益气汤。B 用于阴虚血热证。C 用于血虚证。D 用于益气健脾，不适于功血。E 用于肾阴虚证。故本题选 A。

211.(A1 型题)59 治疗因口服避孕药所致月经不调肾阳虚证，应首选

- A.失笑散合四物汤
- B.左归丸合二至丸
- C.右归丸合二至丸
- D.保阴煎合失笑散
- E.举元煎合失笑散

答案：C

解析：月经不调肾阳虚证，方选右归丸合二至丸滋肾益阴，固冲止血。故本题选 C。

212.(A1 型题)62 治疗月经先期阴虚血热型，应首选

- A.两地汤加孕激素
- B.举元煎加雄激素
- C.健固汤加雄激素
- D.健固汤加孕激素
- E.右归丸加雌激素

答案：A

解析：月经先期阴虚血热型症见月经提前，量少、色红、质稠，两颧潮红，手足心热，舌质红，舌苔少，脉细数。滋阴凉血止血，方选两地汤，西医治宜补充孕激素调经。故本题选 A。

213.(A1 型题)65 治疗闭经肝肾不足证，应首选

- A.归肾丸
- B.金匱肾气丸
- C.二至丸
- D.右归丸
- E.六味地黄丸

答案：A

解析：治疗闭经肝肾不足证应首选归肾丸补肾养肝调经。故本题选 A。

214.(A1 型题)68 下列哪项不是原发性痛经寒湿凝滞证的临床表现

- A.经前、经期小腹冷痛
- B.经量少、色暗、有块
- C.畏寒身痛
- D.妇检子宫增大、有压痛
- E.舌质暗，脉沉紧

答案：D

解析：原发性痛经寒湿凝滞证的临床表现经前、经期小腹冷痛，经量少、色暗、有块，畏寒身痛，舌质暗，苔白腻，脉沉紧。故本题选 D。

215.(A1 型题)71 治疗经前期综合征肝郁气滞证，应首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.柴胡疏肝散
- C.血府逐瘀汤
- D.滋水清肝饮
- E.丹栀逍遥散

答案：B

解析：经前期综合征肝郁气滞证治宜疏肝解郁、理气调经。方用柴胡疏肝散。故本题选 B。

216.(A1 型题)74 黏膜下子宫肌瘤患者，有生育要求者，应首选的治疗措施是

- A.子宫肌瘤摘除术
- B.子宫全切术
- C.维生素加桂枝茯苓丸
- D.孕激素加桂枝茯苓丸
- E.纠正贫血加桂枝茯苓丸

答案：A

解析：黏膜下子宫肌瘤患者有生育要求者应该选择子宫肌瘤摘除术。故本题选 A。

217.(A1 型题)77 治疗子宫肌瘤阴虚内热证应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案：E

解析：子宫肌瘤阴虚内热证治宜滋阴清热，化瘀消癥，方选清海丸。故本题选D。

218.(A1型题)80 治疗子宫内膜异位症气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A.温经汤
- B.桃红四物汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.失笑散
- E.膈下逐瘀汤

答案：E

解析：子宫内膜异位症气滞血瘀证治宜疏肝理气，活血化瘀，方用膈下逐瘀汤。C治疗寒凝血瘀证。故本题选E。

219.(A1型题)83 治疗不孕症之肾虚证，应首选

- A.养荣壮肾汤
- B.开郁种玉汤
- C.归肾丸合五子衍宗丸
- D.湿土毓麟汤
- E.归脾汤

答案：C

解析：肾虚不孕症之治疗无论气虚、阳虚还是阴虚均宜温养肾气，填精益血，所以首选归肾丸合五子衍宗丸。故本题选C。

220.(B型题)132 中医称之为屡孕屡堕者，是指

- A.先兆流产
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.完全流产
- E.习惯性流产

答案：E

解析：难免流产一般多由先兆流产发展而来。此时阴道流血增多，阵发性腹痛逐渐加剧，或出现阴道流水（胎膜破裂）。检查示宫颈口已扩张，有组织物堵塞或有水流出，或见胎膜囊膨出，子宫与停经周数符合或较小。中医称为胎动欲堕。习惯性流产中医称为屡孕屡堕或滑胎。A中医称为胎漏、胎动不安。C中医称堕胎、小产。D中医称堕胎、小产。故131题选B，132题选E。

221.(B型题)133 患者停经3个月余，子宫如孕40天大小。应首先考虑的是

- A.胎动不安
- B.滑胎
- C.完全流产
- D.过期流产
- E.感染性流产

答案：D

解析：过期流产即稽留流产，指胚胎或胎儿在宫内已死亡后仍未自然排出者。妊娠诊断肯定，

曾有先兆流产症状或无，之后妊娠反应消失，妊娠试验转为阴性。检查：子宫不再增大或反而减小，胎动消失，检查子宫较停经月份小，质地不软，子宫颈口闭。感染性流产主要发生于各类流产后，除流产的一般症状外，主要伴有高热寒战、腹痛等感染症状。故 133 题选 D，134 题选 E。

222.(B 型题)137 治疗闭经肝肾不足证，应首选

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.归肾丸
- D.血府逐瘀汤
- E.苍附导痰丸

答案：C

解析：闭经肝肾不足证治以补益肝肾，调理冲任，方用归肾丸。痰湿阻滞证治以健脾燥湿化痰，活血调经，方用苍附导痰丸加减。A 用于肾阴虚证。B 用于肾阳虚证。D 用于气滞血瘀证。故 137 题选 C，138 题选 E。

223.(B 型题)140 治疗子宫肌瘤阴虚内热证，应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案：E

解析：子宫肌瘤寒湿凝滞的治疗宜散寒除湿、活血消癥，方选桂枝茯苓丸。阴虚内热证的治疗宜滋阴清热，活血消癥，方选清海丸。故 139 题选 A，140 题选 E。

224.(B 型题)144 疑诊子宫内膜脱落不全，选择诊断性刮宫的时间是

- A.月经来潮第 6 天
- B.月经来潮第 5 天
- C.月经来潮第 3 天
- D.月经来潮第 2 天
- E.月经来潮 6 小时内

答案：B

解析：对于不孕症或功能失调性子宫出血患者，应选在月经前或月经来潮后 6 小时内刮宫，以判断有无排卵或黄体功能不足。子宫内膜脱落不全的诊断：BBT 高温期有少量子宫出血，BBT 下降后子宫出血增多如月经量，并按时停止。子宫出血第 5 天子宫内膜活检仍有分泌相。故 143 题选 E，144 题选 B。

225.(A1 型题)2 在小儿年龄分组中，婴儿期是指

- A.出生后至满 1 周岁之前
- B.1 周岁至满 3 周岁
- C.自出生脐带结扎时起，至生后足 28 天
- D.3 周岁后（第 4 年）至入小学前（6~7 岁）
- E.8 岁至 12 岁

答案：A

解析：参见 1 题。故本题选 A。

226.(A1 型题)6 小儿体格发育最快的时期是

- A. 婴儿期
- B. 新生儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 幼儿期

答案：A

解析：小儿体格发育最快的时期是婴儿期，初步适应了外界环境，生长迅速。B 小儿适应能力及御邪能力较差，易出现疾患。C 小儿发育稳步增长，智力发育日趋完善。D 小儿发育仍稳步增长。E 小儿体格增长较婴儿期缓慢。故本题选 A。

227.(A1 型题)8 小儿 1 岁时，头围是

- A. 38cm
- B. 46cm
- C. 50cm
- D. 52cm
- E. 64cm

答案：B

解析：一般孩子出生时头围在 33~34cm。在第一年的前 3 个月和后 9 个月头围都增长 6cm，故 1 岁时头围为 46cm；生后第二年头围增长减慢，2 岁时头围 48cm；5 岁时为 50cm；15 岁时头围接近成人为 54~58cm。故本题选 B。

228.(A1 型题)11 小儿时期最易发病的两脏是

- A. 脾肾
- B. 肝肾
- C. 肺肾
- D. 肺脾
- E. 肺肝

答案：D

解析：小儿时期行气未充，发病容易，最易表现在肺脾系疾病及肾系疾病、传染病方面。故本题选 D。

229.(A1 型题)14 察指纹的适用年龄是

- A. 5 岁以内
- B. 4~5 岁
- C. 4 岁以内
- D. 3~4 岁
- E. 3 岁以内

答案：E

解析：察指纹是对 3 岁以内的小儿用以代替脉诊的一种辅助诊法，用以辨别婴幼儿疾病的病因、性质并估计预后等。故本题选 E。

230.(A1 型题)16 下列各项,属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A.黄疸出现后,7~8 天完全消退
- B.黄疸出现后,10~14 天完全消退
- C.黄疸出现后,15~20 天完全消退
- D.黄疸出现后,21~28 天完全消退
- E.黄疸出现后,30~35 天完全消退

答案: D

解析:新生儿生理性黄疸大多在生后 2~3 天出现,4~6 天达高峰,7~10 天消退,早产儿生后 3~4 天出现,持续时间较长,可达 3~4 周,除轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。故本题选 D。

231.(A1 型题)20 新生儿生理性黄疸出现的时间是

- A.出生后 24 小时内
- B.出生后 2~3 天
- C.出生后 1 周
- D.出生后 10 天
- E.出生后 12 天

答案: B

解析:新生儿生理性黄疸大多在生后 2~3 天出现,4~6 天达高峰,7~10 天消退,早产儿持续时间较长可达 3~4 周,除轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。故本题选 B。

232.(A1 型题)24 下列各项,不属病毒性心肌炎临床诊断依据的是

- A.心功能不全或心源性休克
- B.心脏扩大
- C.肌酸磷酸激酶同工酶升高
- D.心电图表现为完全性右或左束支阻滞
- E.ST-T 段改变, T 波高耸

答案: D

解析:病毒性心肌炎临床可见心功能不全、心源性休克或心脑综合征;心脏扩大;肌酸磷酸激酶同工酶升高;心电图改变: I、II、aVF、V₅ 导联中两个或两个以上出现 ST-T 段改变, T 波高耸。故本题选 D。

233.(A1 型题)28 婴幼儿腹泻湿热泄泻证的治法是

- A.消食导滞,和中止泻
- B.疏风散寒,理气化湿
- C.补脾温肾,固涩止泻
- D.清热利湿,清肠止泻
- E.健脾益气,升提助运

答案: D

解析:婴幼儿腹泻湿热泄泻证治以清热利湿、清肠止泻,方用葛根黄芩黄连汤。A 用于伤食泻。B 用于风寒泻。C 用于脾肾阳虚泻。E 用于脾虚泻。故本题选 D。

234.(A1 型题)31 下列哪项不是小儿急性肾炎的临床特征

- A.多数患儿都有血尿
- B.病程早期常有高血压
- C.部分病例可出现急性肾功能不全
- D.血压急剧升高时可出现高血压脑病
- E.浮肿为可凹性、上行性

答案：E

解析：小儿急性肾炎的临床特征有浮肿及尿量较少，浮肿为非凹陷性；血尿；高血压。并发症有高血压性脑病，严重循环充血，急性肾衰竭。血清总补体及C₃可一过性明显下降，6~8周可恢复。故本题选E。

235.(A1型题)34 小儿哮喘发作期的病机是

- A.风寒犯肺，肺气失宣
- B.外邪犯肺，肺气郁闭
- C.感受外邪，袭于肺卫
- D.风热犯肺，肺失清肃
- E.外邪袭肺，触动伏痰

答案：E

解析：小儿哮喘发作期的病机关键是痰饮内伏，遇外来因素感触而发，反复不已。六淫之邪入于肺经，肺失宣肃，肺气不利，引动伏痰，痰气交阻于气道，痰随气升，气因痰阻，相互搏击而发哮喘。故本题选E。

236.(A1型题)38 婴儿手足搐搦症是由于缺乏

- A.维生素D
- B.维生素C
- C.维生素B₂和叶酸
- D.铁
- E.锌

答案：A

解析：手足搐搦症绝大多数见于婴儿时期，主要是由于维生素D缺乏以致血清钙低落，神经肌肉兴奋性增强，出现惊厥和手足搐搦等症状。故本题选A。

237.(A1型题)42 治疗风疹邪郁肺卫证，应首选

- A.银翘散
- B.桑菊饮
- C.麻杏石甘汤
- D.葶苈大枣泻肺汤
- E.五虎汤

答案：A

解析：风疹邪郁肺卫证治以疏风清热、清肺利咽，方用银翘散加减。故本题选A。

238.(A1型题)46 流行性腮腺炎主要侵犯的经脉是

- A.足厥阴肝经
- B.足少阳胆经
- C.足太阳膀胱经

D.足阳明胃经

E.足少阴肾经

答案：B

解析：参见 45 题。故本题选 B。

239.(A1 型题)50 下列哪项不是小儿厌食胃阴不足证的证候特征

A.食少饮多

B.皮肤欠润

C.大便偏干

D.面色不华

E.舌红苔黄腻

答案：E

解析：厌食胃阴不足证表现为不思饮食，食少饮多，口舌干燥，皮肤欠润，形体偏瘦，小便短黄，大便干结，烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。E 为湿热证的表现。故本题选 E。

240.(A2 型题)54 患儿，男，3 岁。两个月来午后低热，盗汗，乏力，日渐消瘦。问病史时应特别注意的是

A.反复呼吸道感染史

B.喂养史

C.乙肝疫苗接种史

D.结核病人密切接触史

E.乙肝病人接触史

答案：D

解析：根据患儿午后低热、盗汗、乏力及消瘦两月的临床症状，首先怀疑结核病，因此针对该病询问有无结核病接触史以进一步明确或排除结核病。故本题选 D。

241.(A2 型题)58 足月女婴，25 天。出生后 2 周出现身黄，目黄，其色晦暗，持续不退，精神倦怠，四肢欠温，不欲吮乳，大便溏薄，小便短少，舌质偏淡，舌苔白腻。治疗应首先考虑的方剂是

A.茵陈理中汤

B.茵陈蒿汤

C.血府逐瘀汤

D.茵陈四苓汤

E.茵陈四逆汤

答案：A

解析：足月患儿，25 天出现黄疸，可诊断为病理性黄疸。寒湿蕴阻脾胃，肝胆疏泄失常而出现面目皮肤发黄，其色晦暗，持续不退。湿阻脾胃，脾失健运而见呕吐腹胀、不思乳食。舌苔及指纹亦为湿阻脾胃之证，故辨证为寒湿阻滞，治以温中化湿，方用茵陈理中汤。B 用于湿热黄疸证。C 用于气滞血瘀证。D 用于湿热黄疸，湿重于热者。E 用于黄疸阴证。故本题选 A。

242.(A2 型题)63 患儿，1 岁。腹泻 2 天，泻下急迫，大便如水注，有黏液及腥臭味，伴发热，烦躁口渴，肢体困倦，小便短赤，肛门灼热，发红。其证型是

- A. 伤食
- B. 风寒
- C. 脾虚
- D. 湿热
- E. 脾肾阳虚

答案：D

解析：小儿湿热内盛，湿困脾阳，运化失职，湿盛而见泻下急迫，大便如注，伴有黏液及腥臭味。湿邪夹热而见发热，烦躁口渴，小便短赤，肛门灼热、发红。故可辨证为湿热。故本题选 D。

243.(A2 型题)67 患儿，男，3 岁。腹泻 2 天，大便如蛋花汤样，泻下急迫，气味臭秽，食欲不振，发热烦躁，口渴，小便短黄，舌质红，苔黄腻，指纹紫。其证型是

- A. 伤食泻
- B. 寒湿泻
- C. 风寒泻
- D. 湿热泻
- E. 脾虚泻

答案：D

解析：湿热之邪，蕴结肠胃气机，下注大肠，传化失司，故泻下稀如水样，气味秽臭。热性急迫，湿热交蒸，壅遏胃肠气机，故泻下急迫，量多。湿热困脾胃，故纳差食少，神疲乏力。伴有外感，则有发热，热重于湿者，故口渴饮引。湿热在下，则小便短黄。故辨证为湿热泄泻。故本题选 D。

244.(A2 型题)71 患儿，8 岁，颜面浮肿 1 个月，近日来波及下肢。查体：血压 128/83mmHg。实验室检查：尿常规蛋白(+++)，红细胞 40~60 个/高倍视野。应首先考虑的是

- A. 肾炎性肾病
- B. 急性泌尿系感染
- C. 慢性肾炎
- D. 单纯性肾病
- E. 以上均非

答案：A

解析：患儿以浮肿、高血压为主要表现，实验室检查提示尿蛋白、血尿。首先考虑为肾炎性肾病。B 以尿频、尿急、尿痛为主要表现，尿常规见白细胞增多。C 也以浮肿、高血压为主要表现，有血尿及蛋白尿，此类症状持续 1 年以上方可诊断此病。D 全身水肿，大量蛋白尿，低蛋白血症，高脂血症。故本题选 A。

245.(A2 型题)75 患儿，男，12 岁。哮喘病史 5 年。面色白，气短懒言，语声低微，倦怠乏力，自汗畏冷，四肢不温，脉细无力。其诊断是

- A. 哮喘缓解期，肺脾气虚证
- B. 哮喘缓解期，肾虚失纳证
- C. 哮喘缓解期，阴虚肺热证
- D. 哮喘缓解期，肺阴亏损证
- E. 寒性哮喘

答案：A

解析：患儿已有哮喘病史5年，且无急性发作，故诊断为哮喘缓解期。脾气虚见面色白、四肢不温、倦怠乏力，肺气虚可见气短懒言、语声低微、自汗，脉细无力为肺脾气虚证的表现，故辨证为肺脾气虚证。故本题选A。

246.(A2型题)78 患儿，男，1岁。明显消瘦，体重65kg，面色萎黄，毛发稀疏，懒言少语，大便酸臭，尿短黄，舌淡苔腻。查体：腹部膨胀，腹部皮下脂肪0.3cm。诊断为营养不良，其程度及证型是

- A. II度，疳积
- B. I度，疳证
- C. I度，疳积
- D. II度，疳证
- E. III度，干疳

答案：D

解析：营养不良可分为三度。I度：体重比正常平均体重减少15%~25%，皮下脂肪厚度小于0.8cm。肌肉不坚实，皮肤颜色正常或稍苍白。身高及一般状态尚无变化。II度：体重比正常平均体重减少25%~40%，身高也低于正常。腹部皮下脂肪层几乎完全消失，皮肤苍白、松弛而失去弹性。III度：体重比正常平均体重减少40%以上，90%的脂肪消失，身高也低于正常。发育迟缓，此时臀部和面部的皮下脂肪层已消失，预后严重。本患儿可诊断为营养不良II度。而营养不良的中医诊断即为疳证。故本题选D。

247.(A2型题)82 患儿，女，2岁。体重9kg。纳呆，面色少华，性急易怒，大便干稀不调，舌质淡，苔薄微腻，指纹淡。其诊断是

- A. 厌食
- B. 疳气
- C. 疳积
- D. 干疳
- E. 积滞

答案：B

解析：根据患儿的临床表现可诊断为疳证。中医认为疳证分为疳气、疳积及干疳。疳气仅表现为面黄发疏，食欲欠佳，精神如常，形体略瘦，大便不调等脾胃不和之症；疳积则出现形体明显消瘦，肚腹膨隆，烦躁多啼等脾虚夹积症状；若出现全身肌肉消削，貌似老人，腹凹如舟，精神萎靡，即为干疳阶段。故此患儿可诊断为疳气。故本题选B。

248.(A2型题)85 患儿，5岁。发热，两侧腮腺肿大，张口及吃硬食物疼痛加重。查体：体温38.5℃，双侧肿大腮腺以耳垂为中心向周边蔓延，表面灼热有触痛，无波动感。实验室检查：血白细胞总数 $40 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞42%，淋巴细胞58%。应首先考虑的是

- A. 腮腺管阻塞
- B. 淋巴结炎
- C. 颌下腺炎
- D. 流行性腮腺炎
- E. 化脓性腮腺炎

答案：D

解析：流行性腮腺炎起病大多较急，无前驱症状。有发热、畏寒、头痛、咽痛、食欲不佳、恶心呕吐、全身疼痛等表现，数小时腮腺肿痛，逐渐明显，体温可达39℃以上，成人患者

一般较严重。腮腺肿胀最具特征性，一般以耳垂为中心，向前、后、下发展，状如梨形，边缘不清；局部皮肤紧张，发亮但不发红，触之坚韧有弹性，有轻触痛。患儿白细胞及中性粒细胞数不高，淋巴细胞数升高，可排除化脓性腮腺炎。另根据患儿两侧腮腺肿大及向耳垂两边蔓延的表现，可明确诊断为流行性腮腺炎。故本题选 D。

249.(A2 型题)89 患儿，男，4 岁。咳嗽 1 周，痰多，色白而稀，喉间痰声辘辘，神乏困倦，胸闷纳呆。舌淡红，苔白腻，脉滑。其证型是

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰湿咳嗽
- D. 痰热咳嗽
- E. 气虚咳嗽

答案：C

解析：湿生于脾，脾湿盛者，酿液成痰，贮阻肺络，故痰多。湿为阴邪，故痰白。痰阻气道，故喉间痰声辘辘。神乏困倦、胸闷纳呆、舌脉均为湿邪之象。故辨证为痰湿咳嗽。故本题选 C。

250.(A2 型题)92 患儿，男，1 岁。素不欲食，强迫进食则脘腹胀满，舌苔白腻，脉细缓。其诊断是

- A. 厌食，胃阴不足证
- B. 厌食，脾运失健证
- C. 厌食，脾胃气虚证
- D. 疳病，疳证
- E. 疳病，疳积

答案：C

解析：参见 91 题。故本题选 C。

251.(B 型题)94 新生儿的头围，平均是

- A. 54cm
- B. 50cm
- C. 46cm
- D. 42cm
- E. 34cm

答案：E

解析：足月儿出生时头围约为 33~34cm，出生后前 3 个月和后 9 个月各长 6cm，1 周岁时约为 46cm，2 周岁时约为 48cm，5 周岁时增至 50cm，15 岁接近成人约 54~58cm。

252.(B 型题)98 小儿生理特点是

- A. 不易发病，传变迅速
- B. 发病容易，传变迅速
- C. 脏腑娇嫩，形气未充
- D. 发病容易，传变较缓
- E. 脏器清灵，传变迅速

答案：C

解析：小儿生理特点是生机蓬勃，发育迅速；脏腑娇嫩，形气未充。小儿病理特点是发病容易，传变迅速；脏腑清灵，易趋康复。

253.(B型题)101 小儿虚热证的脉象是

- A.沉而有力
- B.数而有力
- C.数而无力
- D.浮而无力
- E.迟而有力

答案：C

解析：小儿实热证多表现为脉有力且快，即数而有力。虚热证则表现为脉无力且速率慢，即数而无力。A是里实证的脉象。D是表虚证的脉象。E是寒实证的脉象。故100题选B，101题选C。

254.(B型题)104 咽-结膜热的主要病原体是

- A.柯萨奇病毒
- B.合胞病毒
- C.轮状病毒
- D.腺病毒
- E.流感病毒

答案：D

解析：咽-结膜热的主要病原体是腺病毒3、7型所致，常发生于春夏季，以发热、咽炎、结膜炎为特征。80%婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的，病毒性肠炎主要病原为轮状病毒，其次为肠道病毒（包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒）。B可引起呼吸道合胞病毒肺炎。故104题选D，105题选C。

255.(B型题)107 病毒性心肌炎痰瘀阻络证的证候有

- A.心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，舌质紫暗，脉结代
- B.心悸不宁，憋气乏力，少气懒言，烦热口渴，舌红少苔，脉细数
- C.心悸怔忡，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡胖，脉缓无力
- D.寒热起伏，心悸胸闷，肌肉酸痛，腹痛泄泻，舌质红，苔黄腻，脉濡数
- E.心悸气短，胸闷胸痛，发热咳嗽，咽红肿痛，舌红脉数

答案：A

解析：A为病毒性心肌炎痰瘀阻络证。B为病毒性心肌炎气阴亏虚证。C为病毒性心肌炎心阳虚证。D为病毒性心肌炎湿热侵心证。E不是病毒性心肌炎的典型表现。故106题选D，107题选A。

256.(B型题)112 治疗急性肾小球肾炎风水相搏型，应首选

- A.五苓散
- B.真武汤
- C.三妙丸合导赤散
- D.五味消毒饮合五皮饮
- E.麻黄连翘赤小豆汤

答案：E

解析：急性肾小球肾炎风水相搏证治以疏风宣肺、利水消肿，方用麻黄连翘赤小豆汤。湿热内侵型治以清热利湿、凉血止血，方用三妙丸合导赤散。A 用于蓄水证。B 用于阳虚水泛证。D 用于寒湿内盛证。故 112 题选 E，113 题选 C。

257.(B 型题)116 哮喘发作期的主要病机是

- A.外邪引动伏痰，痰阻气道
- B.感受外邪，肺气郁闭
- C.感受外邪，肺气失宣
- D.肺脾肾不足，痰饮内伏
- E.脾肾阳虚，肾不纳气

答案：A

解析：小儿哮喘发作必有留痰伏饮，受外邪而引发。发作时，痰随气升，气因痰阻，相互搏激，阻塞气道，气机升降不利，以致呼多吸少，气息喘促。哮喘缓解期的主要病机为肺虚皮毛不固，容易感冒及诱发哮喘；肾气失纳则动则气喘；脾虚则纳运不健，易痰饮上泛。故 116 题选 A，117 题选 D。

258.(B 型题)119 哮喘肾虚不纳的正确治法是

- A.温肺散寒
- B.清热化痰
- C.补肺固表
- D.健脾化痰
- E.补肾固本

答案：E

解析：哮喘脾气虚弱的正确治法为健脾化痰，方选六君子汤加减。哮喘肾虚不纳的正确治法为补肾固本，方选金匱肾气丸加减。A 治疗寒哮，B 治疗热哮，C 治疗肺气虚弱证。故 118 题选 D，119 题选 E。

259.(B 型题)122 婴儿手足搐搦症是由于缺乏

- A.维生素 C
- B.维生素 D
- C.维生素 B₁₂ 和叶酸
- D.铁
- E.锌

答案：B

解析：婴儿性手足搐搦症绝大多数见于婴儿时期，主要是由于维生素 D 缺乏以致血清钙降低，神经肌肉兴奋性增强，出现惊厥和手足搐搦等症状。小儿小细胞低色素性贫血是指红细胞中的含铁血黄素低（低色素），同时细胞体积小（小细胞），这种贫血大多数由于缺铁引起。故 122 题选 B，123 题选 D。

260.(B 型题)125 突然发热，一般情况好，热退疹出者，应首先考虑的是

- A.麻疹
- B.幼儿急疹
- C.猩红热
- D.水痘

E.风疹

答案：B

解析：麻疹多在发热后3~4天出现皮疹。体温可突然升高至40℃~40.5℃，热甚疹出。幼儿急疹骤起高热，而其他临床症状较轻，热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹。C起病急骤，发热，体温一般38℃~39℃，重者可达40℃以上，婴幼儿起病时可能产生惊厥或谵妄，皮疹于24小时左右迅速出现。D起病较急，可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状，在发病24小时内出现皮疹。E通常于发热1~2天后出现皮疹，皮疹先从面颈部开始，在24小时蔓延到全身。故124题选A，125题选B。

261.(B型题)129 咳声重浊，痰黄者，应首先考虑的是

A.外感暑热

B.外感风热

C.风湿犯肺

D.外感风寒

E.阴虚肺燥

答案：B

解析：咳声清扬，鼻流清涕者，考虑外感风寒。咳声重浊，痰黄者考虑为外感风热。A多表现为咳声不扬，痰黏黄。C多表现为咳嗽频频，喉中痰鸣。E多表现为干咳无痰或痰少黏稠。故128题选D，129题选B。

262.(A1型题)1 下列关于副作用的描述，正确的是

A.药物在治疗剂量时出现的与治疗目的无关的作用

B.药物应用不当而产生的作用

C.因病人有遗传缺陷而产生的作用

D.停药后出现的作用

E.因用药剂量过大产生的作用

答案：A

解析：副作用是由于药物的选择性低，药理效应涉及多个器官，当某一效应用作治疗目的时，其他效应就成为副作用，主要造成机体的生理性损害。副作用是在治疗剂量下发生的，是药物本身固有的作用，难以避免，但多数较轻微并可以预料。故本题选A。

263.(A1型题)6 吗啡急性中毒致死的最主要原因是

A.呼吸麻痹

B.肾衰竭

C.消化道出血

D.中枢兴奋

E.循环衰竭

答案：A

解析：吗啡能够抑制呼吸，治疗量时即可抑制呼吸中枢，使呼吸频率减慢，潮气量降低。中毒量时使呼吸减慢至3~4次/分，死因为呼吸麻痹。故本题选A。

264.(A1型题)10 通过抑制血管紧张素 I 转换酶而发挥抗慢性心功能不全作用的代表药有

A.地高辛

B.卡托普利

- C.美托洛尔
- D.氯沙坦
- E.硝普钠

答案：B

解析：卡托普利是血管紧张素转换酶抑制剂，通过血管紧张素 I 转换酶减少血管紧张素 II 及的生成量，并抑制醛固酮的生成从而逆转心室肌的重塑。故本题选 B。

265.(A1 型题)14 下列药物中，无抗心律失常作用的是

- A.奎尼丁
- B.氢氯噻嗪
- C.维拉帕米
- D.普萘洛尔
- E.胺碘酮

答案：B

解析：氢氯噻嗪的药理作用有：①利尿，抑制远曲小管对 NaCl 的重吸收；②抗利尿，使尿崩症患者尿量明显减少，因其排出 Na⁺、Cl⁻，使血浆渗透压下降，可减轻患者的口渴感；③降压。故本题选 B。

266.(B 型题)16 长期应用地西洋须加大剂量才产生原有的催眠效果，这是产生了

- A.耐受性
- B.成瘾性
- C.反跳现象
- D.戒断症状
- E.急性中毒

答案：A

解析：耐受性指药物连续多次应用于人体，其效应逐渐减弱，必须不断地增加用量才能达到原来的效应。成瘾性指某些药物连续多次服用后，身体逐渐对其产生精神上的依赖和病态的嗜好，此时一旦停药，即会出现主观上的严重不适症状。而这里因为停止服药而出现的不适症状就属于戒断症状。故 16 题选 A，题 17 选 D。

267.(B 型题)20 可引起高血钾、咳嗽、血管神经性水肿的药物是

- A.卡托普利
- B.可乐定
- C.哌唑嗪
- D.胍屈嗪
- E.米诺地尔

答案：A

解析：A 适用于各型高血压的治疗，长期应用可出现低血压、头痛、头晕、颜面潮红、乏力、血管神经性水肿、刺激性干咳、高血钾、皮疹、脱发等。B 长期应用可出现口干、瞌睡、头晕、便秘。C 的不良反应有眩晕、疲倦、口干、头痛、恶心。D 服后可出现耐药性及头痛、心悸、恶心等不良反应，长期大剂量使用可引起类风湿性关节炎和红斑狼疮样反应。E 的不良反应有心动过速、多毛症、妇女月经次数增多，结膜充血及血小板计数减少等。

268.(B 型题)24 治疗过敏性休克，应首先考虑的药物是

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 麻黄碱

答案：A

解析：A 为 α 和 β 受体激动药，可使心肌收缩力加强，心率增快，心排出量增加，适用于严重的急性过敏反应，特别是青霉素等引起的过敏性休克治疗。B 主要应用于早期神经源性休克或药物引起的低血压。C 主要适用于中心静脉压高、心排出量低的感染性休克。D 主要用于感染性休克、心源性休克和出血性休克的治疗，对伴有心肌收缩力减弱及尿量减少而血容量已补足的患者疗效较好。E 使心肌收缩力增强，心输出量增加，可用于因血管扩张引起的休克的治疗。

269.(B 型题)29 治疗肺炎球菌肺炎，应首选

- A. 青霉素
- B. 氨苄青霉素
- C. 新型青霉素 II
- D. 红霉素
- E. 庆大霉素

答案：A

解析：治疗支原体肺炎首选大环内酯类药物，如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素等。治疗肺炎球菌肺炎首选青霉素类、第一代头孢菌素等。

270.(A1 型题)1 胆道蛔虫梗阻出现腹痛的特点是

- A. 突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛
- B. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张
- C. 右上腹进行性锐痛
- D. 剑突下钻顶样疼痛
- E. 右上腹阵发性绞痛

答案：D

解析：突发中上腹剧烈刀割样疼痛为消化性溃疡穿孔引起的疼痛。持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张，提示为急性弥漫性腹膜炎。右上腹进行性锐痛提示肝区病变。右上腹阵发性绞痛，可能是胆囊炎。剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫梗阻的典型表现。故本题选 D。

271.(A1 型题)8 病理性的持续睡眠状态，可被唤醒，并能正确回答问题称为

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 昏迷
- E. 谵妄

答案：A

解析：A 是最轻的意识障碍，是一种病理性倦怠，患者可被唤醒，并能作出各种不同的反应。B 能保持简单的精神活动，但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。C 不易唤醒，在强烈刺激下可被唤醒，醒时答话含糊。D 意识的持续的中断或完全丧失。E 意识模糊、感觉错

乱、躁动不安、言语杂乱。故本题选 A。

272.(A1 型题)12 下列各项，属于脑膜刺激征的是

- A.布鲁津斯基征
- B.查多克征
- C.巴宾斯基征
- D.戈登征
- E.拉塞格征

答案：A

解析：脑膜刺激征包括颈强直、凯尔尼格征、布鲁津斯基征。其余四项与脑膜刺激征均为病理反射。故本题选 A。

273.(A1 型题)15 出现“三偏征”，常见的病变部位是

- A.内囊
- B.深皮质
- C.脑干
- D.脊髓
- E.基底节

答案：A

解析：因感觉、运动传导路都经过内囊，且内囊较窄，如有病变常表现为对侧半身感觉障碍及伴有偏瘫，即三偏征。故本题选 A。

274.(A1 型题)20 尿中出现红细胞管型，主要见于

- A.肾结核
- B.肾结石
- C.慢性肾炎
- D.急性肾炎
- E.慢性肾盂肾炎

答案：D

解析：尿液中见红细胞管型主要提示肾小球疾病，如急进性肾小球肾炎、急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎急性发作、狼疮性肾炎等。故本题选 D。

275.(B 型题)22 轻度有机磷农药中毒，瞳孔呈

- A.缩小
- B.明显缩小
- C.针尖样大小
- D.显著扩大
- E.大小不等

答案：A

解析：轻度有机磷农药中毒瞳孔可略缩小。中度中毒瞳孔明显缩小。重度中毒瞳孔小于针尖。

276.(B 型题)26 上述各项，可闻及心尖区粗糙的吹风样收缩期杂音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄

- C.主动脉瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.动脉导管未闭

答案：A

解析：吹风样杂音常见于二尖瓣区和肺动脉瓣区，一般呈高调。柔和的吹风样杂音常为功能性杂音；典型的粗糙的吹风样收缩期杂音，常提示二尖瓣关闭不全。隆隆样杂音为低调，心尖区舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的特征。叹气样杂音见于主动脉瓣区，为主动脉瓣关闭不全的特点。机器样杂音主要见于动脉导管未闭，杂音如机器转动声样粗糙。杂音在心尖部最响，提示二尖瓣病变；杂音在主动脉瓣区最响，提示主动脉瓣病变；在肺动脉瓣区最响，提示肺动脉瓣病变；在胸骨下端最响，提示三尖瓣病变。如胸骨左缘第3、4肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音，首先应想到室间隔缺损；胸骨左缘第2、3肋间有连续性机器样粗糙杂音，应想到动脉导管未闭。

277.(B型题)30 两肺散在干、湿啰音，其多少及部位不固定者，见于

- A.支气管扩张
- B.支气管哮喘
- C.心源性哮喘
- D.慢性支气管炎
- E.肺炎球菌肺炎

答案：D

解析：A 轻微时可无明显体征，一般在扩张部可听到大小不等的湿性啰音，其特点是持久存在。B 桶状胸，呼吸运动减弱，语颤减弱，叩诊高音，听诊呼气时间延长，听觉语音减弱，两肺布满哮鸣音。C 在两肺可闻及较多的干性啰音，有大量粉红色的泡沫痰。D 在肺底部可听到干湿啰音。E 视病变特征及检查时病人所处的阶段而定。可有肺叶实变或胸膜渗出的典型肺部体征，呼吸运动减弱，叩诊浊音，可闻及支气管呼吸音。

278.(B型题)34 急性溶血时，可出现的是

- A.淡红色尿
- B.淡黄色尿
- C.酱油色尿
- D.深黄色尿
- E.乳白色尿

答案：C

解析：红细胞在血管内被大量破坏时（即血管内溶血），原本红细胞内的血红蛋白就会游离出来，使血浆内出现大量游离血红蛋白，并从肾脏排出，称为血红蛋白尿，其颜色呈红葡萄酒色或酱油色。这是急性溶血的证据之一。乳糜尿是丝虫病的主要症状之一，尿色白如牛奶。由于肠道吸收的乳糜液(脂肪皂化后的液体)，不能从正常的淋巴管引流到血循环中去，只能逆流至泌尿系统的淋巴管中，造成泌尿系统中淋巴管内压增高，曲张而破裂使乳糜液溢入尿液中，而出现乳糜尿。

279.(B型题)38X 线下见右上肺有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的是

- A.肺大泡
- B.肺脓肿

- C.浸润型肺结核空洞形成
- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.周围型肺癌空洞形成

答案：D

解析：厚壁空洞 X 线表现为空洞形状不规则的透光影，周围有密度高的实变区。内壁凹凸不平或光滑整齐，多为新形成的空洞，见于肺脓肿、肺结核及肺癌。结核性空洞多无或含少量液体，而肺脓肿的空洞多有明显液面。癌瘤内形成的空洞其内壁多不规则，呈结节状。浸润性肺结核长期迁延未愈，可形成慢性纤维空洞型肺结核，表现为轮廓不光整规则，周围有较广泛的纤维索条影和散在的新老病灶。

280.(A1 型题)1 下列关于感染过程的描述，错误的是

- A.病原体与人体相互作用，相互斗争的过程称为感染过程
- B.感染过程的构成必须具备病原体、人体和外环境三个因素
- C.病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性
- D.病原体侵入的数量越大，出现显性感染的危险也越大
- E.病原体侵入人体，只要发病就意味着感染过程的开始

答案：E

解析：感染是病原体对人体的一种寄生过程。在漫长的进化过程中，有些病原体与人体宿主之间达到了互相适应、互不损害对方的共生状态，当某些因素导致宿主的免疫功能受损或机械损伤时，平衡不复存在而引起宿主的损伤，所以发病并不一定意味着感染过程的开始。故本题选 E。

281.(A1 型题)5 下列各期，流行性出血热患者可出现“三痛”症状的是

- A.发热期
- B.低血压期
- C.少尿期
- D.多尿期
- E.恢复期

答案：A

解析：流行性出血热发热期，患者可出现全身酸痛、头痛和腰痛，少数患者出现眼眶痛。头痛、腰痛和眼眶痛一般称为“三痛”。B 可出现低血压或休克。C 可出现尿毒症、酸中毒和水、电解质紊乱。D 可出现多尿、继发性休克、低钾、低钠症状。E 尿量逐渐恢复，症状、体征基本消失。故本题选 A。

282.(A1 型题)9HIV 主要感染下列哪种细胞

- A.CD + 4 淋巴细胞
- B.B 淋巴细胞
- C.单核细胞
- D.神经胶质细胞
- E.直肠黏膜上皮细胞

答案：A

解析：CD + 4T 淋巴细胞在 HIV 直接和间接作用下，细胞功能受损和大量破坏，导致细胞免疫缺陷。故本题选 A。

283.(A1 型题)13 有关脑膜炎球菌的描述下列哪项是正确的

- A.革兰染色阳性，体外抵抗力很弱，能产生自溶酶
- B.特异性荚膜多糖抗原与其致病作用无关
- C.能产生毒力较强的外毒素
- D.目前我国流行株以 C 群为主
- E.与淋球菌一样也属奈瑟菌属

答案：E

解析：脑膜炎球菌属于脑膜炎奈瑟菌，革兰阴性双球菌，内毒素是致病重要因素，仅存于人体，细胞内寄生，抵抗力弱，产生自溶酶，需要巧克力色血琼脂培养基培养。目前美国流行菌株以 C 群为主，B 群则在欧洲流行，我国和非洲以 A 群为流行菌株，但已有 B、C 群的出现及增多的趋势。故本题选 E。

284.(A1 型题)17 霍乱的典型表现是

- A.黏液脓血便
- B.四肢抽搐，顽固性呕吐
- C.皮肤黏膜出血点
- D.发热，盗汗
- E.腹泻，呕吐

答案：E

解析：霍乱的典型表现是剧烈腹泻、继之呕吐，无腹痛和里急后重，严重者出现脱水和周围循环衰竭。A 见于菌痢。故本题选 E。

285.(B 型题)19 感染 HBV 后出现保护性抗体的标志是

- A.HBsAg 阳性
- B.HBeAg 阳性
- C.抗-HBe 阳性
- D.抗-HBc 阳性
- E.抗-HBs 阳性

答案：E

解析：抗-HBs 是一种保护性抗体，在疾病恢复期出现，临床上作为判断急性乙型肝炎病人预后的指标。HBeAg 在血清中出现与 HBV-DNA 密切相关，是 HBV 活动性复制的标志。A 最早于 HBV 感染后 1~2 周，最迟 11~12 周出现于周围血中，在慢性感染和无症状携带者中可持续存在多年。C 出现提示病毒复制减少或终止。D 出现于 HBsAg 出现后 3~5 周，说明病毒感染处于窗口期，在“大三阳”组合中，它是 HBV 活动性复制的标志之一。

286.(B 型题)22 诺氟沙星治疗

- A.伤寒
- B.血吸虫病
- C.流感
- D.流脑
- E.秋季腹泻

答案：A

解析：流行性脑脊髓膜炎的治疗首选青霉素 G，大剂量，20~40 万单位/kg·d，5~7 天。伤寒的治疗以氟喹诺酮类药物为首选。

287.(B型题)25 在外环境中生存能力最强的痢疾杆菌是

- A.志贺痢疾杆菌
- B.福氏痢疾杆菌
- C.宋内痢疾杆菌
- D.鲍氏痢疾杆菌
- E.舒氏痢疾杆菌

答案：C

解析：痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属，革兰阴性杆菌，无鞭毛。目前分为A、B、C、D四群（分别是志贺、福氏、鲍氏和宋内痢疾杆菌）及47个不同的血清型。生存能力较强（D群>B群>A群）。感染后易转为慢性的是B群福氏痢疾杆菌。

288.(B型题)29 霍乱典型表现为

- A.发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B.发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C.腹泻，呕吐，水样大便，无发热，无腹痛
- D.发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E.低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

答案：C

解析：参见27~28题。

289.(A1型题)1 撰写“医家五戒十要”的医家是

- A.李时珍
- B.陈实功
- C.孙思邈
- D.张仲景
- E.华佗

答案：B

解析：此题暂无解析

290.(A1型题)41976年美国学者提出的医患关系基本模式是

- A.主动-被动型，互相-合作型，平等参与型
- B.主动-合作型，相互-指导型，共同参与型
- C.主动-配合型，指导-合作型，共同参与型
- D.主动-被动型，指导-合作型，共同参与型
- E.主动-被动型，共同参与型，父权主义型

答案：D

解析：1976年美国学者提出的医患关系基本模式是主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。故本题选D。

291.(A1型题)7 下列各项，不符合道德要求的是

- A.尽量为患者选择安全有效的药物
- B.要严格遵守各种抗生素的用药规则，尽可能开患者要求的好药，贵重药物
- C.在医疗过程中要为患者保守秘密

- D.对婴幼儿、老年病人的用药应该谨慎，防止肾功能损害
- E.钻研药理知识，防止粗疏和盲目用药

答案：B

解析：医学道德的范畴包括：①权利与义务；②情感与良心；③审慎与保密。保密是指医务人员在医疗活动中应当具有对医疗和护理保守秘密的职业道德，故不选C。

292.(B型题)10 反映医患关系本质的是

- A.医患关系是一种民事法律关系
- B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C.医患关系是一种商家与消费者的关系
- D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案：B

解析：我国医患关系本质的是以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系。医患关系内容是以医务人员为一方，以患者及家属为一方，在诊断、治疗、护理过程中结成的人际关系。

293.(B型题)14 作为医学伦理学基本范畴的良心是指

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

答案：C

解析：医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福。A为权利，B为义务，D为荣誉与幸福。

294.(A1型题)1 下列各项，不属卫生法制定基本原则的是

- A.公平原则
- B.遵循宪法原则
- C.依照法定权限和程序的原则
- D.坚持民主立法的原则
- E.从实际出发的原则

答案：A

解析：卫生法制定基本原则包括政治原则、宪法原则、国际法原则，卫生行政法的基本原则包括义务本位原则、合法性原则、合理性原则、应急性原则等等，卫生行政法的其他原则包括义务本位原则、合法性原则、合理性原则、应急性原则等。所以公平原则不属卫生法制定基本原则。故本题选A。

295.(A1型题)5 下列各项，不属我国《刑法》规定刑罚的种类是

- A.有期徒刑
- B.撤职
- C.管制
- D.罚金

E.没收财产

答案：B

解析：我国《刑法》规定刑罚的主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。撤职不属我国《刑法》规定刑罚的种类。故本题选 B。

296.(A1 型题)8 医师签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书，对医学文书及有关资料，不得

A.与同行讨论

B.用电脑打印

C.随身携带

D.向主管医生报告

E.隐匿、伪造或者销毁

答案：E

解析：《执业医师法》第二十三条规定：医师实施医疗、预防、保健措施，签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书，不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。故本题选 E。

297.(A1 型题)11 医师开具处方时，除特殊情况外必须注明的是

A.患者体重

B.药品的拉丁文

C.处方药或非处方药

D.临床诊断

E.患者是否为过敏体质

答案：D

解析：处方内容包括①前记：医疗机物名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病例号、科别或病室和床位号、临床诊断、开具日期。麻醉药品和第一类精神药品处方还应包括患者身伤证明编号、代办人姓名、身份证明编号。②正文：以 Rp 或 R 标示，分列药品名称、剂型、规格数量、用法用量。③后记：医师签名或者加盖专用签章，药品金额以及审核调配、核对、发药的药师签名或者加盖专用签章。

298.(A1 型题)2 “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，说明了阴阳之间的哪种关系

A.对立

B.互根

C.消长

D.平衡

E.转化

答案：B

解析：阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。阴阳互用，是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应象大论》说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”指出阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离。故本题选 B。

299.(A1 型题)5 “益火之源，以消阴翳”所指的是

- A.补阴扶阳
- B.阳病治阴
- C.阴中求阳
- D.阳中求阴
- E.阴病治阳

答案：E

解析：阴阳偏衰出现的是虚证，故总的治疗原则是“虚则补之”，即补其不足。分而言之，阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证，治疗当滋阴制阳，用“壮水之主，以制阳光”的治法，《内经》称之为“阳病治阴”。阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证，治疗当扶阳抑阴，用“益火之源，以消阴翳”的治法，《内经》称之为“阴病治阳”。故本题选E。

300.(A1型题)8 肝病传脾在五行关系中属于

- A.相生
- B.相克
- C.相乘
- D.相侮
- E.制化

答案：C

解析：相乘，是相克太过致病。引起五脏相乘的原因有二：一是某脏过盛，而致其所胜之脏受到过分克伐；二是某脏过弱，不能耐受其所不胜之脏的正常克制，从而出现相对克伐太过。如以肝木和脾土之间的相克关系而言，相乘传变就有“木旺乘土”（即肝气乘脾）和“土虚木乘”（即脾虚肝乘）两种情况。由于肝气郁结或肝气上逆，影响脾胃的运化功能而出现胸胁苦满、脘腹胀痛、泛酸、泄泻等表现时，称为“木旺乘土”。故本题选C。

301.(A1型题)11 培土生金法的理论基础是

- A.五行相生
- B.五行相克
- C.五行制化
- D.五行相乘
- E.五行相侮

答案：A

解析：培土生金也称补脾益肺。土为脾，金为肺，借五行相生的理论用补脾益气的方药来补益肺气。故本题选A。

302.(A1型题)14 称为“生痰之源”的脏是

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.脾
- E.肾

答案：D

解析：参见13题。故本题选D。

303.(A1型题)18 主管生殖机能是

- A.肝的功能
- B.心的功能
- C.脾的功能
- D.肺的功能
- E.肾的功能

答案：E

解析：肾主藏精，以气为用，关系着人的生长发育。肾气盛衰直接关系到人的生长发育，乃至衰老的全过程，也关系着人的生殖能力。故本题选E。

304.(A1型题)21 临床上出现呼吸困难，动则喘甚等症，多责之于

- A.心与肾
- B.脾与肾
- C.肺与肾
- D.肝与肾
- E.肝与脾

答案：C

解析：人体的呼吸运动，虽由肺所主，但亦需肾的纳气功能协助。只有肾精、肾气充盛，肾的封藏功能正常，肺吸入的清气才能经过其肃降而下纳于肾，以维持呼吸的深度。可见，在人体呼吸运动中，肺气肃降，有利于肾的纳气；肾精肾气充足，纳摄有权，也有利肺气之肃降。在病理上，肺气久虚，肃降失司，与肾气不足，摄纳无权，往往互为影响，以致出现气短喘促，呼吸表浅，呼多吸少等肾不纳气的病理变化。故本题选C。

305.(A1型题)24 大肠的主要生理功能是

- A.受盛
- B.传化糟粕
- C.化物
- D.泌别清浊
- E.通行元气

答案：B

解析：大肠的主要生理功能是主传导糟粕。饮食物在小肠泌别清浊后，其清者即将水谷精微经脾转输到心肺，布散周身，其浊者即糟粕则下降到大肠，大肠将糟粕经过燥化变为粪便，排出体外。所以说：“大肠者，传道之官，变化出焉。”故本题选B。

306.(A1型题)27 人体最基本、最重要的气是

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.谷气

答案：A

解析：元气，是人体最根本、最重要的气，是人体生命活动的原动力，是由肾中所藏的先天之精生成的，又靠后天之气的滋养。故本题选A。

307.(A1型题)32 被称为“十二经脉之海”的是

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴维脉

答案：A

解析：参见 31 题。故本题选 A。

308.(A1 型题)36 其性凝滞的邪气是

- A.风
- B.寒
- C.湿
- D.燥
- E.火

答案：B

解析：寒性凝滞。凝滞，即凝结阻滞。寒性凝滞，即指寒邪侵入，易使气血津液凝结、经脉阻滞。故本题选 B。

309.(A1 型题)39 导致肾气不固，气陷于下的情志刺激是

- A.怒
- B.悲
- C.惊
- D.恐
- E.喜

答案：D

解析：恐则气下是指过度恐惧伤肾，致使肾气失固，气陷于下的病机变化。临床可见二便失禁，甚则遗精等症。故本题选 D。

310.(A1 型题)43 “阳盛格阴”又称为

- A.阳热亢盛
- B.阳盛伤阴
- C.真寒假热
- D.真热假寒
- E.表热里寒

答案：D

解析：参见 42 题。故本题选 D。

311.(A1 型题)46 用温热方药治疗寒性病证出现的寒象，其治法是

- A.寒者热之
- B.热者寒之
- C.寒因寒用
- D.热因热用
- E.用寒远寒

答案：A

解析：寒者热之，寒指证候的属性；热指治法或方药的性质。寒证表现为寒象，用温热性质的方药治疗，即为寒者热之。故本题选 A。

312.(A2 型题)50 患儿，女，3 岁。凶门未闭，身材矮长，骨骼痿软，行走无力。主要与下列哪种气的功能减弱有关

- A.宗气
- B.营气
- C.卫气
- D.元气
- E.肺气

答案：D

解析：元气的生理功能主要有两个方面，一是推动和调节人体的生长发育和生殖机能，二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。因此，元气不足则易于出现生长发育迟缓、生殖机能低下及未老先衰的病理改变。故本题选 D。

313.(B 型题)54 《内经》说：“诸风掉眩”，皆属于

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.脾
- E.肾

答案：C

解析：《素问·至真要大论》的“谨候气宜，无失病机，谨守病机，各司其属”，指出病机的重要性。而从临床常见的病证中，总结归纳出的“病机十九条”，奠定了脏腑病机和六气病机的基础，如诸湿肿满，皆属于脾，诸风掉眩，皆属于肝等。

314.(B 型题)58 临床上出现心悸，怔忡，心烦，腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交，多责之于

- A.心与肾
- B.脾与肾
- C.肺与肾
- D.肝与肾
- E.肝与脾

答案：A

解析：临床上当心脏出现病变时可以见到心慌、心悸、失眠等症状。肾脏出现病变时可有腰膝酸软、牙齿松动、脱落及小儿齿迟、尿频、遗尿、尿失禁、尿少或尿闭二便失调及男子梦遗，女子梦交等表现。所以，临床上出现水肿、心悸等症，及腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交多责之于心与肾。

315.(B 型题)64 气不能外达而郁结闭塞于内，称之为

- A.气滞
- B.气逆
- C.气陷
- D.气闭

E.气脱

答案：D

解析：气脱是指气失内守，大量散脱于外，从而导致全身性严重气虚，出现功能突然衰竭的病理状态。所以，气外出太过而不能内守，称之为气脱。气闭是指气郁太过，上壅心胸，闭塞清窍，以致突然昏厥，或浊邪外阻，闭塞气道，气的出入失常，以气的外出受阻为主的病理状态。气不能外达而郁结闭塞于内，称之为气闭。

316.(B型题)68 大出血病人，临床上常用独参汤止血，属于

A.因人制宜

B.因地制宜

C.因时制宜

D.标本论治

E.异病同治

答案：D

解析：病证急重时的标本取舍原则是标病急重，则当先治、急治其标。标急的情况多出现在疾病过程中出现的急重甚或危重症状，或卒病而病情非常严重时。大出血病人，由于大出血会危及生命，故不论何种原因的出血，均应紧急止血以治标，临床上常用独参汤止血，待血止，病情缓和后再治其病本。脱肛、子宫脱垂用补中益气汤治疗是因为虽然它们是不同的病，但是它们具有相同的证，根据辨证论治的原则，证相同其治法也相同。

317.(B型题)69 “衄家不可发汗”、“亡血家不可发汗”，属于

A.因人制宜

B.因地制宜

C.因时制宜

D.标本论治

E.病治异同

答案：A

解析：根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，来制订适宜的治疗原则，称为“因人制宜”。不同的患者有其不同的个体特点，应根据每个患者的年龄、性别、体质等不同的个体特点来制定适宜的治则。病证急重时的标本取舍原则是标病急重，则当先治、急治其标。如大出血病人，由于大出血会危及生命，故临床上常用独参汤止血，待血止，病情缓和后再治其病本。

318.(A1型题)1 按照药性升降浮沉理论，下列选项中，具有沉降特性的是

A.解表药

B.活血药

C.温里药

D.清热药

E.开窍药

答案：D

解析：一般具有泻下、清热、利尿、渗湿、重镇安神、消导积滞等功效的药物，则能下行向内，药性都是沉降的。故本题选D。

319.(A1型题)3 甘草与芫花配伍，属于

A.相须

- B.相使
- C.相畏
- D.相杀
- E.相反

答案：E

解析：相反即两药合用，能产生或增强毒性反应或副作用，如“十八反”、“十九畏”中的若干药物。故本题选E。

320.(A1型题)6 羌活的性味是

- A.辛、甘、温
- B.辛、苦、温
- C.辛、涩、温
- D.辛、碱、温
- E.辛、酸、温

答案：B

解析：羌活的性味辛、苦、温。故本题选B。

321.(A1型题)8 苍耳子具有的功效是

- A.清头目
- B.利咽喉
- C.祛风湿
- D.利水
- E.平喘

答案：C

解析：苍耳子功效散风除湿，通鼻窍。所以苍耳子具有祛风湿的功效。故本题选C。

322.(A1型题)10 具有清利头目功效的药物是

- A.蔓荆子
- B.葛根
- C.柴胡
- D.升麻
- E.白芷

答案：A

解析：蔓荆子具有疏散风热，清利头目。所以蔓荆子具有清利头目功效。故本题选A。

323.(A1型题)12 治疗风热郁闭、咽喉肿痛、大便燥结者，应首选

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.菊花
- D.蔓荆子
- E.牛蒡子

答案：E

解析：牛蒡子疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、疔腮、丹毒、痈肿疮毒。故本题选E。

324.(A1 型题)14 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- A.燥湿
- B.泻火
- C.解毒
- D.清肺热
- E.退虚热

答案：D

解析：黄芩归肺经，功效清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。黄柏归肾经，功效清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。故本题选 D。

325.(A1 型题)16 清泻心经实火的药物是

- A.龙胆草
- B.苦参
- C.黄柏
- D.黄连
- E.黄芩

答案：D

解析：黄连归心经、功效清热燥湿，泻火解毒。古云“黄连苦燥，乃入心经……泻心实”。所以黄连清泻心经实火。故本题选 D。

326.(A1 型题)18 功擅凉血，解毒，养阴的药物是

- A.生地
- B.玄参
- C.牡丹皮
- D.紫草
- E.大青叶

答案：B

解析：玄参的功效清热凉血，泻火解毒，滋阴。生地的功效清热凉血，养阴，生津。丹皮功效清热凉血，活血行瘀。紫草功效凉血，活血，解毒透疹。大青叶功效清热，解毒，凉血，止血。所以玄参的功效凉血，解毒，养阴。故本题选 B。

327.(A1 型题)21 具有疏散风热功效的药物是

- A.金银花
- B.大青叶
- C.鱼腥草
- D.穿心莲
- E.淡竹叶

答案：A

解析：金银花的功效是疏散风热。大青叶治疗热入营血。鱼腥草清肺热。穿心莲清热凉血。淡竹叶主治热病烦渴。故本题选 A。

328.(A1 型题)23 贯众具有的功效是

- A.止血

- B.止泻
- C.止呕
- D.止咳
- E.止痒

答案：A

解析：贯众的功效为清热解毒，凉血止血，杀虫。故本题选 A。

329.(A1 型题)31 具有消毒散结功效的药物是

- A.番泻叶
- B.牵牛子
- C.甘遂
- D.郁李仁
- E.芦荟

答案：C

解析：甘遂功效泻水逐饮，用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利，消肿散结；外用可治痈肿疮疡。故本题选 C。

330.(A1 型题)34 祛风湿药的药性大多为

- A.甘寒滋润
- B.辛温性燥
- C.苦寒性燥
- D.酸涩性敛
- E.甘温燥热

答案：B

解析：祛风湿药的药性为辛温性燥。故本题选 B。

331.(A1 型题)37 砂仁入汤剂宜

- A.先煎
- B.后下
- C.另煎
- D.包煎
- E.烊化

答案：B

解析：砂仁入汤剂宜后下。故本题选 B。

332.(A1 型题)40 既利水消肿，渗湿健脾，又用于阑尾炎的是

- A.薏苡仁
- B.车前子
- C.五加皮
- D.茯苓
- E.滑石

答案：A

解析：A 利水消肿，渗湿，健脾，除痹，清热排脓。主治：①水肿，小便不利，脚气；②脾虚泄泻；③湿痹拘挛；④肺痈，肠痈。B 利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。C 祛风湿，补

肝肾，强筋骨，利水。D 利水消肿，渗湿，健脾，宁心。E 利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮。故本题选 A。

333.(A1 型题)46 治疗月经不调，伴有乳房胀痛，胁肋胀满，舌苔薄白，脉弦者，应首选

- A.木香
- B.香附
- C.当归
- D.红花
- E.川楝子

答案：B

解析：香附理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，月经不调，经闭痛经，寒疝腹痛，乳房胀痛。故本题选 B。

334.(A1 型题)49 具有疏肝和胃，燥湿化痰功效的药物是

- A.橘皮
- B.青皮
- C.佛手
- D.枳实
- E.香附

答案：C

解析：佛手的功效是疏肝和胃，燥湿化痰。故本题选 C。

335.(A1 型题)52 三七、茜草、蒲黄的共同功效是

- A.凉血止血
- B.收敛止血
- C.温经止血
- D.化瘀止血
- E.补气摄血

答案：D

解析：三七的功效是散瘀止血，消肿定痛。茜草的功效是凉血，止血，祛瘀，通经，镇咳，祛痰。蒲黄的功效是止血，化瘀，通淋。故本题选 D。

336.(A1 型题)55 能行气活血，清心利胆的药物是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.姜黄
- D.莪术
- E.郁金

答案：E

解析：A 活血行气，祛风止痛。B 活血，行气，止痛。C 活血行气，通经止痛。D 破血行气，消积止痛。E 活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。故本题选 E。

337.(A1 型题)59 具有清热化痰、除烦止呕功效的药物是

- A.枇杷叶

- B.淡竹叶
- C.竹茹
- D.芦根
- E.天花粉

答案：C

解析：竹茹清热化痰，除烦止呕。主治：①痰热、肺热咳嗽，痰热心烦不寐；②胃热呕吐、妊娠恶阻。淡竹叶清热除烦，利尿。芦根清热生津，除烦，止呕，利尿。天花粉清热生津，除烦，止呕，利尿。故本题选C。

338.(A1型题)62 磁石具有的功效是

- A.潜阳安神
- B.养心安神
- C.解郁安神
- D.祛痰止咳
- E.收敛固涩

答案：A

解析：参见61题。故本题选A。

339.(A1型题)65 人参具有的功效是

- A.托毒生肌
- B.安神增智
- C.破气消积
- D.润肺止咳
- E.健脾化湿

答案：B

解析：人参性甘、微苦，功效为大补元气，补脾益肺，生津，安神益智。故本题选B。

340.(A1型题)69 治疗畏寒肢冷，腰膝酸痛，小便频数，精神疲乏，并见疮疡不敛者，应首选

- A.党参
- B.黄芪
- C.鹿茸
- D.续断
- E.何首乌

答案：C

解析：党参补脾肺气，补血，生津。黄芪健脾补中，升阳举陷，益卫固表，利尿，托毒生肌。鹿茸主治畏寒肢冷，腰膝酸痛，小便频数，精神疲乏，并见疮疡不敛者。续断补益肝肾，强筋健骨，止血安胎，疗伤续折。何首乌制用补益精血，生用解毒，截疟，润肠通便。故本题选C。

341.(A1型题)72 既能收敛止血，又能收湿敛疮的药物是

- A.桑螵蛸
- B.五味子
- C.蛇床子
- D.侧柏叶

E.乌贼骨

答案：E

解析：桑螵蛸固精缩尿，补肾助阳。五味子收敛固涩，益气生津，补肾宁心。蛇床子杀虫止痒，燥湿，温肾壮阳。侧柏叶凉血止血，化痰止咳，生发乌发。乌贼骨收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。故本题选E。

342.(A1型题)73 具有补脾止泻，益肾固精功效的药物是

A.杜仲

B.乌梅

C.莲子

D.续断

E.狗脊

答案：C

解析：杜仲补肝肾，强筋骨，安胎。乌梅敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴。莲子补脾止泻，益肾固精，养心安神。续断补益肝肾，强筋健骨，止血安胎，疗伤续折。狗脊祛风湿，补肝肾，强腰膝。故本题选C。

343.(A2型题)74 患儿风热郁肺，发热咽痛，伴有惊哭夜啼，治疗应首选

A.防风

B.荆芥

C.蝉蜕

D.薄荷

E.紫苏

答案：C

解析：蝉蜕主治风热感冒，咽痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。防风主治外感表证，风疹瘙痒，风湿痹痛，破伤风。荆芥主治感冒，麻疹透发不畅，便血、崩漏、鼻衄。薄荷主治外感风热，头痛，目赤，咽喉肿痛，食滞气胀，口疮，牙痛，疮疥，隐疹。紫苏主治风寒感冒，脾胃气滞，解鱼蟹毒。故本题选C。

344.(A2型题)77 患者外感风邪，头痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮，治疗宜选用

A.川芎

B.丹参

C.郁金

D.牛膝

E.益母草

答案：A

解析：川芎活血行气，祛风止痛，适用于血瘀气滞痛证、头痛、风湿痹痛等证。丹参活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神。郁金活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。牛膝活血通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火下行。益母草活血调经，利水消肿，清热解毒。故本题选A。

345.(A2型题)80 患者阳痿，滑精，尿频，腰膝冷痛。治疗宜选用

A.补骨脂

B.枸杞子

- C.熟地黄
- D.党参
- E.山药

答案：A

解析：补骨脂补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘，适用于：①肾虚阳痿，腰膝冷痛；②肾虚遗精、遗尿、尿频；③脾肾阳虚五更泄泻；④肾不纳气，虚寒喘咳。故本题选 A。

346.(A2 型题)81 患者面色萎黄，眩晕，心悸，失眠，月经不调，兼见耳鸣，舌淡，脉弱。治疗应首选

- A.骨碎补
- B.补骨脂
- C.枸杞子
- D.熟地黄
- E.黄精

答案：D

解析：骨碎补活血续伤，补肾强骨。补骨脂补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。枸杞子滋补肝肾，益精明目。熟地黄补血养阴，填精益髓，适用于血虚诸证及肝肾阴虚诸证。黄精补气养阴，健脾，润肺，益肾。故本题选 D。

347.(B 型题)84 用于平喘、宜蜜炙用的药物是

- A.紫苏
- B.荆芥
- C.香薷
- D.麻黄
- E.生姜

答案：D

解析：荆芥发表、透疹、消疮宜生用；止血宜炒用。麻黄发汗解表宜生用，止咳平喘多炙用。

348.(B 型题)86 具有利尿功效的药物是

- A.白头翁
- B.大青叶
- C.穿心莲
- D.射干
- E.鱼腥草

答案：E

解析：白头翁清热解毒，凉血止痢。大青叶清热解毒，凉血消斑。穿心莲清热解毒，凉血，消肿，燥湿。射干清热解毒，祛痰，利咽。鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。

349.(B 型题)88 可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案：C

解析：鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。主肺痈吐脓，痰热喘咳，喉蛾，热痢，痈肿疮毒，热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。

350.(B型题)90 醋制可增强止痛作用的药物是

- A.白茅根
- B.蒲黄
- C.白及
- D.郁金
- E.延胡索

答案：E

解析：白茅根凉血止血，清热利尿。用于血热出血证、水肿、热淋、黄疸、胃热呕吐、肺热咳嗽等，生用可治疗产后子宫收缩不良出血。故 89 题选 A。延胡索醋制可增强止痛作用。故 90 题选 E。

351.(B型题)92 既能化瘀止血，又能利尿通淋的药物是

- A.三七
- B.蒲黄
- C.茜草
- D.白及
- E.白茅根

答案：B

解析：A 化瘀止血，活血定痛。B 止血，化瘀，利尿。C 凉血化瘀止血，通经。D 收敛止血，消肿生肌。E 凉血止血，清热利尿，清肺胃热。

352.(B型题)94 治疗湿阻胸脘痞闷，宜选用

- A.白芥子
- B.杏仁
- C.半夏
- D.桔梗
- E.竹茹

答案：C

解析：A 温肺化痰，利气，散结消肿。B 止咳平喘，润肠通便。C 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。其主治证候有：①湿痰，寒痰证；②呕吐；③心下痞，结胸，梅核气；④瘰疬，痰核，痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D 宣肺，祛痰，利咽，排脓。E 清热化痰，除烦止呕。

353.(B型题)96 白芥子具有的功效是

- A.燥湿化痰
- B.温肺化痰
- C.降气化痰
- D.宣肺化痰
- E.清热化痰

答案：B

解析：旋覆花降气行水化痰，降逆止呕，适用于痰饮蓄结，胸膈痞满，噫气，呕吐等证，故 95 题选 C。白芥子温肺化痰，利气，散结消肿，故 96 题选 B。

354.(B 型题)98 具有益肾固精，养心安神功效的药物是

- A.山茱萸
- B.桑螵蛸
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

答案：C

解析：A 补益肝肾，收敛固涩。B 固精缩尿，补肾助阳。C 固精止带，补脾止泻，益肾养心。D 涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。E 固精缩尿止带，涩肠止泻。

355.(A1 型题)3 从方剂组成变化而论，桂枝汤与小建中汤之间的变化属于

- A.药味加减
- B.药量加减
- C.剂型更换
- D.药味与药量加减变化的联合运用
- E.药味加减与剂型更换变化的联合运用

答案：D

解析：小建中汤在桂枝汤的基础上加了饴糖这位药，并将其重用为君药。另将芍药倍用以增强养阴柔肝的功效。故在药味与药量上均有变化。故本题选 D。

356.(A1 型题)6 银翘散的功效是

- A.辛凉宣泄，清肺平喘
- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热，清肝明目

答案：C

解析：B 属于桑菊饮的功效，A 属于麻杏甘石汤的功效，辛凉透表，清热解毒，C 属于银翘散的功效。故本题选 C。

357.(A1 型题)9 桑菊饮的功效是

- A.辛凉宣泄、清肺平喘
- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热、清肝明目

答案：B

解析：桑菊饮的功效为疏风清热，宣肺止咳。A 是麻杏甘石汤的功效。C 是银翘散的功效。故本题选 B。

358.(A1 型题)12 下列除哪项外，均是大承气汤主治证的临床表现

- A.腹痛便秘
- B.小便频数
- C.潮热谵语
- D.手足汗出
- E.下利清水

答案：B

解析：①阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。②热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。故本题选B。

359.(A1型题)15 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- D.柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
- E.半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣

答案：E

解析：半夏泻心汤：半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。小柴胡汤：柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏、生姜、大枣。故本题选E。

360.(A1型题)18 清泻肺热，平喘止咳的方剂是

- A.泻白散
- B.桑杏汤
- C.定喘汤
- D.苇茎汤
- E.清气化痰丸

答案：A

解析：A清泻肺热，止咳平喘。B清宣温燥，润肺止咳。C宣降肺气，清热化痰。D清肺化痰，逐瘀排脓。E清热化痰，理气止咳。故本题选A。

361.(A1型题)22 肝胆湿热下注，阴肿阴痒，小便淋浊，带下黄臭者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：参见21题。故本题选B。

362.(A1型题)25 吴茱萸汤与小建中汤组成中均含有的药物是

- A.人参
- B.芍药
- C.桂枝

- D.生姜
- E.炙甘草

答案：D

解析：吴茱萸汤的组成有吴茱萸、人参、生姜、大枣；小建中汤的组成有芍药、桂枝、炙甘草、生姜、大枣、红糖。故本题选D。

363.(A1型题)29 一贯煎中的君药是

- A.北沙参
- B.麦冬
- C.当归身
- D.枸杞子
- E.生地黄

答案：E

解析：一贯煎方中重用生地黄为君，滋养阴血，补益肝肾；而其余选项为臣，益阴养血而柔肝，配合君药以补肝体，育阴而潜阳。故本题选E。

364.(A1型题)31 越鞠丸的组成药物中含有

- A.苍术、黄柏
- B.苍术、厚朴
- C.苍术、白术
- D.苍术、羌活
- E.苍术、川芎

答案：E

解析：越鞠丸的药物组成有香附、川芎、苍术、栀子、神曲。故本题选E。

365.(A1型题)32 朱砂安神丸所治之失眠多梦的病因病机是

- A.心火偏亢，阴血不足
- B.阴亏血少，血不养心
- C.气虚血少，心神失养
- D.阴血不足，虚火扰心
- E.心脾两虚，神志不宁

答案：A

解析：上述症状由心火亢盛，灼伤阴血所致。心火亢盛则心神被扰，阴血不足则心神失养，故见失眠多梦、惊悸怔忡、心烦等症；舌红，脉细数是心火盛而阴血虚之征。治当泻其亢盛之火，补其阴血之虚而安神。故本题选A。

366.(A1型题)34 四神丸的功效是

- A.敛肺止咳，益气养阴
- B.温肾暖脾，固肠止泻
- C.敛阴止汗，益气固表
- D.涩肠固脱，温补脾肾
- E.调补心肾，涩精止遗

答案：D

解析：四神丸治疗由脾肾阳虚所致的泄泻。方中补骨脂补命门之火，以温养脾土；肉豆蔻温

脾暖胃，涩肠止泻；吴茱萸温暖肝脾肾，以散阴寒；生姜散寒；大枣补脾养胃。故本题选 D。

367.(A1 型题)37 生化汤除活血化瘀外，还具有的功效是

- A. 滋阴养血
- B. 补气温阳
- C. 行气散结
- D. 温经止痛
- E. 疏肝解郁

答案：D

解析：生化汤的功效养血祛瘀，温经止痛。故本题选 D。

368.(A1 型题)39 下列何药为黄土汤组成中的药物

- A. 荷叶
- B. 青黛
- C. 槐花
- D. 藕节
- E. 阿胶

答案：E

解析：黄土汤的组成有甘草、干地黄、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土。故本题选 E。

369.(A1 型题)41 补阳还五汤的主治证候中包括

- A. 二便不利
- B. 下利溏薄
- C. 大便秘结
- D. 小便频数
- E. 小便不利

答案：D

解析：补阳还五汤主治中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，小便频数或遗尿失禁，舌暗淡，苔白，脉缓无力。故本题选 D。

370.(A1 型题)42 治疗跌打损伤，瘀血留于胁下，痛不可忍的常用方剂是

- A. 桃核承气汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 补阳还五汤
- E. 复元活血汤

答案：E

解析：复元活血汤主治跌打损伤，瘀血阻滞证。胁肋瘀肿，痛不可忍。本方证因跌打损伤，瘀血滞留胁肋，气机阻滞所致。胁肋为肝经循行之处，跌打损伤，瘀血停留，气机阻滞，故胁肋瘀肿疼痛，甚至痛不可忍。治当活血祛瘀，兼以疏肝行气通络。故本题选 E。

371.(A2 型题)59 患者外感风寒，头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，口不渴，脉浮缓。治疗应选用

- A. 麻黄汤

- B.桂枝汤
- C.银翘散
- D.桑菊饮
- E.麻杏甘石汤

答案：B

解析：上述症状为外感风寒、营卫不和所致。外感风邪，风性开泄，卫气因之失其固护之性，“阳强而不能密”，不能固护营阴，致令营阴不能内守而外泄，故恶风发热，汗出头痛，脉浮缓等；邪气郁滞，肺胃失和，则鼻鸣干呕；风寒在表，应辛温发散以解表，但本方证属表虚，腠理不固，故当解肌发表，调和营卫，即祛邪调正兼顾为治。故本题选 B。

372.(A2 型题)61 肠痈初起患者，右少腹疼痛拒按，右足屈而不伸，伸则痛甚，时时发热，身汗恶寒，舌苔黄腻。治疗应首选

- A.仙方活命饮
- B.大黄牡丹汤
- C.普济消毒饮
- D.阳和汤
- E.黄连解毒汤

答案：B

解析：上述症状多由肠中湿热郁蒸，气血凝聚所致。湿热与气血互结成痈，不通则痛，故右少腹疼痛拒按。喜屈右足而不伸，伸则痛剧，是为缩脚肠痈；时时发热，身汗恶寒，是肠痈已成；舌苔黄腻为湿热内蕴之征。本证属于肠痈初起，湿热瘀滞证，治宜泻热破瘀，散结消肿。故本题选 B。

373.(A2 型题)63 患者眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，脉弦长有力。治疗应选用

- A.川芎茶调散
- B.天麻钩藤饮
- C.半夏白术天麻汤
- D.镇肝熄风汤
- E.羚角钩藤汤

答案：D

解析：肝为风木之脏，体阴而用阳，肝肾阴虚，肝阳偏亢，阳亢化风，风阳上扰，故见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面红如醉；肾水不能上济心火，心肝火盛，则心中烦热。治法应以镇肝熄风，滋阴潜阳。故本题选 D。

374.(A2 型题)65 患者，男，58 岁。近日胸膈痞闷，脘腹胀痛，噯腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。治疗应首选

- A.藿香正气散
- B.平胃散
- C.半夏厚朴汤
- D.半夏泻心汤
- E.越鞠丸

答案：B

解析：脾为太阴湿土，居中州而主运化，其性喜燥恶湿，湿邪滞于中焦，则脾运不健，且气

机受阻，故见胸膈痞闷，脘腹胀痛；胃失和降，上逆而为呕吐恶心、嗳气吞酸；湿为阴邪，其性重着黏腻，故为肢体沉重、怠惰嗜卧。湿邪中阻，下注肠道，则为泄泻。治当燥湿运脾为主，兼以行气和胃，使气行则湿化。故本题选 B。

375.(B 型题)67 患者外感风寒湿邪，恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，治疗应选用

- A.防风通圣散
- B.九味羌活汤
- C.藿香正气散
- D.川芎茶调散
- E.败毒散

答案：B

解析：风寒湿邪侵犯肌表，郁遏卫阳，闭塞腠理，阻滞经络，气血运行不畅，故恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛；里有蕴热，故口苦微渴；苔白或微黄，脉浮是表证兼里热之佐证。治当发散风寒湿邪为主，兼清里热为辅。故 67 题选 B。风寒湿邪袭于肌表，卫阳被遏，正邪交争，故见憎寒壮热，无汗；客于肢体、骨节、经络，气血运行不畅，故头项强痛，肢体酸痛；风寒犯肺，肺气郁而不宣，津液聚而不布，故咳嗽有痰，鼻塞声重，胸膈痞闷；舌苔白腻，脉浮按之无力，正是虚人外感风寒兼湿之佐证。治疗应该散寒祛湿，益气解表。故 68 题选 E。

376.(B 型题)69 蒿芩清胆汤的功效是

- A.和解少阳，内泻热结
- B.和胃降逆，开结除痞
- C.寒热平调，消痞散结
- D.清胆利湿，和胃化痰
- E.理气化痰，清胆和胃

答案：D

解析：蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重，兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故 69 选 D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，具有和解和泻下双重功效。故 70 题选 A。

377.(B 型题)71 肝胆实火上炎，头痛目赤，胁痛口苦，耳聋耳肿者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：A 镇肝熄风，滋阴潜阳。B 泻肝胆实火，清下焦湿热，用于肝胆实火上扰之证。C 清热泻火，利水通淋，用于湿热淋证。D 清胆利湿，和胃化痰。E 利湿化浊，清热解毒。

378.(B 型题)74 治疗热邪内陷心包，神昏谵语者，应首选

- A.羚角钩藤汤
- B.紫雪

- C.镇肝熄风汤
- D.苏合香丸
- E.生脉散

答案：B

解析：A 凉肝熄风，增液舒筋。B 清热开窍，熄风止痉，用于温热病，热闭心包及热盛动风之证。C 镇肝熄风，滋阴潜阳。D 芳香开窍，行气止痛。E 益气生津，敛阴止汗。适用于温热、暑热、耗气伤阴证以及久咳伤肺、气阴两虚证。

379.(B 型题)76 四物汤的功效是

- A.补血调血
- B.健脾养心
- C.敛阴止汗
- D.益气健脾
- E.温补肾阳

答案：A

解析：四君子汤益气健脾，适用于脾胃气虚证。四物汤补血和血，调经化瘀，适用于营血虚滞证。

380.(B 型题)78 咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案：B

解析：四神丸的组成有：肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。咳血方的组成有：青黛、瓜蒌仁、海粉、山梔子、诃子。故 77 题选 E，故 78 题选 B。

381.(B 型题)80 患者头痛发热，烦渴欲饮，水入即吐，小便不利，舌苔白，脉浮。治疗应选用

- A.猪苓汤
- B.五苓散
- C.防己黄芪汤
- D.实脾散
- E.真武汤

答案：B

解析：A 利水，养阴，清热，适用于水热互结证。B 利水渗湿，温阳化气。主治膀胱气化不利之蓄水证。C 益气祛风，健脾利水。D 温阳健脾，行气利水。E 温阳利水。

382.(B 型题)81 治疗痰热咳嗽，应首先考虑的方剂是

- A.二陈汤
- B.温胆汤
- C.止嗽散
- D.贝母瓜蒌散

E.清气化痰丸

答案：E

解析：A 主治痰湿咳嗽。B 主治胆胃不和，痰热内扰证。C 主治外感咳嗽表邪未尽的病证。D 主治燥痰咳嗽。E 主治痰热咳嗽。

383.(A1 型题)3 按常用骨度分寸，前额两发角之间为

A.5 寸

B.6 寸

C.7 寸

D.8 寸

E.9 寸

答案：E

解析：按骨度分寸定位法，5 寸为脐中至耻骨联合上方距离；6 寸为两肩胛骨脊柱之间距离；7 寸为两颧之间距离；8 寸为两乳头或两锁骨中点之间距离；9 寸为两发角之间距离。故本题选 E。

384.(A1 型题)5 下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

A.公孙、内关

B.后溪、申脉

C.足临泣、外关

D.列缺、照海

E.膻中、中脘

答案：A

解析：通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关，通合于心、胸、胃，对于气机不利，气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患，具有理气降逆，通肠和胃，宣通上下的功效，呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等，凡适用于上法者，均可取此二穴施治；通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉，通合于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱，两穴相配，主治头项、耳、目、肩、腰背疾患；通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣，通合于目锐眦、耳后、颈项、肩，二穴配伍，主治耳、目、颈项及肩部病；通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海，通合于肺系、咽喉和胸膈，二穴配伍，主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证；膻中利气，宽胸，催乳，主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等；中脘主治胃部疾患。故本题选 A。

385.(A1 型题)7 气海穴的定位是前正中线上

A.脐下 0.5 寸

B.脐下 1 寸

C.脐下 1.5 寸

D.脐下 2 寸

E.脐下 2.5 寸

答案：C

解析：气海在下腹部，前正中线上，当脐中下 1.5 寸。故本题选 C。

386.(A1 型题)9 下列操作，属于针刺补法的是

A.捻转角度大

B.捻转频率快

- C.操作时间长
- D.先深后浅
- E.重插轻提

答案：E

解析：A、B 都是捻转补泻法中的泻法；无论捻转补泻，还是提插补泻，操作时间长都是泻法；D 是提插补泻法中的泻法；E 是提插补泻法中的补法。故本题选 E。

387.(A1 型题)11 漏肩风主要与以下哪组经脉的阻滞不通有关

- A.手太阳、手少阳、手厥阴
- B.手太阳、手阳明、手太阴
- C.手太阳、手阳明、手少阳
- D.手太阴、手厥阴、足少阳
- E.手阳明、手太阳、足少阳

答案：C

解析：手之三阳，从手走头。根据其经脉的循行部位即可推断漏肩风主要与手三阳相关。肩前部疼痛明显，为手阳明经证；肩后部疼痛明显，为手太阳经证；肩外侧疼痛明显，为手少阳经证。故本题选 C。

388.(A2 型题)14 肋部皮肤始发灼热疼痛，继则出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数，治疗本病除局部阿是穴、夹脊外，宜选取

- A.神门、大陵
- B.合谷、列缺
- C.血海、膈俞
- D.血海、内庭
- E.行间、阳陵泉

答案：E

解析：患者出现簇集粟粒大小丘状疱疹，此为蛇串疮的典型表现。其治法以泻火解毒，清热利湿为主。其取穴除阿是穴、夹脊穴等主穴外，若肝郁火盛，则配以行间、大敦、阳陵泉；若脾胃湿热，则配以血海、隐白、内庭。故本题选 E。

389.(A2 型题)16 某男，63 岁。头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

答案：D

解析：患者主诉头晕目眩，甚则昏眩欲仆，故可诊断为眩晕。耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细为肾精亏损之象。故治法以益气养血定眩。取穴时除风池、百会、肝俞、肾俞、足三里外，应配以太溪、悬钟、三阴交。故本题选 D。

390.(B 型题)20 特定穴中，多用于急救的是

- A.原穴

- B.郄穴
- C.络穴
- D.井穴
- E.募穴

答案：D

解析：特定穴中，原穴可调整脏腑经络的功能，既可补虚，又可泻实；阴经郄穴有止血作用，阳经郄穴偏于止痛；络穴一络通二经，即络穴不仅治本经病，也能治其相表里经的病证；井穴具有交通阴阳气血的作用，多用于急救，有开窍醒神，消炎镇痛之效；募穴可治本脏腑病及阳经经络病症。

391.(A1 型题)2 慢性支气管炎急性发作风寒袭肺证，治疗应首选

- A.止嗽散
- B.泻肺散
- C.桑杏汤
- D.二陈汤
- E.参苏饮

答案：A

解析：风寒袭肺证，治以疏风散寒、宣肺止咳，方用止嗽散。B多用于肺热咳喘证。C多用于风燥伤肺证。D常与三子养亲汤合用，用于痰湿蕴肺证。E多用于气虚外感风寒，内有痰湿证。故本题选A。

392.(A1 型题)6 支气管哮喘缓解期肺虚证的治法是

- A.健脾化痰
- B.补肾纳气
- C.补肺固卫
- D.温肺散寒
- E.清热宣肺

答案：C

解析：支气管哮喘缓解期肺虚证治宜补肺固卫，方用玉屏风散加减。A为脾虚证的治法。B为肾虚证的治法。D为肺寒证的治法，E为肺经郁火证的治法。故本题选C。

393.(A1 型题)10 治疗肺炎表寒肺热型，应首选

- A.银翘散
- B.桑菊饮
- C.千金苇茎汤
- D.麻杏石甘汤
- E.泻白散

答案：D

解析：肺炎表寒肺热证应治以解表清里，化痰平喘，方用麻杏石甘汤。A、B多用于治疗风热犯表证。C多用于肺痈之肺热证。E多用于肺热咳嗽证。故本题选D。

394.(A1 型题)15 治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证，应首选的方剂是

- A.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B.血府逐瘀汤

- C.导痰汤
- D.沙参麦冬汤
- E.十枣汤

答案：D

解析：治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证，治以益气养阴，方用沙参麦冬汤。A用于阴虚毒热证。B多用于瘀血证。C用于痰湿毒蕴。E多用于伏饮积痰证。故本题选D。

395.(A1型题)20 治疗心力衰竭心肾阳虚、水饮泛滥证，应首选

- A.圣愈汤合小陷胸汤
- B.参附汤合葶苈大枣泻肺汤
- C.四逆汤合参附龙牡汤
- D.真武汤合五苓散
- E.保元汤合四物汤

答案：D

解析：心力衰竭心肾阳虚、水饮泛滥证应治以温补心肾、逐饮利水，方用真武汤合五苓散。A用于心肺气虚，痰瘀痹阻证。B用于心肾阳虚，痰饮上逆证。C用于心肾阳虚，虚阳外越证。E用于气血两虚证。故本题选D。

396.(A1型题)24 原发性高血压是指

- A.慢性肾炎引起的高血压
- B.肾动脉狭窄引起的高血压
- C.嗜铬细胞瘤引起的高血压
- D.原发性醛固酮增多症引起的高血压
- E.未明原因的高血压

答案：E

解析：原发性高血压是指原因不明的高血压，而A、B、C、D均是继发性高血压，即血压升高是某些疾病的一种临床表现，本身有明确而独立的病因。故本题选E。

397.(A1型题)28 治疗高血压病痰湿内盛证，应首选的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.天麻钩藤饮
- E.济生肾气丸

答案：A

解析：治疗高血压病痰湿内盛证，宜燥湿化痰，方用半夏白术天麻汤。B用于痰浊闭阻之胸痹。C多用于寒凝心脉证。D治疗肝阳上亢证。E多用于肾虚水肿证。故本题选A。

398.(A1型题)32 下列除哪项外，均可用于治疗心绞痛发作

- A.硝酸甘油
- B.硝苯地平(心痛定)
- C.硝酸异山梨醇酯(消心痛)
- D.美托洛尔
- E.阿司匹林

答案：E

解析：心绞痛发作时，常使用：①作用快的硝酸酯制剂。这类药物除扩张冠状动脉，降低其阻力，增加其血流量外，还通过对周围血管的扩张作用缓解心绞痛。如硝酸甘油、二硝酸异山梨醇、亚硝酸异戊酯等。② β -受体阻滞剂，这类药物能减低心肌收缩力和耗氧量，从而缓解心绞痛的发作。如普萘洛尔、美托洛尔、氧烯洛尔等。③钙通道阻滞剂，如维拉帕米、硝苯地平、地尔硫等。E一般多用于防治心肌梗死、脑血栓的形成。故本题选E。

399.(A1型题)37 下列哪项不是风湿性心脏瓣膜病的病机

- A.气虚
- B.血虚
- C.阴虚或阳虚
- D.水饮内停
- E.瘀血内阻

答案：B

解析：风湿性心脏瓣膜病病因多为外感风湿邪毒，内舍于心，或久病失治，邪毒入心所致。病机关键为气阴亏虚，湿饮瘀阻，心阳不振。病位在心，与肺、脾、肾关系密切。本病大都呈现本虚标实，且以标实为主。故本题选B。

400.(A1型题)41 消化性溃疡最主要的症状是

- A.节律性上腹疼痛
- B.嗝气，反酸
- C.恶心，呕吐
- D.食欲减退
- E.呕血，黑便

答案：A

解析：消化性溃疡主要表现为周期性、节律性慢性上腹疼痛，常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、药物影响、气候变化等因素诱发或加重；可因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。故本题选A。

401.(A1型题)45 治疗胃癌痰瘀内结证，应首选

- A.生化汤
- B.丹参饮
- C.一贯煎
- D.失笑散
- E.膈下逐瘀汤

答案：E

解析：胃癌痰瘀互结证应治以理气活血，化痰消积，方用膈下逐瘀汤加减。A多用于产后瘀血腹痛。B多用于气滞血瘀证。C多用于胃阴不足证。D多用于瘀血阻滞证。故本题选E。

402.(A1型题)49 胃癌胃热伤阴证的治法是

- A.疏肝和胃，降逆止痛
- B.温中散寒，健脾益气
- C.清热和胃，养阴润燥
- D.理气活血，软坚消积

E.燥湿健脾，消痰和胃

答案：C

解析：胃癌胃热伤阴证的治法是清热和胃，养阴润燥，方用益胃汤。A为肝胃不和证的治法。B为脾胃虚寒证的治法。D为气滞血瘀证的治法。E为脾虚痰湿证的治法。故本题选C。

403.(A1型题)53 肝硬化气滞湿阻证的治法是

A.温补脾肾，通阳利水

B.滋养肝肾，育阴利水

C.活血化瘀，利水消肿

D.运脾利湿，行气化水

E.疏肝理气，行湿散满

答案：E

解析：肝硬化气滞湿阻证常治以疏肝理气、行湿散满。余项参见52题。故本题选E。

404.(A1型题)57 治疗原发性肝癌气滞血瘀证，应首选

A.犀角地黄汤

B.茵陈蒿汤合膈下逐瘀汤

C.逍遥散合桃红四物汤

D.一贯煎合猪苓汤

E.中满分消丸

答案：C

解析：肝癌气滞血瘀证治以行气活血、化瘀消积，方用逍遥散合桃红四物汤。A多治疗热入血分证。B治疗湿热阻滞证。D治疗肝肾阴虚证。E治疗热胀证。故本题选C。

405.(A1型题)61 下列各项，不属慢性肾小球肾炎中医辨证证型的是

A.水湿

B.血瘀

C.湿热

D.湿浊

E.痰浊

答案：E

解析：本病属于中医的“石水”范围，主要为本虚标实，虚实夹杂，本虚主要涉及脾、肾两脏，标实主要在于湿热为患，而根本在于脾肾之虚，其病机特点是水湿、血瘀、湿热、湿浊，而不包括痰浊。故本题选E。

406.(A1型题)65 下列哪项不是泌尿系统感染的病因病机

A.膀胱湿热

B.脾肾亏虚

C.肝郁气滞

D.感受外邪

E.下阴不洁

答案：D

解析：泌尿系统感染属于中医学中的“淋证”。主要是湿热蕴结下焦或下阴不洁，导致膀胱气化不利，初起多实，日久则由实转虚，或虚实夹杂，病在膀胱和肾，涉及肝脾，实证为膀胱

胱湿热、肝郁气滞，虚证为脾肾亏虚。故本题选 D。

407.(A1 型题)69 治疗急性肾盂肾炎下焦湿热型，应首选

- A. 知柏地黄汤
- B. 猪苓汤
- C. 程氏萆薢分清饮
- D. 八正散
- E. 真武汤

答案：D

解析：急性肾盂肾炎下焦湿热型应治以清热利湿通淋，方用八正散。A 用于肝肾阴虚火旺证。B 用于水热互结证。C 用于膏淋实证。E 用于阳虚水泛证。故本题选 D。

408.(A1 型题)73 治疗慢性肾衰竭阴阳两虚证，应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 参芪地黄汤
- C. 杞菊地黄丸
- D. 全鹿丸
- E. 六君子汤

答案：D

解析：治疗慢性肾衰竭阴阳两虚证，宜阴阳双补，方用全鹿丸或金匱肾气丸。A 多用于肾虚水肿。B 多用于气阴两虚证。C 用于肝肾阴亏证。E 用于脾胃虚弱证。故本题选 D。

409.(A1 型题)76 下列哪项不是再生障碍性贫血的中医证型

- A. 热入营血
- B. 气血两虚
- C. 阳虚水停
- D. 脾肾阳虚
- E. 肝肾阴虚

答案：C

解析：再生障碍性贫血即是中医学中的“髓劳”，一般分为热入营血、脾虚血亏证、脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、肾阴阳两虚证、血虚挟瘀证。故本题选 C。

410.(A1 型题)81 下列除哪项外，均是急性白血病热毒炽盛证的主症

- A. 壮热口渴
- B. 烦躁不安
- C. 口舌生疮
- D. 咽喉肿痛
- E. 肢体困倦

答案：E

解析：急性白血病热毒炽盛证主要表现为发热恶寒，咽喉肿痛，口舌生疮，咳嗽痰黄，或痰中带血，烦渴欲饮，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄腻，脉数或弦数。故本题选 E。

411.(A1 型题)83 治疗特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证，应首选的方剂是

- A. 茜根散加減

- B.归脾汤加减
- C.桃红四物汤加减
- D.犀角地黄汤加减
- E.黄土汤加减

答案：A

解析：治疗特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证，治宜滋阴降火、清热止血，方用茜根散加减。B 治疗气不摄血证。C 治疗瘀血内阻证。D 治疗血热妄行证。E 治疗阳虚便秘。故本题选 A。

412.(A1 型题)87 硫脲类药物治疗甲亢的主要机制是

- A.抑制甲状腺激素的外周作用
- B.促进甲状腺素灭活
- C.抑制甲状腺素合成
- D.抑制甲状腺素释放
- E.破坏甲状腺滤泡上皮细胞

答案：C

解析：硫脲类药物能抑制在过氧化物酶作用下的酪氨酸的碘化及偶联，从而抑制甲状腺素的生物合成。故本题选 C。

413.(A1 型题)91 平胃散合桃红四物汤适用于治疗糖尿病的证型是

- A.痰瘀互结
- B.气阴两虚
- C.阴虚燥热
- D.阴阳两虚
- E.脉络瘀阻

答案：A

解析：平胃散能燥湿行气，桃红四物汤能活血化瘀，两者合用可以治疗痰瘀互结症型。B 多选用生脉散。C 多选用消渴方。D 多选用金匱肾气丸。E 多选用桃红四物汤加减。故本题选 A。

414.(A1 型题)94 对诊断痹证最有意义的实验室检查是

- A.血沉
- B.类风湿因子
- C.补体 C₃
- D.抗核抗体
- E.肾功能

答案：B

解析：中医学中的“痹”证相当于西医学中的结缔组织疾病、自身免疫性疾病、骨与关节疾病、软组织疾病。A 多用于鉴别急性或慢性感染、恶性肿瘤以及具有组织变性或坏死性疾病。B 多用于诊断类风湿性关节炎、自身免疫性疾病及一些骨与关节疾病。C 降低主要见于免疫复合物引起的肾炎、系统性红斑狼疮、反复性感染、皮疹、肝炎、肝硬化、关节疼痛等；增高见于各种传染病及组织损伤和急性炎症、肝癌等。D 的检测在自身免疫病的临床诊断、鉴别诊断、评价疗效和预后估计中具有较大的意义，其阳性率不高，故对痹证的诊断易漏诊。故本题选 B。

415.(A1 型题)97 独活寄生汤适用于风湿热的哪种证型

- A.风湿热痹
- B.痰瘀阻络
- C.湿热蕴蒸
- D.气血亏虚
- E.阴虚有热

答案：D

解析：独活寄生汤主要功效为祛风湿、止痹痛、益肝肾、补气血，常用于痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。故本题选 D。

416.(A1 型题)98 下列哪项不是类风湿性关节炎的症状

- A.关节肿痛
- B.对称性多关节炎
- C.游走性关节炎
- D.关节晨僵
- E.关节肿胀畸形

答案：C

解析：类风湿性关节炎主要表现为多发性对称性指掌等小关节炎或脊柱炎，伴有晨僵，后期常有关节畸形，指间关节呈现梭形肿胀；临床并发心脏损害者较少。C 是风湿性关节炎的表现。故本题选 C。

417.(A1 型题)102 治疗缺血性中风肝肾阴虚、肝风内动型，应首选

- A.镇肝熄风汤
- B.天麻钩藤饮
- C.星蒺承气汤
- D.二陈汤合桃红四物汤
- E.补阳还五汤

答案：A

解析：缺血性中风肝肾阴虚、肝风内动证宜治以育阴潜阳，镇肝熄风，方用镇肝熄风汤。B 多用于肝阳上亢证。C 多用于痰热腑实证。D 用于痰瘀互结证。E 用于气虚血瘀证。故本题选 A。

418.(A2 型题)104 患者，女，58 岁。咳声重浊，反复发作，咯痰黏稠，色白量多，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉濡滑。其证型是

- A.痰湿蕴肺
- B.寒痰阻肺
- C.燥痰伤肺
- D.痰热郁肺
- E.肝火犯肺

答案：A

解析：患者以痰多色白质黏、胸闷、苔白腻、脉濡滑等为主要表现，因此辨证为痰湿蕴肺证。B 型应表现为呼吸急促，喉间有哮鸣音，痰白而黏或稀薄多沫，胸膈满闷如室，面色晦暗带青，苔白滑，脉浮紧等。C 以干咳少痰，痰黏难咯，口干咽燥，舌红少苔乏津，脉细数等为

主要表现。D 以咳嗽吐黄痰，口干，恶心呕吐，腹胀纳呆或腹部胀痛，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数等为主要表现。E 主要与情志有密切关系。故本题选 A。

419.(A2 型题)107 患者，男，23 岁。有花粉过敏史。突然出现咳嗽，打喷嚏，呼吸困难，不能平卧，喉中痰鸣，发热，汗出，舌红苔黄，脉弦滑。对诊断最有意义的检查是

- A.肺功能
- B.心电图
- C.血气分析
- D.血常规
- E.痰涂片镜检、培养

答案：A

解析：根据患者花粉过敏病史，及突然咳嗽、打喷嚏、喉中痰鸣等临床症状，高度怀疑此为支气管哮喘急性发作。A 对于急性发作的哮喘病人常明显受限，但属于诊断哮喘的依据。B 无明显意义。C 用于判断哮喘的严重程度。D 为一般检查，对哮喘的诊断意义不大。E 对于哮喘的诊断意义不及肺功能。故本题选 A。

420.(A2 型题)111 患者，女，21 岁。突感胸闷，呼吸困难，大汗。查体：口唇微绀，呼吸急促，听诊双肺布满干啰音，心率 96 次/分。既往有类似发作，有时休息后可缓解。为缓解症状，应首选的措施是

- A.喷吸激素(二丙酸氯地米松)
- B.口服强的松
- C.吸氧
- D.静脉注射安定
- E.吸入沙丁胺醇或舒喘灵气雾剂

答案：A

解析：此患者发病急，以呼吸困难为主要表现，且有该疾病史。考虑是支气管哮喘急性发作。糖皮质激素是目前控制哮喘发作最有效的药物，首选吸入，吸入无效时口服。当糖皮质激素效果不佳时可加 β_2 受体激动剂。故本题选 A。

421.(A2 型题)114 患者，女，22 岁。恶寒，高热，咳嗽，胸痛 1 天入院。检查：体温 38.6°C ，脉搏 100 次/分，X 线胸片示右下肺片状阴影，血白细胞 $21 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞 87%。应首先考虑的是

- A.休克型肺炎
- B.病毒性肺炎
- C.支原体肺炎
- D.肺炎球菌肺炎
- E.肺脓肿

答案：D

解析：患者年纪轻，以高热、咳嗽、胸痛为主要表现，血常规提示有细菌感染。考虑为肺炎球菌肺炎。A 参见 117 题。B 血常规多表现为中性粒细胞减少、淋巴细胞升高。C 多高热不明显，起病缓慢。E 多咳吐大量脓臭痰。故本题选 D。

422.(A2 型题)117 患者，男，51 岁。有大量吸烟史 23 年，咳嗽痰中带血 2 月。近 1 月四肢关节疼痛及杵状指。X 线显示右肺上叶肺不张。应首先考虑的诊断是

- A.支气管扩张
- B.肺结核
- C.肺癌
- D.甲状腺功能亢进症
- E.慢性支气管炎阻塞性肺气肿

答案：C

解析：患者有多年吸烟史，病出现咳嗽且痰中带血，这是中央型肺癌常见的症状；并见四肢关节疼痛及杵状指，可为肺癌转移至骨骼；X线显示右肺上叶肺不张，这是由于癌对支气管阻塞引起的间接征象。而A、B的X线均有别于肺癌；D、E不会出现四肢关节疼痛症状。故本题选C。

423.(A2型题)120 患者，女，32岁。劳累后气促，咳嗽，水肿半年，年幼时曾有1次长期发热伴关节痛史。检查：心率120次/分，节律不齐，心尖区有舒张期杂音，双肺底湿啰音，肝肿大。心电图示房颤。应首先考虑的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.三尖瓣狭窄

答案：B

解析：患者有风湿热病史，心脏听诊心尖部有舒张期杂音提示二尖瓣狭窄，心率快，双肺底湿啰音及肝肿大均为心衰的表现。A一般心脏听诊闻及心尖部收缩期杂音。C心脏听诊在胸骨右缘第二肋间可闻及舒张期杂音。D心脏听诊在胸骨右缘第二肋间可闻及收缩期杂音。E可在剑突处闻及舒张期杂音。故本题选B。

424.(A2型题)122 患者，女，60岁。高血压病史18年，劳累后喘息。近日外感后，喘息加重，咳嗽，咳吐泡沫痰，夜间不能平卧，心悸气短，面色白，形寒肢冷，尿少，下肢轻度浮肿，便溏，舌淡有齿痕，脉沉细。应首先考虑的诊断是

- A.心绞痛心肺气虚证
- B.高血压病气虚血瘀证
- C.支气管哮喘气阴亏虚证
- D.慢性支气管炎心肾阳虚证
- E.心力衰竭心肾阳虚证

答案：E

解析：咳吐泡沫痰、夜间不能平卧为心衰的表现。心气虚不能养心故见心悸气短。肾虚阳不能化气，水湿下聚，故见下肢轻度浮肿。肾与膀胱相表里，肾阳不足，膀胱气化不行，故尿量少。辨证为心肾阳虚证。故本题选E。

425.(A2型题)123 患者，女，70岁。既往有冠心病，高血压病和慢性心功能不全病史。近日外感后，心悸气短，不能平卧，咳吐泡沫痰，乏力，身寒肢冷，尿少，浮肿，面暗，舌红少苔，脉结代。治疗应首先考虑的方剂是

- A.养心汤合补肺汤
- B.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合金匮肾气丸
- C.真武汤

D.葶苈大枣泻肺汤

E.生脉散

答案：C

解析：咳吐泡沫痰、夜间不能平卧为心衰的表现。心气虚不能养心故见心悸气短。肾与膀胱相表里，肾虚可见尿少、浮肿。辨证为心肾阳虚证，方用真武汤。故本题选C。

426.(A2型题)124 患者，女，35岁。风湿性二尖瓣闭锁不全10年，现下肢水肿，喘促气短，腰膝酸软，形寒肢冷，心悸胸闷，小便短少，舌淡苔腻，脉沉细。治疗应首选

A.真武汤

B.葶苈大枣泻肺汤

C.保元煎

D.参附汤

E.通脉四逆汤

答案：A

解析：患者久病伤阳，肾阳虚衰，不能蒸腾气化，水湿内停于下，泛滥肌肤，而见下肢水肿、小便短少。肾虚不纳气而见喘促气短。阳虚温煦失职见腰膝酸软、形寒肢冷。水气凌心，抑遏心阳，则见心悸，水湿内停见胸闷。舌脉均为肾阳虚兼湿停之证，辨证为阳虚水泛，方用真武汤。B用于水饮停肺证。C用于气虚证。D用于阳气虚脱证。E用于阴盛格阳证。故本题选A。

427.(A2型题)125 患者，男，65岁。患高血压心脏病8年，喘促气短，不能平卧，夜间喘甚，心悸不寐，咳痰清稀量多，形寒肢冷，腰膝酸软，小便不利，舌淡紫苔白腻，脉沉细而滑。治疗应首选

A.保元汤合桃红四物汤

B.参附汤合葶苈大枣泻肺汤

C.真武汤合五苓散

D.保元汤合温胆汤

E.四逆汤合参附龙牡汤

答案：C

解析：喘促气短、不能平卧为心衰的表现。脾阳虚不能温运四肢，故见身寒肢冷。肾阳不足，膀胱气化不行，故尿量少。肾虚腰膝无以温养而腰酸膝软。阳虚水饮无以温化，上泛于肺而见痰清稀量多。舌脉均为脾肾阳虚水泛之佐证。辨证为阳虚水泛证，方用真武汤合五苓散。故本题选C。

428.(A2型题)128 患者，女，46岁。患高血压病2年。症见：头目眩晕，视物旋转，如坐舟楫，头胀痛，时有手足抽搐，舌红苔薄黄少津，脉弦数。其证型是

A.肝火亢盛

B.阴虚阳亢

C.肝风上扰

D.痰浊中阻

E.阴阳两虚

答案：C

解析：患者以眩晕为主证，伴有头痛、手足抽搐，舌红苔薄黄少津，脉弦数。肝风上扰头窍而见眩晕、头痛，肝风内动而见手足抽搐，舌脉均为佐证，故辨证为肝风上扰。故本题选C。

429.(A2型题)132 患者，男，65岁。胸闷刺痛，痛有定处，恶心呕吐，口中黏腻，头晕目眩，心悸气短，面部暗青，舌质紫暗，舌体胖大，苔白腻，脉弦滑。其治法是

- A.豁痰化瘀，行气止痛
- B.通阳泄浊，豁痰散结
- C.益气养阴，活血化痰
- D.健脾化湿，祛痰通络
- E.温阳补肾，活血祛痛

答案：D

解析：患者年逾六旬，痰瘀互结，胸阳不运而见胸闷刺痛，痛有定处。胸阳不展心气被遏故见心悸气短。寒湿上泛于口，见口中黏腻。湿聚困脾，致脾失健运，痰湿阻滞中焦而见恶心呕吐，痰湿上泛于清窍而头晕目眩。面部暗青舌质紫暗为血瘀之证，舌苔脉象均为痰瘀阻络之证。故辨证为脾虚湿阻、痰瘀互结证，治以健脾化湿、祛痰通络。故本题选D。

430.(A2型题)135 患者，女，70岁。胸闷胸痛反复发作半年余，多与劳累有关。现胸闷气短，自汗，神倦畏寒，面色白，四肢不温，舌质淡胖，苔白，脉沉细。心电图V₃、V₄、V₅、V₆导联ST段下移，T波倒置。治疗应首选

- A.参附汤合桂枝甘草汤
- B.知柏地黄丸
- C.柴胡疏肝散
- D.血府逐瘀汤
- E.瓜蒌薤白半夏汤

答案：A

解析：患者以胸痛为主要症状，中医诊断为胸痹。患者年逾七旬，阳气亏虚，胸阳不展，致胸闷胸痛。阳虚固摄无力见自汗，阳虚不能温煦及推动营血至四肢，见神疲胃寒、面色白、四肢不温。舌脉亦为阳虚之证。辨证为阳气亏虚证，方用参附汤合桂枝甘草汤。B多用于阴虚火旺证。C多用于肝气郁滞证。D多用于气滞血瘀证。E多用于痰浊闭阻证。故本题选A。

431.(A2型题)138 患者，男，60岁。3年前患急性广泛性前壁心肌梗死，现又见持续剧烈胸痛，甚则心痛彻背，背痛彻心，形寒肢冷，神疲气怯，伴心悸气促，手足青紫厥冷，舌紫暗苔滑润，脉沉细。其治法是

- A.益气养阴，化痰通络
- B.益气温阳，开痹散寒
- C.温阳泻肺，活血利水
- D.益气温阳，清热祛痰
- E.滋阴逐饮，化痰通络

答案：B

解析：患者有急性心肌梗死病史，且以剧烈胸痛为主证，中医诊断为真心痛。阳虚之体，胸阳不振，阴寒之邪乘虚侵袭，胸阳被遏，导致心脉闭阻而见胸痛剧烈。阳气不能转行于背，故见心痛彻背、背痛彻心。阳虚故见形寒肢冷、神疲气怯。胸阳被遏而见心悸气促。寒主收引见手足青紫厥冷，舌脉亦为阳虚寒凝之证。辨证为心阳气虚、阴寒凝滞。治以益气温阳、散寒开痹。故本题选B。

432.(A2型题)141 患者，男，65岁，胃脘刺痛，痛定不移，心下痞块，舌质紫暗，脉细，治

疗应首选

- A.生化汤
- B.失笑散
- C.柴胡疏肝散
- D.丹参饮
- E.膈下逐瘀汤

答案：B

解析：根据患者的表现，可诊断为胃脘痛。瘀血内停，气血运行受阻，不通则痛，故见刺痛且有定处。血液淤积不散而凝结成块，而见心下痞块，舌脉均为血瘀之证。辨证为瘀血停滞证，方用失笑散加减。A用于治疗产后瘀血腹痛。C用于肝郁气滞证。D用于血瘀气滞证。E用于治疗肝硬化之瘀血内结证。故本题选B。

433.(A2型题)143 患者，女，46岁。间歇性上腹隐痛3年。胃镜示胃窦部黏膜充血、水肿，呈红白相间，分泌物增多。应首先考虑的是

- A.慢性浅表性胃炎
- B.胃窦部溃疡
- C.胃小弯溃疡
- D.慢性萎缩性胃炎
- E.胃癌

答案：A

解析：患者以上腹部隐痛为主要表现，且胃镜未提示有溃疡、不规则隆起等表现，可初步推断为慢性浅表性胃炎。D项胃镜应示血管显露，胃黏膜颜色变淡（呈淡红、灰黄，重者呈灰白或灰蓝色）黏膜皱襞细小甚至消失，且胃内分泌物少。故本题选A。

434.(A2型题)146 患者，男，65岁。晚期胃癌，形体消瘦，面色白，自汗气短，神疲乏力，头晕心悸，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.海藻玉壶汤
- C.膈下逐瘀汤
- D.八珍汤
- E.附子理中汤

答案：D

解析：患者气虚无以固摄敛汗，而见自汗气短；血虚无以濡养四肢、脏腑，见形体消瘦、面色白、神疲乏力、头晕心悸。舌脉均为气血两虚证的表现，辨证为气血两虚，治以补益气血，方用八珍汤。A治疗肝气郁滞证。B治疗瘰疬初期。C治疗膈下血瘀证。E治疗下焦虚寒证。故本题选D。

435.(A2型题)148 患者，男，36岁。患积聚已3个月，积块软而不坚，固着不移，胀与痛并存，舌苔薄白，脉弦。其证型是

- A.肝气郁结
- B.食滞痰阻
- C.气滞血阻
- D.瘀血内结
- E.正虚瘀结

答案：C

解析：气机阻滞，聚而不散，病久由气滞而致血行不畅，脉络瘀阻，而见积块软而不坚、固着不移。气行不畅而见胀满，胀满不通则见疼痛。舌脉亦为气滞证的表现，辨证为气滞血阻证。故本题选 C。

436.(A2 型题)151 患者，男，68 岁。肝硬化 10 年，腹膨大如鼓，按之坚满，脘闷纳呆，恶心呕吐，便溏，小便不利，舌淡红，苔白腻，脉弦缓。其证型是

- A.气滞湿阻
- B.水湿内停
- C.肝肾阴虚
- D.脾肾阳虚
- E.肝脾血瘀

答案：B

解析：参见 150 题。故本题选 B。

437.(A2 型题)154 患者，男，50 岁。反复浮肿，尿血 3 年。症见：面色无华，少气乏力，易感冒，午后低热，口干咽燥，舌偏红少苔，脉细。检查：血压 140/95mmHg，尿蛋白(++)，定量 3g/d，尿红细胞 20 个/高倍视野，内生肌酐清除率 48%。其诊断是

- A.慢性肾炎普通型气阴两虚证
- B.慢性肾炎高血压型气阴两虚证
- C.慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证
- D.慢性肾炎普通型肝肾阴虚证
- E.慢性肾盂肾炎肾阴亏虚证

答案：A

解析：患者反复浮肿、尿血 3 年，且蛋白尿阳性、血压轻度偏高、血尿，故考虑为慢性肾炎普通型。而高血压型血压多为中度偏高。气虚无以推动营血，故见面色无华。气虚卫外不固，故见易感冒，少气乏力亦为气虚之证。午后低热、口干咽燥、舌脉均为阴虚之证。故辨证为气阴两虚证。故本题选 A。

438.(A2 型题)156 患者，女，24 岁。面部、肢体水肿 3 个月，心悸失眠，五心烦热，小溲短赤，恶热汗出，舌红苔薄黄腻，脉弦滑数。实验室检查：尿蛋白(+++)。其证型是

- A.阴虚湿热
- B.脾肾阳虚
- C.气阴两虚
- D.肺肾阴虚
- E.肝肾阴虚

答案：A

解析：湿热内生，脾失健运，水湿不化，而见面部肢体水肿。阴虚热生，上扰心神，而见心悸失眠。五心烦热、小溲短赤、恶热汗出均为阴虚生热的表现。舌脉亦为湿热之证，故辨证为阴虚湿热证。故本题选 A。

439.(A2 型题)158 患者，女，26 岁。产后第 3 天出现寒战，高热，腰痛，下腹痛，排尿痛。检查：肾区叩击痛，耻骨上压痛，尿白细胞 30 个/高倍视野，尿蛋白(+)，血白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 86%。下列哪项检查对确诊最有帮助

- A.尿细胞计数
- B.尿细菌培养
- C.静脉肾盂造影
- D.膀胱镜检查
- E.肾脏 B 超

答案：B

解析：妊娠后易发生尿路感染，根据患者的临床表现及尿细胞、尿蛋白阳性及血常规等均提示有感染，故考虑尿路感染。凡有感染症状、腰部不适、尿液改变，若再有真性细菌尿者，就可诊断尿路感染。真性细菌尿的诊断主要依靠尿细菌学检查。故本题选 B。

440.(A2 型题)160 患者，女，18 岁。疲乏，月经量多半年，面色苍白，皮肤可见散在出血点。检查：肝、脾肋缘下未触及，血红蛋白 86g/L，白细胞 $28 \times 10^9/L$ ，血小板 $45 \times 10^9/L$ ，骨髓增生低下，未见巨核细胞。其诊断是

- A.缺铁性贫血
- B.急性白血病
- C.脾功能亢进
- D.再生障碍性贫血
- E.溶血性贫血

答案：D

解析：患者主要表现为贫血（疲乏、月经过多、面色苍白），出血（皮肤可见散在出血点）。查体脾无肿大，血红蛋白、白细胞及血小板减少，骨髓增生低下。可推断为再生障碍性贫血。A 血常规常提示总铁结合力、血清铁等降低。B 骨髓象表现为活跃增生。C 表现为脾脏肿大，骨髓造血细胞增生。E 多表现红细胞明显减少。故本题选 D。

441.(A2 型题)162 患者，男，72 岁。慢性淋巴细胞白血病 1 年余，经化疗后病情有缓解。现症见气短懒言、乏力、低热、手足心热，腰膝酸软，皮肤瘀点、瘀斑，舌淡，脉沉细。治疗应首选

- A.桃红四物汤
- B.四君子汤合沙参麦冬汤
- C.加味瓜蒌散
- D.归脾汤
- E.银翘散

答案：B

解析：气虚而见气短懒言、乏力。肾阴虚而见低热、手足心热、腰膝酸软。阴虚虚热内生，血行较缓，而成瘀滞，溢于皮下而见皮肤瘀点瘀斑。舌脉均为气虚之象，故辨证为气阴两虚证，方用四君子汤合沙参麦冬汤。A 治疗血瘀兼血虚证。C 治疗气血不足、肝气郁结、经脉瘀阻证。D 治疗心脾两虚证。E 治疗风热犯表证。故本题选 B。

442.(A2 型题)164 患者，男，15 岁。反复鼻出血，广泛皮肤紫癜 1 周。检查：肝、脾无肿大，血红蛋白 115g/L，白细胞 $90 \times 10^9/L$ ，血小板 $10 \times 10^9/L$ ，骨髓幼稚型巨核细胞比例增高。其诊断是

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.急性白血病
- C.慢性白血病

D.再生障碍性贫血

E.缺铁性贫血

答案：A

解析：患者以出血为主要表现，伴有血小板严重下降及骨髓幼稚型巨核细胞比例增高，可推断为特发性血小板减少性紫癜。B多以贫血、发热、出血、肝脾肿大等为主要表现，骨髓象提示有核细胞增生明显或轻度活跃。C以乏力、低热、多汗、消瘦为主要表现，骨髓象示各系细胞极度增生，其中以粒系为主。D以贫血、发热、出血为主要表现，网织红细胞计数极低。E主要表现为贫血，铁代谢检查、储备铁检查等有明显下降。故本题选A。

443.(A2型题)166 患者，女，27岁。皮肤自发性紫癜反复发作3年。面色白，神疲乏力，头晕心悸，舌淡红苔薄白，脉细弱。治疗应首选

A.归脾汤

B.四物汤

C.茜根散

D.泻心汤

E.犀角地黄汤

答案：A

解析：根据患者的症状，可辨证为气血两虚证，治以补气益血，方用归脾汤。B治疗血虚证。C治疗鼻衄不止，心神烦闷证。D治疗邪火内盛证。E治疗热入血分证。故本题选A。

444.(A2型题)168 患者，女，20岁。患甲状腺功能亢进症4年，颈前肿大，质软，目突手颤，口干目涩，心悸心慌，消谷善饥，月经不调，腰膝酸软，耳鸣目眩，舌红少苔，脉沉细数，其证型是

A.心肝阴虚

B.肝火痰瘀

C.心肾阴虚

D.心脾两虚

E.肺肾阴虚

答案：A

解析：心肝阴虚，虚热灼津成痰，阻于颈前而见颈前肿大，质软。肝阴虚，目失所养，而见目涩目突，筋脉失于濡养而见手颤。心阴虚，心神失养，而见心悸心慌。月经不调、腰膝酸软、耳鸣目眩、舌脉均为阴虚之象。辨证为心肝阴虚证。故本题选A。

445.(A2型题)170 王某，颈前肿胀5个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

A.龙胆泻肝汤

B.逍遥散

C.天王补心丹

D.柴胡疏肝散

E.镇肝熄风汤

答案：A

解析：A用于肝火旺盛型甲亢。B用于气滞痰凝型甲亢。C用于阴虚火旺型甲亢。D、E均不是甲亢的适用方。根据患者烦躁易怒、手指颤抖、头晕目眩，故可诊断为肝火旺盛型甲亢。故本题选A。

446.(A2型题)173 患者，男，40岁。既往有糖尿病史。小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。其证型是

- A.痰瘀互结
- B.气阴两虚
- C.阴虚燥热
- D.阴阳两虚
- E.脉络瘀阻

答案：D

解析：患者肾阳亏虚，温煦不足而见四肢欠温、畏寒怕冷，阳痿。肾虚下元固摄无力而见小便频数，气化不足而见小便混浊如膏。肾开窍于耳，肾精不足见耳轮干枯。舌脉亦为阳虚证之象。辨证为阴阳两虚证。故本题选D。

447.(A2型题)174 患者，男，17岁。感冒后15天出现原因不明的低热，多汗，食欲不振，乏力和关节肿痛，舌红苔黄腻，脉滑数。应首先考虑的是

- A.风湿热痹
- B.风寒湿痹
- C.痹
- D.肺癆
- E.肺痈

答案：A

解析：患者有新近有感染史，表现有关节炎等。可诊断为痹证。患者舌脉为热证之表现，故考虑风湿热痹。故本题选A。

448.(A2型题)177 患者，男，60岁。劳动中突发左侧头痛，伴呕吐，面赤，舌强语謇，舌红苔黄，脉弦数。查体：血压195/105mmHg，右侧上、下肢瘫痪，右下肢病理反射阳性。应首先考虑的是

- A.痫证
- B.中风
- C.痿证
- D.厥证
- E.痹证

答案：B

解析：中风是以突然昏厥，不省人事，伴有口眼歪斜，语言不利，半身不遂或仅有半身不遂为主要表现的疾病。其特点是发病急骤，变化迅速。根据患者临床症状，不难诊断为中风。A、D多醒后不留有后遗症。C只是肢体萎废无力。E只表现为活动不利，无神志等神经系统改变。故本题选B。

449.(A2型题)180 患者，男，32岁。突然出现剧烈头痛来急诊。查体：神清，颈强直，四肢肌力5级，肌张力正常，布鲁辛斯基征(+)，最可能的诊断是

- A.腰椎间盘突出症
- B.高血压脑病
- C.脑出血
- D.蛛网膜下腔出血

E.脑栓塞

答案：D

解析：患者年纪轻，以头痛为主要表现，无神志改变，肌力及肌张力正常，脑膜刺激征阳性，诊断为蛛网膜下腔出血。A 多以腰痛并伴有下肢放射痛为主要表现。B 应有血压高的表现。C 多有肢体的偏瘫，神志的改变。E 头痛不明显，多以偏瘫等肢体语言障碍为主要表现。故本题选 D。

450.(A2 型题)183 患者，男，30 岁。被路人发现昏迷不醒送入医院。查体：血压 110/80mmHg，心率 60 次/分，流涎，瞳孔针尖大小，口唇发绀，肌肉震颤，皮肤湿冷，双肺可闻较多湿啰音。应首先考虑的诊断是

A.巴比妥类中毒

B.癫痫发作

C.氰化物中毒

D.硝酸盐中毒

E.有机磷杀虫药中毒

答案：E

解析：流涎、皮肤湿冷、瞳孔缩小是有机磷农药中毒的毒蕈碱样症状，肌肉震颤为烟碱样症状。A 表现意识障碍，呼吸抑制，昏迷，血压下降。B 表现为精神活动中断，意识丧失、抽搐。C 表现为抽搐、有苦杏仁味、瞳孔扩大。D 多表现为发绀。故本题选 E。

451.(B 型题)187 普萘洛尔（心得安）禁用于治疗

A.心源性哮喘

B.支气管哮喘

C.慢性支气管炎

D.原发性支气管癌

E.肺脓肿

答案：B

解析：吗啡禁用于慢性阻塞性肺疾患、支气管哮喘、肺源性心脏病；急性左心衰竭晚期并出现呼吸衰竭时忌用。心得安禁用于支气管哮喘、心源性休克、心传导阻滞(II 至 III 度房室传导阻滞)、重度心力衰竭、窦性心动过缓。故 186 题选 B，187 题选 B。

452.(B 型题)191 治疗充血性心力衰竭时，不宜使用

A.氢氯噻嗪（双氢克尿噻）

B.呋塞米（速尿）

C.巯甲丙脯酸（开搏通）

D.甘露醇

E.氨苯喋啶

答案：D

解析：急性肺水肿发作时，应进行快速利尿，因此选用速尿。充血性心力衰竭时禁用甘露醇，会加重肺淤血或肺水肿。A 用于水肿和高血压病人。C 用于高血压及心力衰竭病人。E 用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水。故 190 题选 B，191 题选 D。

453.(B 型题)194 劳力型心绞痛的诊断标准是

A.增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛

- B.无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛
- C.心绞痛发作时，心电图示此导联 ST 段抬高
- D.心尖部针刺样疼痛，发作时无心电图异常
- E.心前区压迫样疼痛 15 分钟以上，心电图有病理性 Q 波

答案：A

解析：心绞痛分为稳定型心绞痛和不稳定型心绞痛。不稳定型又分为初发劳力型心绞痛、恶化劳力型心绞痛、静息心绞痛、梗死后心绞痛、变异型心绞痛。劳力型心绞痛指由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发的心绞痛。变异型心绞痛是指发作时心电图表现不同，显示有关导联的 ST 段抬高，而之相对应的导联 ST 段压低（其他类型心绞痛则除 aVR 及 V₁ 外各导联 ST 段普遍压低）。故 194 题选 A，195 题选 C。

454.(B 型题)197 心绞痛发则胸闷痛如窒，气短痰多，肢体沉重，纳呆泛恶，舌苔浊腻，脉滑。证属

- A.阴寒凝滞
- B.心血瘀阻
- C.气虚血瘀
- D.痰浊内阻
- E.气阴两虚

答案：D

解析：心绞痛遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡为气虚证；舌暗，脉结代属于血瘀证，辨为气虚血瘀证，治以补气活血。痰浊盘踞，胸阳失展，故胸闷痛如窒；脾主四肢，痰浊困脾，脾气不运，故肢体沉重；舌苔浊腻，脉滑为痰浊内阻之象。治宜通阳泄浊，豁痰开窍，方用瓜蒌薤白白酒汤。故 196 题选 C，197 题选 D

455.(B 型题)200 治疗风心病水气凌心射肺证，应首选

- A.保元汤
- B.天王补心丹
- C.真武汤
- D.苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- E.五味子汤合桃仁红花煎

答案：D

解析：风心病水气凌心射肺证，应治以温阳化气，泻肺利水，方用苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。心肾阳虚证，治以温补心肾，方用真武汤。A 多用于气虚证。B 多用于心肾阴虚证。E 多用于肺气不足证。故 200 题选 C，201 题选 D。

456.(B 型题)202 治疗胃溃疡脾胃虚寒证，应首选

- A.理中丸合黄芪建中汤
- B.柴胡疏肝散合左金丸
- C.失笑散合丹参饮
- D.一贯煎合左金丸
- E.化肝煎

答案：A

解析：胃溃疡脾胃虚寒证治以温中补虚，健脾和胃，方用理中丸合黄芪建中汤加减。而胃络瘀阻证治以活血通络、和胃止痛，方用失笑散合丹参饮加减。B 多用于治疗肝胃不和证。D

多用于治疗肝肾阴虚证。E 多用于治疗肝胃郁热证。故 202 题选 A，203 题选 C。

457.(B 型题)206 与雌激素增加有关的肝硬化，可见

- A.贫血
- B.出血倾向
- C.腹水
- D.肝昏迷
- E.蜘蛛痣

答案：E

解析：肝硬化时，肝脏对雌激素的灭活能力下降，故男性可见性功能减退，男性乳房发育，女性可发生闭经、不孕，皮肤可见蜘蛛痣、肝掌等。肝硬化时，肝脏对氨的代谢能力明显减退，血氨浓度升高，氨能干扰脑细胞的代谢，而易发展为肝性脑病，表现为肝昏迷。A 多是出血后引起的。B 多与肝脏合成凝血因子减少及脾功能亢进有关。C 多由于门静脉高压引起。故 206 题选 E，207 题选 D。

458.(B 型题)208 急性胰腺炎肝郁气滞证，治疗应首选的方剂是

- A.小柴胡汤
- B.清胰汤合龙胆泻肝汤
- C.大承气汤
- D.桃仁承气汤
- E.大柴胡汤

答案：A

解析：A 用于急性胰腺炎肝郁气滞证。B 用于急性胰腺炎肝胆湿热证。C 用于急性胰腺炎肠胃热结证。D、E 均不是急性胰腺炎的适用方。故 208 题选 A，209 题选 B。

459.(B 型题)210 慢性肾小球肾炎普通型的特点是

- A.中度蛋白尿
- B.贫血及高脂血症
- C.中度以上舒张压升高
- D.全身高度水肿，血脂增高
- E.肾衰竭

答案：A

解析：慢性肾小球肾炎分为五型。其中普通型较为常见，病程迁延，病情相对稳定，多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害，尿蛋白（+~+++），离心尿红细胞>10 个/高倍视野和管型尿等。而肾病型除具有普通型的表现外，主要表现为肾病综合征，24h 尿蛋白定量>3.5g，血清白蛋白低于 30g/L，水肿一般较重和伴有或不伴高脂血症。B 是肾病综合征的特点。C 是高血压型的特点。E 是急性发作型的特点。故 210 题选 A，211 题选 D。

460.(B 型题)213 对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

- A.24 小时尿蛋白定量
- B.尿培养及菌落计数
- C.肾功能检查
- D.摄腹部平片
- E.静脉肾盂造影

答案：B

解析：肾病综合征诊断要点为①大量蛋白尿 $>3+$ ，24h尿蛋白定量 $>3.5g$ ；②血浆白蛋白 $\leq 30g/L$ ；③血脂升高；④浮肿可轻可重。以上①②为必备条件，因此对尿蛋白的定量是最有意义的。而诊断泌尿系感染，取清洁中段尿行细菌培养、菌落计数及药物敏感度测定，革兰阴性杆菌菌落计数 ≥ 10 万/ml者有诊断意义。故212题选A，213题选B。

461.(B型题)216 再生障碍性贫血的中医病位是

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.骨髓
- D.心、肝、脾、肾
- E.肺、心、脾、肾

答案：C

解析：再障属于中医“虚劳”、“髓劳”、“髓枯”范畴。病变部位在骨髓，与肾脏的关系密切。其病机主要为热入营血、脾虚失摄、脾肾阳虚和肝肾阴虚。故216题选C，217题选D。

462.(B型题)218 治疗再生障碍性贫血，应首选

- A.马利兰
- B.康力龙
- C.泼尼松
- D.硫酸亚铁
- E.叶酸

答案：B

解析：治疗再生障碍性贫血常选用免疫抑制剂及造血治疗，前者主要药物有抗淋巴细胞球蛋白及环孢素等，后者包括雄激素（康力龙、安雄等）及造血生长因子、造血干细胞移植。而治疗慢性粒细胞白血病常用的方法有化学治疗（羟基脲、马利兰、靛玉红等）、干扰素 α 、甲磺酸伊马替尼、异基因造血干细胞移植等。C用于血小板减少性紫癜、粒细胞减少症、急性淋巴细胞白血病。D多用于缺铁性贫血。E用于巨幼细胞贫血。故218题选B，219题选A。

463.(B型题)220 慢性粒细胞性白血病阴血亏虚证的治法是

- A.补气养血
- B.滋阴补血
- C.补肾助阳
- D.滋阴降火
- E.活血化瘀

答案：B

解析：慢性粒细胞阴血亏虚证治以滋阴补血，瘀血内阻证治以活血化瘀。A用于气血两虚证。C用于肾阳亏虚证。D用于阴虚火旺证。故220题选B，221题选E。

464.(B型题)222 抗血小板抗体增加，见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血

E.慢性粒细胞白血病

答案：A

解析：抗血小板抗体增加常见于原发性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、败血症、高 γ 球蛋白血症、肝病、母婴血小板不合等。造血原料缺乏常见于缺铁性贫血。故 222 题选 A，223 题选 C。

465.(B 型题)224 外周血血小板明显减少，骨髓巨核细胞增多，见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.急性白血病

答案：A

解析：特发性血小板减少性紫癜血象表现为急性型发病时血小板计数可明显减少，常低于 $20 \times 10^9/L$ ；慢性血小板计数一般在 $50 \times 10^9/L$ 左右。骨髓象表现为急性型骨髓巨核细胞正常或增多，幼稚型巨核细胞比例增多，体积小，无血小板形成；慢性型骨髓巨核细胞增多，以颗粒型巨核细胞增多为主，体积正常，血小板形成减少。急性白血病血象表现为贫血一般呈正细胞正色素型，网织红细胞计数减少，也有轻度增高者。血小板计数大多降低，白细胞一般早期常偏低。骨髓象表现为有核细胞增生明显或轻度活跃，具有决定性诊断价值。故 224 题选 A，225 题选 E。

466.(B 型题)226 治疗糖尿病阴虚热盛证，应首选

- A.消渴方合玉女煎
- B.生脉散合六味地黄丸
- C.金匱肾气丸
- D.桃红四物汤
- E.生脉散合参附汤

答案：A

解析：糖尿病阴虚热盛证治以清热生津止渴，方用消渴方合玉女煎。气阴两虚证治以补气滋阴，方用生脉散合六味地黄丸。C 用于阴阳两虚证。D 用于气滞血瘀证。E 用于阴阳衰微证。故 226 题选 A，227 题选 B。

467.(B 型题)229 糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者，治疗应首选

- A.六味地黄丸
- B.杞菊地黄丸
- C.六味地黄丸合生脉散
- D.知柏地黄丸
- E.金匱肾气丸

答案：B

解析：糖尿病气阴两虚证治以益气养阴，方用六味地黄汤合生脉散。糖尿病合并白内障、雀盲、耳聋者，因其主要病机为肝肾精血不足，不能上承耳目所致，宜滋补肝肾、益精补血，方用杞菊地黄丸加减。故 228 题选 C，229 题选 B。

468.(B 型题)232 脑 CT 示基底节区低密度影，周围有水腫帶，视神经乳头水腫者，治疗应首

选

- A.甘露醇
- B.低分子右旋糖酐
- C.川芎嗪
- D.阿司匹林
- E.肝素

答案：A

解析：脑CT显示基底节区低密度影及周围有水肿带，视神经乳头水肿提示脑梗死，并有颅内压增高的表现。故治以降低颅内压，选用甘露醇。而脑血栓形成急性期的血液稀释法，选用低分子右旋糖酐，可以扩充血容量，降低血液黏滞性，改善微循环。C有抗血小板聚集作用，可用于脑血栓形成，但不属于血液稀释疗法。D对血小板聚集有抑制作用，阻止血栓形成，临床常用于预防暂时性脑缺血发作。E有较强抗凝血作用，对无出血倾向者，可采用此法。故232题选A，233题选B。

469.(A1型题)4 下列损伤按致伤因素分类，错误的是

- A.机械性
- B.物理性
- C.化学性
- D.车祸性
- E.生物性

答案：D

解析：损伤按致伤因素分类可分为机械性、物理性、化学性、生物性四类。故本题选D。

470.(A1型题)9 下列各项，适用“托法”的是

- A.外疡中期，正虚毒盛
- B.初期肿疡
- C.溃疡后期，疮口难敛
- D.肿疡疮形已成
- E.蜂窝织炎破溃

答案：A

解析：尚未成脓的初期肿疡宜用消法。外疡中期适用托法。溃疡后期元气虚弱，新肌不生，疮口不敛者适用补法。故本题选A。

471.(A1型题)14 手术敷料高压蒸气灭菌的要求是

- A.121℃，20分钟
- B.121℃~126℃，20分钟
- C.121℃~126℃，30分钟
- D.130℃，10分钟
- E.130℃，20分钟

答案：C

解析：高压蒸气灭菌的要求是温度提高到121℃~126℃，持续30分钟。故本题选C。

472.(A1型题)19 外生殖器部位的皮肤消毒，应采取

- A.2.5%碘酊擦涂

- B.0.75%碘酊擦涂
- C.0.1%洗必泰酊擦涂 2 次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂 1 次
- E.70%酒精擦涂

答案：C

解析：对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等不能用碘酊消毒处，应选用刺激性小的消毒剂，如 0.75%吡咯烷酮碘、2%红汞、0.1%洗必泰或 0.1%新洁尔灭溶液涂擦 2 次。70%酒精多用于植皮时供皮区的消毒。故本题选 C。

473.(A1 型题)24 低钾血症的血清钾浓度，低于

- A.3.5mmol/L
- B.4mmol/L
- C.4.5mmol/L
- D.5mmol/L
- E.5.5mmol/L

答案：A

解析：血清钾正常值为 3.5~5.5mmol/L，<3.5mmol/L 为低钾血症，>5.5mmol/L 为高钾血症。故本题选 A。

474.(A1 型题)28 下列哪项不是输血的适应证

- A.严重感染
- B.大面积烧伤
- C.心力衰竭
- D.凝血功能异常
- E.低蛋白血症

答案：C

解析：输血的适应证包括急性出血、贫血或低蛋白血症、凝血机制异常和出血性疾病、重症感染、器官移植。故本题选 C。

475.(A1 型题)31 白血症引起的休克，属于

- A.创伤性休克
- B.失血性休克
- C.过敏性休克
- D.感染性休克
- E.心源性休克

答案：D

解析：白血病患者常伴粒细胞减少，特别在化疗、放疗后粒缺将持续相当长时间，故易致感染性休克。创伤性休克常见病因有严重烧伤、骨折、内脏损伤、软组织挤压伤。失血性休克常见病因有上消化道出血、宫外孕破裂出血、动脉瘤破裂以及肝、脾和大动脉破裂出血。过敏性休克多发生于对青霉素、普鲁卡因、血清制剂和疫苗过敏者。心源性休克常见于大面积心肌梗死、室壁瘤形成、严重心律不齐、急性心肌炎和心包填塞。故本题选 D。

476.(A2 型题)69 感染性休克患者，症见：高热，神昏谵语，唇干烦渴，小便短赤，舌红绛，苔黄燥，脉细数无力。其证型是

- A.热厥
- B.寒厥
- C.血脱
- D.气脱
- E.气逆

答案：A

解析：热厥证表现为烦躁不安，汗出咽干，口渴欲饮，尿少或无尿，舌红少津，脉细无力。寒厥证表现为精神萎靡，反应迟钝，大汗淋漓，身冷畏寒，口淡不渴，心悸胸闷，四肢厥冷，尿少或无尿，舌淡苔白，脉微欲绝。血脱证表现为大汗淋漓，烦躁不安，口燥咽干，皮干，静脉萎陷，尿少或无尿，舌质红而干，脉微细数。气脱证表现为神志模糊，语声低微，冷汗不出，身凉畏冷，四肢不温，尿少或无尿，舌质淡白或淡暗，脉微欲绝。气逆证表现为面色灰白，精神恍惚或神昏，汗出身冷，口燥咽干，肌肤干皱，四肢厥冷，尿少或无尿，舌淡光滑无苔，脉微欲绝。故本题选A。

477.(A2型题)71 患者，72岁。烧伤1周后，神识淡漠，面色苍白，呼吸急促，口唇淡紫，体温36.5℃，四肢厥冷，脉细缓。其证型是

- A.气阴两伤
- B.阴损及阳
- C.胃阴伤败
- D.气血两亏
- E.热入营血

答案：B

解析：阴损及阳证表现为面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，自汗肢冷，体温不升反降，脉细缓。气阴两伤证表现为精神疲倦，气短懒言，口干喜饮，自汗，盗汗，舌淡苔少，脉细弱。胃阴伤败证表现为面色萎黄，纳呆食少，腹胀便溏，口干少津或口舌生糜，舌干红，苔花剥或无苔，脉细数。气血两亏证表现为神疲倦卧，气短懒言，形体消瘦，面色无华，创面愈合迟缓，舌淡，苔薄白或薄黄，脉细弱。热入营血证表现为壮热躁动，口干唇燥，大便秘结，小便短赤，舌红绛而干，苔黄或黄糙或焦干起刺，脉洪数。故本题选B。

478.(A2型题)74 患者，男，20岁。初起颜面部红肿热痛，肿势局限，可见一个脓头，3~5日化脓，出脓即愈。应首先考虑的是

- A.疖
- B.痈
- C.急性淋巴管炎
- D.急性淋巴结炎
- E.痤疮

答案：A

解析：疖的局部症状为初起有红、肿、热、痛的小结节，逐渐肿大，数天后脓栓脱落，脓液排出，炎症随之消退而愈。痈早期在局部呈片状稍隆起的紫红色浸润区，随后中央形成多个脓栓，破溃后呈蜂窝眼状，相当于中医的有头疽。急性淋巴管炎浅部见一条或数条“红线”，硬且明显压痛，深部肢体明显肿胀和压痛，淋巴管走行部位压痛更明显。急性淋巴结炎早期有局部淋巴结肿大和压痛，后局部红肿热痛加剧。痤疮初为坚实丘疹，挤之有白色粉样物质，反复挤压形成大小不等的结节，病程较长。故本题选A。

479.(A2型题)77 患者，男，41岁。头面丹毒，红肿，恶寒发热，口渴，便秘溲黄，舌红苔黄，脉洪数。其证型是

- A. 风热化火
- B. 气血两燔
- C. 湿热化火
- D. 热毒蕴结
- E. 热毒入营

答案：A

解析：丹毒风热化火证发于头面部，发热恶寒，口干舌燥，舌红，苔薄黄，脉洪数。故本题选A。

480.(A2型题)79 患者，男，34岁。左腰背浅表肿物约拇指头大小，外观圆形，表面光滑，边界清楚，与皮肤粘连，基底无粘连。其诊断是

- A. 皮样囊肿
- B. 表皮囊肿
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 腱鞘囊肿
- E. 纤维瘤

答案：C

解析：皮脂腺囊肿圆形，界清，与皮肤粘连，与基底不粘连。皮样囊肿圆形，界清，与皮肤不粘连，与基底粘连。表皮囊肿圆形，与基底不粘连，可与皮肤粘连。腱鞘囊肿界限不清，有肿胀和疼痛、压痛。纤维腺瘤圆形，界清，无粘连，活动性大。故本题选C。

481.(A2型题)82 患者，男，45岁。脘腹胀痛，呕吐，停止排便排气60小时。检查：神情淡漠，末梢循环差，腹胀如鼓，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，肠鸣音微弱，舌红绛苔黄腻，脉沉细数。应首先考虑的是

- A. 肠梗阻瘀结证
- B. 肠梗阻疽结证
- C. 肠梗阻痞结证
- D. 阑尾炎瘀滞证
- E. 阑尾炎湿热证

答案：A

解析：肠梗阻症状主要为腹痛、呕吐、腹胀、停止排便排气，其中瘀结证表现为腹痛、腹胀、呕吐、无排气排便，舌红绛苔黄腻，脉沉细数。故本题选A。

482.(A2型题)84 患者，男，32岁。酗酒后突感左上腹剧痛，并向左腰部放射，伴发热，恶心呕吐。查体：腹平软，左上腹呈束带式压痛，肝、脾不大。应首先考虑的是

- A. 现为右上腹阵发性绞痛。C 伴腹泻。D 腹部无压痛，查心电图及心肌酶谱等可鉴别。E 为中上腹持续性剧痛，与酗酒无关。
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肠炎
- D. 心肌梗死
- E. 急性胃炎

答案：B

解析：急性胰腺炎腹痛剧烈，起始于中上腹，也可偏重于右上腹或左上腹，放射至背部，累及全胰则呈腰带状向腰背部放射痛，伴恶心、呕吐、腹胀，可有发热、腹膜炎体征、黄疸等。

483.(A2型题)87 患者，女，26岁。左侧急性乳腺炎7天，现左乳房红肿，疼痛剧烈，呈持续性搏动性疼痛，伴高热，口渴喜饮，舌苔黄，脉弦数。其治法是

- A.疏肝清胃，通乳散结
- B.清热解毒，通乳透脓
- C.疏肝理气，化痰软坚
- D.调理气血，通乳散结
- E.行气活血，软坚散结

答案：B

解析：此为急性乳腺炎热毒炽盛证，且乳房里脓肿已成，治法应清热解毒，通乳透脓。故本题选B。

484.(A2型题)89 患者，女，25岁。左乳内肿块，呈卵圆形，质地坚韧，表面光滑，活动度大，无压痛。应首先考虑的是

- A.乳房结核
- B.乳腺增生病
- C.乳腺纤维腺瘤
- D.乳癌
- E.乳腺导管扩张症

答案：C

解析：乳腺纤维腺瘤肿块较硬，边界清楚，表面光滑，活动度好，无压痛。乳房结核肿块质硬，边界不清，往往和皮肤有粘连。乳腺增生病肿块边界不清，质韧，推之可移，有压痛。乳腺癌肿块质硬，活动性差，边界不清。乳腺导管扩张症乳头、乳晕及其附近可有小结节，乳头有溢液。故本题选C。

485.(A2型题)92 患者，女，58岁。右乳房发现肿块2个月。查体：右乳头抬高，乳头凹陷，右乳外上象限可扪及一个2cm×2.5cm大小肿块，质硬，表面不平，边界不清，活动度差。应首先考虑的是

- A.乳腺纤维腺瘤
- B.乳腺囊性增生病
- C.乳腺癌
- D.乳房结核
- E.乳腺导管扩张症

答案：C

解析：乳腺癌包块质硬，表面不光滑，边界不清，活动度差，无压痛，局部皮肤可有酒窝征，橘皮样改变，乳头可内陷、溢液。余参见89题。故本题选C。

486.(A2型题)94 患者，男，27岁。患右腹股沟斜疝2个月，今早剧烈运动后，肿块不能回纳，伴腹痛，呕吐，腹胀。应首先考虑的是

- A.难复性疝
- B.滑动性疝
- C.嵌顿性疝

D.可复性疝

E.肠管壁疝

答案：C

解析：腹内压突然增高时，疝内容物可强行进入疝囊，囊颈将内容物卡住，使其不能回纳，称为嵌顿性疝，如其内容物为肠管，可使肠壁淤血和水肿，出现消化道症状。难复性疝其内容物反复突出，致囊颈损伤并产生粘连，使内容物不能完全回纳。滑动性疝属难复性疝，其内容物不能完全回纳。可复性疝在站立、行走、劳动或腹内压骤增时突出，在平卧、休息或用手推送时可回纳。肠壁管疝嵌顿的内容物仅为部分肠壁。故本题选C。

487.(A2型题)97 患者，男，66岁。有膀胱结石史。现小便淋漓，夜尿频多，间有尿痛，腰膝酸软，舌尖红苔微黄，脉虚数。其证型是

A.肾阴虚

B.肾虚有热

C.膀胱湿热

D.肾气虚

E.瘀阻水道

答案：B

解析：小便淋漓，夜尿频多，腰膝酸软是肾虚的表现，舌尖红苔微黄，脉数为热象。故本题选B。

488.(A2型题)100 患者，男，35岁。尿频，尿道灼痛，会阴部隐痛1周。前列腺液镜检：白细胞增多，卵磷脂小体减少。应首先考虑的中医诊断是

A.精癯

B.子痛

C.子痰

D.水疝

E.精浊

答案：E

解析：患者出现尿频，尿道灼痛，会阴部隐痛，前列腺液镜检：白细胞增多，卵磷脂小体减少，这些症状符合慢性前列腺炎的诊断要点。慢性前列腺炎中医称为精浊。而B是指睾丸及附睾的感染性疾病。故本题选E。

489.(A2型题)102 前列腺增生症患者，小便点滴不尽，小腹胀满疼痛，舌质紫暗，脉涩。治疗应首选

A.五神汤加减

B.枸橼汤加减

C.抵挡丸

D.龙胆泻肝汤

E.知柏地黄丸

答案：C

解析：此属前列腺增生血瘀证，法应活血化瘀止痛，选用抵挡丸。故本题选C。

490.(A2型题)104 患者便血，色鲜红，伴有肿物脱出肛外，便后可自行复位。应首先考虑的是

- A.肛裂
- B.一期内痔
- C.二期内痔
- D.三期内痔
- E.直肠息肉

答案：C

解析：I 期内痔便秘时粪便带血或滴血，无痔核脱出，II 期内痔为无痛性便血，便秘时痔核能脱出肛外，便后能自行还纳，III 期内痔便血少或无便血，便秘时痔核常脱出肛外，不能自行还纳。故本题选 C。肛裂便血鲜红，肛门疼痛剧烈，无脱出肛外肿物。直肠息肉以便血、肿物脱出为主，便后不可自行复位。

491.(B 型题)108 内托法的代表方是

- A.荆防败毒散
- B.托里消毒散
- C.五味消毒饮
- D.龙胆泻肝汤
- E.香贝养营汤

答案：B

解析：托里消毒散是益气托毒法代表方，用于肿疡毒势方盛，正气已虚，不能托毒外出。五味消毒饮是清热解毒法的代表方，用于热毒之证。A 是解表法中辛温解表法的代表方。D 是理湿法之清热利湿法的代表方。E 是祛痰法之养营化痰法的代表方。故 108 题选 B，109 题选 C。

492.(B 型题)110 将各种不同的药物浸泡于乙醇溶液中取其药液，即为

- A.油膏
- B.箍围药
- C.草药
- D.酊剂
- E.消毒剂

答案：D

解析：A 是指将药物和油类煎熬或调匀成膏的制剂。B 是指将具有箍集围聚，收束疮毒作用的粉剂用液体、蜜或饴糖等调成糊状敷疮上。D 是将各种不同的药物浸泡于乙醇溶液中取其药液。故 110 题选 D，111 题选 B。

493.(B 型题)113 皮肤消毒，应首选

- A.甲醛
- B.石炭酸
- C.0.1%新洁尔灭
- D.0.5%亚硝酸钠
- E.2.5%碘酊

答案：E

解析：口腔黏膜消毒应选用 0.1%新洁尔灭，皮肤消毒一般选用 2.5%碘酊。故 112 题选 C，113 题选 E。

494.(B型题)115 椎管内麻醉由于某种原因引起脑脊液压力过低，可致

- A. 血压下降
- B. 呼吸抑制
- C. 恶心呕吐
- D. 头痛
- E. 尿潴留

答案：D

解析：血压下降常发生于麻醉范围过广或高部位阻滞。呼吸抑制多见于高位硬膜外阻滞。恶心呕吐常由于血压骤降或手术牵拉内脏引起。头痛与脑脊液由针眼不断外渗到硬膜外腔有关，是椎管内麻醉的常见术后并发症。尿潴留是因支配膀胱排尿功能的神经恢复最慢或伤口致膀胱括约肌反射性痉挛。故 114 题选 A，115 题选 D。

495.(B型题)117 在短时间内输入所需血量者，适用于

- A. 大出血
- B. 中度缺水
- C. 纠正贫血和低蛋白血症
- D. 严重感染
- E. 凝血异常

答案：A

解析：单纯贫血者应输红细胞混悬液，合并低蛋白血症者宜用全血，输血量取决于红细胞丢失的程度。急性大量失血患者应迅速恢复血容量并输红细胞。凝血异常除输新鲜血外，更重要还要输有关的凝血因子。严重感染要替换血液中的有害物质。故 116 题选 C，117 题选 A。

496.(B型题)120 治疗骨折初期，外用药应首选

- A. 消瘀止痛膏
- B. 阳和解凝膏
- C. 金不换膏
- D. 驳骨散
- E. 玉露散

答案：D

解析：驳骨散可接骨续筋，用于骨折初期。金不换膏可舒筋活络，可用于骨折后期。故 120 题选 D，121 题选 C。

497.(B型题)122 烧伤患者，高热灼手，汗多气粗，口渴头痛，烦躁不安，舌红绛苔黄，脉洪数。其证型是

- A. 火热伤津
- B. 气阴两伤
- C. 阴损及阳
- D. 气营两燔
- E. 热入营血

答案：E

解析：热入营血证表现为壮热躁动，口干唇燥，大便秘结，小便短赤，舌红绛而干，苔黄或黄糙或焦干起刺，脉洪数。火热伤津证候表现为壮热，口干唇燥，口渴喜饮，大便秘结，小便短赤，舌红而干，苔黄少津，脉细数。故 122 题选 E，123 题选 A。

498.(B型题)125 西医学的颈部急性淋巴结炎，相当于中医学的

- A.蛇眼疔
- B.红丝疔
- C.颈痈
- D.有头疽
- E.烂疔

答案：C

解析：急性淋巴结炎相当于中医学的外痈，长于颈部的外痈称为颈痈。蛇眼疔相当于西医学的甲沟炎。红丝疔相当于西医学的急性淋巴管炎。西医学的痈中医学称为有头疽。烂疔相当于西医学的气性坏疽。故 126 题选 D，127 题选 C。

499.(B型题)128 中医学的附骨疽，相当于西医学的

- A.败血症
- B.痈
- C.急性化脓性骨髓炎
- D.手指化脓性感染
- E.气性坏疽

答案：C

解析：化脓性骨髓炎相当于中医学的附骨疽。败血症属于全身性感染，全身性感染相当于中医学的走黄。痈相当于中医学的有头疽。手指化脓性感染相当于西医学的蛇头疔。气性坏疽相当于中医学的烂疔。故 128 题选 C，129 题选 A。

500.(B型题)130 来自间叶组织的恶性肿瘤，称为

- A.癌
- B.瘤
- C.肉瘤
- D.临界瘤
- E.纤维瘤

答案：C

解析：肉瘤是来自于间叶组织的恶性肿瘤。癌是来自上皮组织的恶性肿瘤。瘤是来自于上皮组织的良性肿瘤。介于良性与恶性肿瘤间的过渡性肿瘤称为临界瘤。纤维瘤是良性肿瘤。故 130 题选 C，131 题选 A。

501.(B型题)132 急性阑尾炎瘀滞证，转移性右下腹痛，脘腹胀闷，大便秘结，舌淡红苔薄白，脉弦紧。治疗以通里攻下为主，还应

- A.行气祛瘀，佐以清热解毒
- B.活血祛瘀，佐以清热利湿
- C.清热利湿，佐以行气活血
- D.清热解毒，佐以行气凉血
- E.行气凉血，佐以利湿消肿

答案：A

解析：急性阑尾炎瘀滞证治法以行气活血，通腑泻热为主，脘腹胀闷，大便秘结为胃肠热毒积聚，故应佐以清热解毒。急性阑尾炎湿热证治法以通腑泻热，利湿解毒为主，同时为防湿

热致气血瘀滞，故佐以行气活血。故 132 题选 A，133 题选 C。

502.(B 型题)135 最易嵌顿的疝，是指

- A.腹股沟斜疝
- B.腹股沟直疝
- C.股疝
- D.肠梗阻
- E.睾丸鞘膜积液

答案：A

解析：腹股沟斜疝肿块常在站立、行走、咳嗽或劳动时出现，多呈带蒂柄的梨形，并可降至阴囊或大阴唇，平卧时肿块可向腹腔回纳而消失。腹股沟直疝当病人直立时，在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿物，平卧时可消失。嵌顿性疝通常发生在斜疝，强劳力或排便等腹内压骤增是其主要原因，临床上表现为疝块突然增大，并伴有明显疼痛，平卧或用手推送不能使肿物回纳，肿物紧张发硬，且明显触痛。故 134 题选 A，135 题选 A。

503.(B 型题)137 患者左输尿管结石，停留日久不移，外形不整，腰部胀痛，舌有瘀点，脉沉涩。其治法是

- A.滋阴清热，通淋排石
- B.行气利水，通淋排石
- C.清热利湿，消石通淋
- D.理气祛瘀，软坚排石
- E.健脾益气，通淋排石

答案：D

解析：肾结石患者证属脾虚气滞，治法应为健脾益气，通淋排石。输尿管结石患者证属气滞血瘀，法应理气祛瘀，软坚排石。故 136 题选 E，137 题选 D。

504.(A1 型题)1 女性外阴发生感染时，最易形成炎症及脓肿的部位是

- A.大阴唇
- B.小阴唇
- C.前庭大腺
- D.阴道前庭
- E.处女膜

答案：C

解析：前庭大腺位于阴道口的两侧，大阴唇的后部，腺管开口与前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内，此处容易细菌滋生和存活，所以一旦女性外阴发生感染时，细菌容易侵犯腺体导致其形成炎症及脓肿。故本题选 C。

505.(A1 型题)5 下列关于子宫的叙述，错误的是

- A.位于骨盆腔中央
- B.宫腔呈上窄下宽的三角形
- C.主月经
- D.主孕育胎儿
- E.形态似腑，功能似脏

答案：B

解析：子宫正常位置于骨盆腔中央，位于直肠之前、膀胱之后，下接阴道，呈倒置的梨形，前面扁平，后面稍凸出、前倾前屈位。它形态似腑，功能似脏，主月经，主孕育胎儿，主分娩。故本题选 B。

506.(A1 型题)8 下列各项，不属女性生殖器内藏部分的是

- A.子宫
- B.卵巢
- C.前庭大腺
- D.输卵管
- E.附件

答案：C

解析：女性生殖器内藏部分包括胞宫及子门。其中胞宫包括解剖学的子宫、卵巢、输卵管。后两者有称为附件。故本题选 C。

507.(A1 型题)11 使子宫内膜由增殖期变为分泌期的激素是

- A.雌激素
- B.促性腺激素释放激素(GnRH)
- C.促卵泡素(FSH)
- D.孕激素
- E.黄体生成素(LH)

答案：D

解析：孕激素能使子宫内膜由增殖期变为分泌期。故本题选 D。

508.(A1 型题)14 若卵子排出后未受精，黄体开始萎缩的时间，是在排卵后的

- A.4~5 天
- B.7~8 天
- C.9~10 天
- D.11~12 天
- E.13~14 天

答案：C

解析：黄体开始萎缩的时间，是在排卵后的 9~10 天。故本题选 C。

509.(A1 型题)16 中医学的“居经”是指

- A.月经 1 月两行
- B.月经 2 月一行
- C.月经 3 月一行
- D.终身不来月经而能受孕
- E.受孕之初，仍按月少行经

答案：C

解析：参见 15 题。故本题选 C。

510.(A1 型题)20 下列产褥期的临床表现，正确的是

- A.产后第一日，子宫底稍下降
- B.产后初期，产妇脉搏增快

- C.产后 1~2 天可发生“泌乳热”
- D.产后宫缩痛多见于经产妇
- E.恶露通常持续 1~2 周

答案：D

解析：产后宫缩痛多见于经产妇。A 产后第一日因子宫颈外口升至坐骨棘水平，致使宫底稍上升。B 产后脉搏略缓慢，可能与子宫胎盘循环停止及卧床休息有关。C 产后 3~4 天可出现泌乳热。E 产褥期恶露通常可持续 4~6 周。故本题选 D。

511.(A1 型题)23 下列哪项不是妇科的常用治法

- A.滋肾补肾
- B.疏肝养肝
- C.健脾和胃
- D.滋肺养心
- E.清热解毒

答案：D

解析：妇产科的常用内治法包括：滋肾补肾、疏肝养肝、健脾和胃、调理气血、清热解毒、利湿除痰、调理奇经。故本题选 D。

512.(A1 型题)26 下列各项，属妊娠剧吐肝胃不和证主要症状的是

- A.呕吐血性分泌物
- B.呕吐清水
- C.呕吐痰涎
- D.呕吐食物残渣
- E.呕吐酸水或苦水

答案：E

解析：妊娠剧吐肝胃不和证主要呕吐酸水或苦水。A 为气阴两虚证的表现。B 为脾胃虚弱证的表现。C 为痰湿阻滞证。D 不见于妊娠呕吐。故本题选 E。

513.(A1 型题)30 中医学认为，异位妊娠最主要的病因病机是

- A.冲任虚弱
- B.肾气不足
- C.寒凝气滞
- D.痰湿阻胞
- E.少腹血瘀

答案：E

解析：中医认为本病的病因病机：一因虚，主要是脾肾气虚，不能把孕卵及时送达胞宫；二因阻，孕卵受到阻滞，不能送达胞宫。由于孕卵未能移行至胞宫，而居于胞脉，久而胞脉破损，血溢妄行，离经之血淤积少腹，气机阻滞，不通则痛，形成少腹血瘀证。最主要的病因病机为少腹血瘀。故本题选 E。

514.(A1 型题)35 白术散适用于妊娠高血压综合征的哪种证型

- A.脾虚湿盛
- B.肾虚水泛
- C.气滞湿阻

D.脾虚肝旺

E.阴虚肝旺

答案：A

解析：参见 32 题。故本题选 A。

515.(A1 型题)39 产后发热感染邪毒证，若实热瘀血内结阳明者，治疗应首选

A.青霉素加五味消毒饮合失笑散

B.青霉素加白虎加人参汤

C.青霉素加大黄牡丹皮汤

D.庆大霉素加清营汤送服紫雪丹

E.庆大霉素加清营汤送服安宫牛黄丸

答案：C

解析：产后发热感染邪毒证，若实热瘀血内结阳明者，治疗宜用青霉素加大黄牡丹皮汤。故本题选 C。

516.(A1 型题)44 治疗霉菌性阴道炎，应首选

A.柏己片塞药加 3%小苏打液冲洗

B.制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗

C.灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗

D.柏己片塞药加 1%乳酸液冲洗

E.灭滴灵塞药加 3%小苏打液冲洗

答案：B

解析：治疗念珠菌阴道炎宜首选制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗。故本题选 B。

517.(A1 型题)49 下列哪项不是无排卵型功能失调性子宫出血的特征

A.月经周期紊乱

B.经期长短不一，反复不净

C.经量或多如注，或少而淋漓

D.基础体温呈单相型

E.宫内膜呈分泌期改变

答案：E

解析：①阴道流血，量多或时多时少；②月经周期紊乱、缩短或正常，经期长短不一；③妇检：子宫、附件无异常，基础体温呈单相型或黄体不健；④阴道脱落细胞涂片无排卵的周期性变化；⑤宫颈黏液结晶呈羊齿状或不典型；⑥经前或以期子宫内膜检查可见不同程度的增生期变化，无分泌期改变。故本题选 E。

518.(A1 型题)54 治疗无排卵型功能失调性子宫出血肾阴虚证，应首选

A.四物汤合二至丸

B.左归丸合二至丸

C.右归丸合二至丸

D.保阴煎合失笑散

E.两地汤合失笑散

答案：B

解析：无排卵型功血肾阴虚证治宜滋肾益阴，固冲止血，方选左归丸合二至丸。A 用于血虚

证。C 用于肾阳虚证。D、E 用于阴虚血瘀证。故本题选 B。

519.(A1 型题)59 治疗因口服避孕药所致月经不调肾阳虚证，应首选

- A. 失笑散合四物汤
- B. 左归丸合二至丸
- C. 右归丸合二至丸
- D. 保阴煎合失笑散
- E. 举元煎合失笑散

答案：C

解析：月经不调肾阳虚证，方选右归丸合二至丸滋肾益阴，固冲止血。故本题选 C。

520.(A1 型题)64 治疗闭经气血虚弱证，应首选

- A. 黄体酮加一阴煎
- B. 西药人工周期加启宫丸
- C. 人参养荣汤
- D. 举元煎
- E. 圣愈汤

答案：C

解析：治疗闭经气血虚弱证宜选用人参养荣汤益气养血调经。故本题选 C。

521.(A1 型题)70 治疗痛经寒湿凝滞型，应首选

- A. 桃红消瘀汤
- B. 桃红四物汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 少腹逐瘀汤

答案：E

解析：痛经寒湿凝滞证治宜温经散寒，化瘀止痛。方选少腹逐瘀汤。故本题选 E。

522.(A1 型题)75 较大的多发性子宫肌瘤伴月经过多及贫血患者，无生育要求者，应首选的治疗措施是

- A. 子宫肌瘤摘除术
- B. 子宫全切术
- C. 雄激素加桂枝茯苓丸
- D. 孕激素加桂枝茯苓丸
- E. 纠正贫血加桂枝茯苓丸

答案：B

解析：较大的多发性子宫肌瘤伴月经过多及贫血患者，无生育要求者，应首选子宫全切术伴纠正贫血治疗。故本题选 B。

523.(A1 型题)78 下列各项，不属于子宫肌瘤中医常见证型的是

- A. 气血虚弱
- B. 气滞血瘀
- C. 阴虚内热

D.痰湿瘀阻

E.寒湿凝滞

答案：A

解析：子宫肌瘤中医常见证型包括气滞血瘀、阴虚内热、痰湿瘀阻、寒湿凝滞、湿热夹瘀。故本题选A。

524.(A1型题)82 治疗轻度子宫脱垂肾虚型，应首选

A.刮宫术加抗生素

B.子宫托加大补元煎

C.刮宫术加补中益气汤

D.宫缩剂加抗生素

E.子宫托加补中益气汤

答案：B

解析：治疗肾虚型轻度子宫脱垂西医使用子宫托，中药方剂选用大补元煎。故本题选B。

525.(A1型题)85 子宫穿孔的表现是恶心、呕吐、冷汗，并伴有

A.血压下降，心律不齐，心跳过缓

B.血压下降，心跳加快

C.腹部牵扯样剧痛，子宫压痛

D.阴道大出血

E.剧烈腹痛，腹部包块

答案：C

解析：子宫穿孔的临床表现：①宫腔手术过程中出现下腹突发性疼痛，腹部牵扯样剧痛。②下腹压痛、反跳痛。③如穿孔损伤大血管，短时间内即可有内出血的典型表现，并迅速发生休克，并且常伴有恶心、呕吐冷汗等症状。故本题选C。

526.(B型题)133 患者停经3个月余，子宫如孕40天大小。应首先考虑的是

A.胎动不安

B.滑胎

C.完全流产

D.过期流产

E.感染性流产

答案：D

解析：过期流产即稽留流产，指胚胎或胎儿在宫内已死亡后仍未自然排出者。妊娠诊断肯定，曾有先兆流产症状或无，之后妊娠反应消失，妊娠试验转为阴性。检查：子宫不再增大或反而减小，胎动消失，检查子宫较停经月份小，质地不软，子宫颈口闭。感染性流产主要发生于各类流产后，除流产的一般症状外，主要伴有高热寒战、腹痛等感染症状。故133题选D，134题选E。

527.(B型题)139 治疗子宫肌瘤寒湿凝滞证，应首选

A.桂枝茯苓丸

B.膈下逐瘀汤

C.参茜固经冲剂

D.逐瘀止血汤

E.清海丸

答案：A

解析：子宫肌瘤寒湿凝滞的治疗宜散寒除湿、活血消癥，方选桂枝茯苓丸。阴虚内热证的治疗宜滋阴清热，活血消癥，方选清海丸。故 139 题选 A，140 题选 E。

528.(B 型题)144 疑诊子宫内膜脱落不全，选择诊断性刮宫的时间是

A.月经来潮第 6 天

B.月经来潮第 5 天

C.月经来潮第 3 天

D.月经来潮第 2 天

E.月经来潮 6 小时内

答案：B

解析：对于不孕症或功能失调性子宫出血患者，应选在月经前或月经来潮后 6 小时内刮宫，以判断有无排卵或黄体功能不足。子宫内膜脱落不全的诊断：BBT 高温期有少量子宫出血，BBT 下降后子宫出血增多如月经量，并按时停止。子宫出血第 5 天子宫内膜活检仍有分泌相。故 143 题选 E，144 题选 B。

529.(A1 型题)1 小儿从出生后到满 1 周岁之前，应属

A.新生儿期

B.幼儿期

C.婴儿期

D.学龄期

E.学龄前期

答案：C

解析：小儿从出生后到满 1 周岁为婴儿期。A 是指小儿从出生后脐带结扎开始，到生后满 28 天。B 是指小儿 1 周岁到 3 周岁。D 是指小儿七周岁到青春期来临。E 是指小儿三周岁到七周岁。故本题选 C。

530.(A1 型题)6 小儿体格发育最快的时期是

A.婴儿期

B.新生儿期

C.学龄前期

D.学龄期

E.幼儿期

答案：A

解析：小儿体格发育最快的时期是婴儿期，初步适应了外界环境，生长迅速。B 小儿适应能力及御邪能力较差，易出现疾患。C 小儿发育稳步增长，智力发育日趋完善。D 小儿发育仍稳步增长。E 小儿体格增长较婴儿期缓慢。故本题选 A。

531.(A1 型题)10 小儿感冒每易夹惊，中医学认为其原因是

A.脾常不足

B.肾常虚

C.形气未充

D.肝常有余

E.肺常不足

答案：D

解析：小儿生理上心神怯弱、肝气未盛，病理上易感外邪，各种外邪均易从火化，而见火热伤肝引动肝风的症状。故本题选D。

532.(A1型题)14 察指纹的适用年龄是

A.5岁以内

B.4~5岁

C.4岁以内

D.3~4岁

E.3岁以内

答案：E

解析：察指纹是对3岁以内的小儿用以代替脉诊的一种辅助诊法，用以辨别婴幼儿疾病的病因、性质并估计预后等。故本题选E。

533.(A1型题)18 新生儿病理性黄疸出现的时间是

A.出生后24小时内

B.出生后2~3天

C.出生后1周

D.出生后10天

E.出生后28天

答案：A

解析：新生儿出生后24小时内即出现黄疸，3周后仍不消退，甚或持续加深或减退后复现，均为病理性黄疸。故本题选A。

534.(A1型题)22 小儿上呼吸道感染的中医治疗，应以何法为主

A.清法

B.分利

C.通腑

D.解表

E.宣肺

答案：E

解析：小儿上呼吸道感染常见咳嗽气急，故应以宣肺为主。故本题选E。

535.(A1型题)31 下列哪项不是小儿急性肾炎的临床特征

A.多数患儿都有血尿

B.病程早期常有高血压

C.部分病例可出现急性肾功能不全

D.血压急剧升高时可出现高血压脑病

E.浮肿为可凹性、上行性

答案：E

解析：小儿急性肾炎的临床特征有浮肿及尿量较少，浮肿为非凹陷性；血尿；高血压。并发症有高血压性脑病，严重循环充血，急性肾衰竭。血清总补体及C₃可一过性明显下降，6~8周可恢复。故本题选E。

536.(A1 型题)35 哮喘的病位在

- A.肺、脾、肾
- B.心、肝、肺
- C.心、肝、肾
- D.心、肺、脾
- E.肺、肝、肾

答案：A

解析：哮喘的病位主要在肺、脾、肾三脏。三脏功能不全，导致痰饮留伏，隐伏于肺窍，成为哮喘之宿根。故本题选 A。

537.(A1 型题)39 治疗维生素 D 缺乏性佝偻病脾虚气弱型，应首选

- A.人参五味子汤
- B.养脏汤
- C.小建中汤
- D.大建中汤
- E.归脾汤

答案：E

解析：佝偻病脾虚气弱证应治以健脾益气，方用归脾汤。A 用于久嗽脾虚。B 用于寒热失调之痢疾。C 用于中焦虚寒，肝脾不和证。D 用于中阳衰弱，阴寒内盛之脘腹剧痛证。故本题选 E。

538.(A1 型题)43 下列出疹性急性传染病中，哪项是在发热 3~4 天后，热退疹出

- A.风疹
- B.幼儿急疹
- C.猩红热
- D.麻疹
- E.水痘

答案：D

解析：在发热 3~4 天后，热退疹出的是麻疹。A 通常于发热 1~2 天后出现皮疹，皮疹先从面颈部开始，在 24 小时蔓延到全身；B 多在体温持续 3~5 天后骤退，热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹，压之退色；C 皮疹于 24 小时左右迅速出现，最初见于腋下、颈部与腹股沟，1 日内迅速蔓延至全身；E 在发病 24 小时内出现皮疹，迅即变为米粒至豌豆大的圆形紧张水疱，周围明显红晕，有水疱的中央呈脐窝状。故本题选 D。

539.(A1 型题)47 治疗小儿胆道蛔虫症，应首选的方剂是

- A.使君子散
- B.乌梅丸
- C.肥儿丸
- D.资生健脾丸
- E.驱蛔承气汤

答案：B

解析：治疗小儿胆道蛔虫症，首选的方剂是乌梅丸，可温脏安蛔，治疗蛔厥证。A 用于一般的蛔虫症。C 用于治疗疳积。D 用于脾胃不和之疳积。E 用于虫瘕证。故本题选 B。

540.(A1 型题)49 一般心肺复苏的正确步骤是

- A.通畅气道，建立呼吸，循环支持，药物治疗
- B.建立呼吸，通畅气道，胸外心脏按压
- C.先口对口人工呼吸，再胸外心脏按压，心腔内注射药物
- D.先胸外按压恢复心跳，再口对口呼吸及药物治疗
- E.先心腔内注射药物恢复心跳，再进行口对口呼吸及胸外心脏按压

答案：A

解析：心肺复苏的一般步骤为通畅气道，建立呼吸，循环支持，药物治疗。故本题选 A。

541.(A1 型题)50 下列哪项不是小儿厌食胃阴不足证的证候特征

- A.食少饮多
- B.皮肤欠润
- C.大便偏干
- D.面色不华
- E.舌红苔黄腻

答案：E

解析：厌食胃阴不足证表现为不思饮食，食少饮多，口舌干燥，皮肤欠润，形体偏瘦，小便短黄，大便干结，烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。E 为湿热证的表现。故本题选 E。

542.(A1 型题)52 小儿急惊风的主要病位在

- A.心、肝
- B.心、脾
- C.心、肾
- D.肝、脾
- E.肝、肾

答案：A

解析：小儿急惊风主要因外感时邪、痰热积滞或暴受惊恐，蒙蔽心包，引动肝风而发病。故病位在心、肝，选 A。

543.(A2 型题)56 患儿，女，10 岁。因头晕心悸就诊，脉搏 60 次/分，重按始得。其脉象是

- A.浮数
- B.沉迟
- C.沉数
- D.浮迟
- E.常脉

答案：B

解析：10 岁小儿的正常脉率为 70~90 次/分，故患儿脉率慢。而重按始得是沉脉的特点，故该患儿脉象是沉迟脉。A 表现为脉率快，轻按应手。C 表现为脉率快，重按始得。D 表现为脉率慢，轻按应手。E 表现为脉率正常，不浮不沉，不大不小，从容和缓，柔和有力。故本题选 B。

544.(A2 型题)59 患儿，6 个月。因腹泻长期使用广谱抗生素。症见：满口白屑，状如雪花，

不易擦去。应首先考虑的是

- A.乳垢
- B.口糜
- C.疳积
- D.奶麻
- E.鹅口疮

答案：E

解析：患儿有长期使用抗生素史，可见满口白屑，状如雪花，不易擦去，首先考虑鹅口疮。A可用棉棒擦去，其下黏膜正常。B满口出现黄白色溃疡，色红疼痛。C以神萎、面黄肌瘦、毛发焦枯、肚大筋露、纳呆便溏为主要表现。D多发于哺乳期婴儿，以骤起高热，热退后肌肤出现玫瑰色细散皮疹为主要表现。故本题选E。

545.(A2型题)63 患儿，1岁。腹泻2天，泻下急迫，大便如水注，有黏液及腥臭味，伴发热，烦躁口渴，肢体困倦，小便短赤，肛门灼热，发红。其证型是

- A.伤食
- B.风寒
- C.脾虚
- D.湿热
- E.脾肾阳虚

答案：D

解析：小儿湿热内盛，湿困脾阳，运化失职，湿盛而见泻下急迫，大便如注，伴有黏液及腥臭味。湿邪夹热而见发热，烦躁口渴，小便短赤，肛门灼热、发红。故可辨证为湿热。故本题选D。

546.(A2型题)65 患儿，2岁。腹泻3天，大便稀薄，色淡多沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，时伴发热，鼻塞流涕，轻咳，口不渴，舌苔白润，诊断为婴幼儿腹泻风寒泄泻证。治疗应首选

- A.荆防败毒散
- B.胃苓汤
- C.杏苏散
- D.藿香正气散
- E.保和丸

答案：D

解析：此患儿泄泻辨证为风寒证，治以疏风散寒、化湿和中，方用藿香正气散加减。A用于风寒犯肺。B用于脾虚湿胜泄泻。C用于外感风寒证。E用于伤食泻。故本题选D。

547.(A2型题)67 患儿，男，3岁。腹泻2天，大便如蛋花汤样，泻下急迫，气味臭秽，食欲不振，发热烦躁，口渴，小便短黄，舌质红，苔黄腻，指纹紫。其证型是

- A.伤食泻
- B.寒湿泻
- C.风寒泻
- D.湿热泻
- E.脾虚泻

答案：D

解析：湿热之邪，蕴结肠胃气机，下注大肠，传化失司，故泻下稀如水样，气味秽臭。热性

急迫，湿热交蒸，壅遏胃肠气机，故泻下急迫，量多。湿热困脾胃，故纳差食少，神疲乏力。伴有外感，则有发热，热重于湿者，故口渴饮引。湿热在下，则小便短黄。故辨证为湿热泄泻。故本题选 D。

548.(A2 型题)69 患儿，男，6 岁。西医确诊为急性肾小球肾炎。病程第 9 日，症见肢体浮肿，尿少，咳嗽气急，喘息不得平卧，心悸，胸闷，口唇青紫，脉细无力。其证型是

- A.水气上凌心肺
- B.湿热内侵
- C.邪陷厥阴
- D.水毒内闭
- E.风水相搏

答案：A

解析：肾小球肾炎水气上凌心肺证症见肢体浮肿，经久不退，尿量减少，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治以润肺逐水，温阳扶正。方选己椒劳黄丸。故本题选 A。

549.(A2 型题)72 患儿，男，8 岁。因四肢关节游走性疼痛 2 周而就诊，现症见：膝及肘关节红肿疼痛，局部灼热，呈游走性，伴发热恶风，汗出不解，口渴欲饮，小便黄赤，大便秘结，舌质红，苔黄厚腻，脉滑数。其首选方剂是

- A.九味羌活汤
- B.大秦芎汤
- C.乌头汤
- D.宣痹汤
- E.独活寄生汤

答案：D

解析：患儿膝及肘关节红肿疼痛，局部灼热，呈游走性，故可初步诊断为风湿热。根据发热恶风，汗出不解，口渴欲饮，小便黄赤，大便秘结等表现可诊断其为湿热阻络型，治以清热利湿，祛风通络，方选宣痹汤。故本题选 D。

550.(A2 型题)76 患儿，男，7 岁。支气管哮喘急性发作。治疗应首选

- A.心得安(普萘洛尔)
- B.心得宁(普拉洛尔)
- C.心得乐(纳多洛尔)
- D.酚妥拉明
- E.异丙肾上腺素

答案：E

解析：支气管哮喘急性发作常用支气管舒张药（ β_2 受体激动剂、茶碱类、抗胆碱药物）、抗炎药（糖皮质激素等）。E 是 β_2 受体激动剂，能较快缓解支气管痉挛。A、B、C 均属于 β 受体阻断剂，会加重哮喘；D 属于 α 受体阻断剂，缓解支气管痉挛作用较弱。故本题选 E。

551.(A2 型题)79 患儿，男，5 个月，因多汗、易惊来诊。检查：精神、面色尚可，头发稀疏，有枕秃，前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，左顶部如按乒乓球感，血清钙 225mmol/L (9mg/dl)。其诊断是

- A.佝偻病初期
- B.佝偻病激期
- C.佝偻病恢复期

D.佝偻病后遗症期

E.脑积水

答案：B

解析：维生素D缺乏性佝偻病分为四期：初期临床表现为神经兴奋性增高(烦躁，睡眠不安，易惊，夜啼，多汗等症，并可致枕部脱发而见枕秃)。激期临床表现为骨骼变化①头部：乒乓球感，方颅、臀形颅，囟门较大且闭合延迟，乳牙萌出迟；②胸部：肋软骨串珠状，郝氏沟，肋下缘外翻，鸡胸，漏斗胸；③四肢：“手镯”及“脚镯”，“O”型或“X”型腿，长骨可发生青枝骨折；④脊柱：脊柱后凸或侧弯畸形，骨盆畸形。恢复期为临床症状、体征改善。后遗症期表现为重症患儿遗留骨骼畸形。此患儿有骨骼改变，诊断为激期。故本题选B。

552.(A2型题)82 患儿，女，2岁。体重9kg。纳呆，面色少华，性急易怒，大便干稀不调，舌质淡，苔薄微腻，指纹淡。其诊断是

A.厌食

B.疳气

C.疳积

D.干疳

E.积滞

答案：B

解析：根据患儿的临床表现可诊断为疳证。中医认为疳证分为疳气、疳积及干疳。疳气仅表现为面黄发疏，食欲欠佳，精神如常，形体略瘦，大便不调等脾胃不和之症；疳积则出现形体明显消瘦，肚腹膨隆，烦躁多啼等脾虚夹积症状；若出现全身肌肉消削，貌似老人，腹凹如舟，精神萎靡，即为干疳阶段。故此患儿可诊断为疳气。故本题选B。

553.(A2型题)86 患儿，男，7岁。发热半天，出皮疹2天。查体：患儿头皮及颜面、躯干、四肢均可见

A.麻疹见形期

B.风疹邪郁肺卫

C.幼儿急疹肺卫蕴热

D.猩红热邪侵肺卫

E.水痘风热轻证

答案：E

解析：水痘起病较急，可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状。在发病24小时内出现皮疹，迅即变为米粒至豌豆大的圆型紧张水疱，周围明显红晕，有水疱的中央呈脐窝状，水痘皮疹先发于躯干，逐渐波及头面部及四肢，呈向心性分布。根据患儿椭圆形疱疹，四周绕以红晕伴痒感的表现，可诊断为水痘，舌脉为风热轻证的表现。故本题选E。

554.(A2型题)89 患儿，男，4岁。咳嗽1周，痰多，色白而稀，喉间痰声辘辘，神乏困倦，胸闷纳呆。舌淡红，苔白腻，脉滑。其证型是

A.风寒咳嗽

B.风热咳嗽

C.痰湿咳嗽

D.痰热咳嗽

E.气虚咳嗽

答案：C

解析：湿生于脾，脾湿盛者，酿液成痰，贮阻肺络，故痰多。湿为阴邪，故痰白。痰阻气道，故喉间痰声辘辘。神乏困倦、胸闷纳呆、舌脉均为湿邪之象。故辨证为痰湿咳嗽。故本题选 C。

555.(A2 型题)92 患儿，男，1 岁。素不欲食，强迫进食则脘腹胀满，舌苔白腻，脉细缓。其诊断是

- A. 厌食，胃阴不足证
- B. 厌食，脾运失健证
- C. 厌食，脾胃气虚证
- D. 疳病，疳证
- E. 疳病，疳积

答案：C

解析：参见 91 题。故本题选 C。

556.(B 型题)97 新生儿的头围是

- A. 54cm
- B. 48cm
- C. 44cm
- D. 38cm
- E. 34cm

答案：E

解析：新生儿头围平均为 34 厘米。5 岁小儿胸围为其头围数加上岁数减 1。5 岁小儿头围为 50cm，加 4 为 54cm。

557.(B 型题)100 小儿实热证的脉象是

- A. 沉而有力
- B. 数而有力
- C. 数而无力
- D. 浮而无力
- E. 迟而有力

答案：B

解析：小儿实热证多表现为脉有力且快，即数而有力。虚热证则表现为脉无力且速率慢，即数而无力。A 是里实证的脉象。D 是表虚证的脉象。E 是寒实证的脉象。故 100 题选 B，101 题选 C。

558.(B 型题)104 咽-结膜热的主要病原体是

- A. 柯萨奇病毒
- B. 合胞病毒
- C. 轮状病毒
- D. 腺病毒
- E. 流感病毒

答案：D

解析：咽-结膜热的主要病原体是腺病毒 3、7 型所致，常发生于春夏季，以发热、咽炎、结膜炎为特征。80% 婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的，病毒性肠炎主要病原为轮状病毒，其次

为肠道病毒（包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒）。B可引起呼吸道合胞病毒肺炎。故104题选D，105题选C。

559.(B型题)108 小儿伤食泄泻的证候特点是

- A.大便稀薄，久泻不愈，面色萎黄，神疲倦怠，舌淡苔白，脉弱无力
- B.久泻不止，食入即泻，完谷不化，或见脱肛，舌淡苔白，脉弱
- C.腹痛胀满，痛则欲泻，噤腐厌食，大便馊臭，舌苔黄垢，脉滑实
- D.泄泻清稀，臭味不甚，常伴发热，鼻流清涕，舌苔薄白，脉浮紧
- E.泻下急迫，气味殊臭，肛门灼热，常伴口渴，舌苔黄腻，脉浮数

答案：C

解析：小儿伤食泄泻的证候特点为大便稀溏，夹有食物残渣，腹痛胀满，痛则欲泻，噤腐厌食，大便馊臭，夜卧不安，舌苔黄垢，脉滑实等。风寒泄泻的证候特点为泄泻清稀，夹有泡沫，臭味不甚，肠鸣腹痛，常伴发热，鼻流清涕，舌苔薄白，脉浮紧等。A是脾阳虚的证候特点。B是脾肾阳虚的证候特点。E是湿热泄泻的证候特点。故108题选C，109题选D。

560.(B型题)113 治疗急性肾小球肾炎湿热内侵型，应首选

- A.五苓散
- B.真武汤
- C.三妙丸合导赤散
- D.五味消毒饮合五皮饮
- E.麻黄连翘赤小豆汤

答案：C

解析：急性肾小球肾炎风水相搏证治以疏风宣肺、利水消肿，方用麻黄连翘赤小豆汤。湿热内侵型治以清热利湿、凉血止血，方用三妙丸合导赤散。A用于蓄水证。B用于阳虚水泛证。D用于寒湿内盛证。故112题选E，113题选C。

561.(B型题)117 哮喘缓解期的主要病机是

- A.外邪引动伏痰，痰阻气道
- B.感受外邪，肺气郁闭
- C.感受外邪，肺气失宣
- D.肺脾肾不足，痰饮内伏
- E.脾肾阳虚，肾不纳气

答案：D

解析：小儿哮喘发作必有留痰伏饮，受外邪而引发。发作时，痰随气升，气因痰阻，相互搏激，阻塞气道，气机升降不利，以致呼多吸少，气息喘促。哮喘缓解期的主要病机为肺虚皮毛不固，容易感冒及诱发哮喘；肾气失纳则动则气喘；脾虚则纳运不健，易痰饮上泛。故116题选A，117题选D。

562.(B型题)121 中医治疗过敏性紫癜湿热痹阻型的首选方是

- A.银翘散加减
- B.犀角地黄汤加减
- C.四妙散加味
- D.葛根黄芩黄连汤加味
- E.茜根散加减

答案：C

解析：治疗过敏性紫癜风热伤络型，治法以祛风清热，凉血安络，方选银翘散加减。治疗过敏性紫癜湿热痹阻型，治法以清热利湿，通络止痛，方选四妙散加减。故 120 题选 A，121 题选 C。

563.(B 型题)125 突然发热，一般情况好，热退疹出者，应首先考虑的是

- A.麻疹
- B.幼儿急疹
- C.猩红热
- D.水痘
- E.风疹

答案：B

解析：麻疹多在发热后 3~4 天出现皮疹。体温可突然升高至 40℃~40.5℃，热甚疹出。幼儿急疹骤起高热，而其他临床症状较轻，热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹。C 起病急骤，发热，体温一般 38℃~39℃，重者可达 40℃以上，婴幼儿起病时可能产生惊厥或谵妄，皮疹于 24 小时左右迅速出现。D 起病较急，可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状，在发病 24 小时内出现皮疹。E 通常于发热 1~2 天后出现皮疹，皮疹先从面颈部开始，在 24 小时蔓延到全身。故 124 题选 A，125 题选 B。

564.(B 型题)129 咳声重浊，痰黄者，应首先考虑的是

- A.外感暑热
- B.外感风热
- C.风湿犯肺
- D.外感风寒
- E.阴虚肺燥

答案：B

解析：咳声清扬，鼻流清涕者，考虑外感风寒。咳声重浊，痰黄者考虑为外感风热。A 多表现为咳声不扬，痰黏黄。C 多表现为咳嗽频频，喉中痰鸣。E 多表现为干咳无痰或痰少黏稠。故 128 题选 D，129 题选 B。

565.(A1 型题)3 阿托品用于麻醉前给药的主要目的是

- A.抑制呼吸道腺体分泌
- B.抑制排尿
- C.抑制排便
- D.防止心动过速
- E.消除紧张情绪

答案：A

解析：阿托品用于全身麻醉前给药，以减少呼吸道腺体分泌，防止吸入性肺炎发生。阿托品对胃肠平滑肌痉挛有明显解痉作用，而对膀胱逼尿肌有松弛作用，排除 B、C。阿托品可用于缓慢型心律失常的治疗，排除 D。故本题选 A。

566.(A1 型题)8 下列哪种情况不首选胰岛素

- A. II 型糖尿病患者经饮食治疗无效
- B. I 型糖尿病

- C.糖尿病并发严重感染
- D.妊娠糖尿病
- E.酮症酸中毒

答案：A

解析：胰岛素主要用于：I型糖尿病、继发性糖尿病；糖尿病合并严重急、慢性并发症；合并重症感染、心脑血管意外；手术；妊娠和分娩；降糖药治疗无效。而A中的II型糖尿病患者没有降糖药物的治疗。故本题选A。

567.(A1型题)12 可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物是

- A.阿托品
- B.毒扁豆碱
- C.毛果芸香碱
- D.新斯的明
- E.氯解磷定

答案：E

解析：胆碱酯酶复活药常用药物有氯解磷定、碘解磷定。故本题选E。

568.(A1型题)15 治疗军团菌病，应首选的药物是

- A.麦迪霉素
- B.红霉素
- C.土霉素
- D.多西环素
- E.四环素

答案：B

解析：在军团菌病、白喉带菌者、支原体肺炎、沙眼衣原体所致婴儿肺炎及结肠炎、弯曲杆菌所致败血症或肠炎中，红霉素列为首选。A、B同属大环内酯类，A主要用于革兰阳性菌感染，如金葡菌、链球菌及肺炎球菌等引起的上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、急性咽喉炎、中耳炎、尿路感染及皮肤软组织感染等，对多种红霉素耐药菌有效。C、D、E均为四环素类抗生素。C对多数革兰阳性菌、阴性菌、立克次体、沙眼衣原体、放线菌及螺旋体等都有效，对伤寒杆菌几乎无效。用于痢疾、斑疹伤寒、沙眼、结膜炎、肺炎、中耳炎、疔疮及皮肤化脓感染等。D、E主要用于治疗立克次体感染、斑疹伤寒、恙虫病、支原体引起的肺炎。故本题选B。

569.(B型题)19 上述各项，属抗精神分裂症药物的是

- A.氯丙嗪
- B.丙咪嗪
- C.碳酸锂
- D.地西洋
- E.利血平

答案：A

解析：丙咪嗪主要用于各型抑郁症治疗，对内源性、反应性及更年期抑郁症疗效较好，但对精神分裂症患者的抑郁症疗效较差。氯丙嗪主要用于各型精神分裂症，尤其对急性发作患者较好。碳酸锂对躁狂症有显著疗效。D有抗焦虑、镇静和催眠的作用。E主要用于高血压的治疗，有精神抑郁性疾病或病史、溃疡病病史、急性局限性肠炎、溃疡性结肠炎、帕金森综

合征者禁用。

570.(B型题)22 用于肝硬化门静脉高压致呕血的药物是

- A.多巴胺
- B.间羟胺
- C.肾上腺素
- D.去甲肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

答案：D

解析：去甲肾上腺素可用于上消化道出血如肝硬化门静脉高压致呕血，口服，收缩黏膜血管以止血。肾上腺素为治疗过敏性休克（心脏抑制、血压下降、呼吸困难）的首选药，激动 α 受体，收缩小动脉和毛细血管，降低通透性；激动 β_1 受体，改善心功能；激动 β_2 受体，缓解支气管痉挛和减少过敏介质释放。A、B主要用于治疗各种休克。E用于治疗支气管哮喘、房室传导阻滞、心脏骤停、休克。

571.(B型题)25 治疗心肌收缩力减弱、尿量减少而血容量已补足的休克，应首先考虑的药物是

- A.肾上腺素
- B.去甲肾上腺素
- C.异丙肾上腺素
- D.多巴胺
- E.麻黄碱

答案：D

解析：A为 α 和 β 受体激动药，可使心肌收缩力加强，心率增快，心排出量增加，适用于严重的急性过敏反应，特别是青霉素等引起的过敏性休克治疗。B主要应用于早期神经源性休克或药物引起的低血压。C主要适用于中心静脉压高、心排出量低的感染性休克。D主要用于感染性休克、心源性休克和出血性休克的治疗，对伴有心肌收缩力减弱及尿量减少而血容量已补足的患者疗效较好。E使心肌收缩力增强，心输出量增加，可用于因血管扩张引起的休克的治疗。

572.(B型题)28 治疗支原体肺炎，应首选

- A.青霉素
- B.氨苄青霉素
- C.新型青霉素II
- D.红霉素
- E.庆大霉素

答案：D

解析：治疗支原体肺炎首选大环内酯类药物，如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素等。治疗肺炎球菌肺炎首选青霉素类、第一代头孢菌素等。

573.(A1型题)3 下列疾病，为我国最常见的咯血原因是

- A.支气管扩张
- B.肺癌
- C.肺结核

- D.肺炎链球菌肺炎
- E.风湿性心脏病

答案：C

解析：肺结核是我国最常见的咯血原因。故本题选 C。

574.(A1 型题)7 下列属于颅脑疾病感染性抽搐的是

- A.外伤
- B.脑挫伤
- C.脑积水
- D.脑寄生虫
- E.神经胶质瘤

答案：D

解析：抽搐按症状性病因为分为颅脑疾病和全身性疾病。前者包括感染性（脑炎、脑膜炎、脑脓肿、脑寄生虫病等）与非感染性（外伤、肿瘤、血管疾病、癫痫及其他疾病），后者包括感染性（中毒性肺炎、中毒性菌痢、败血症、狂犬病、破伤风、小儿高热惊厥等）与非感染性（缺氧、中毒、心血管疾病、代谢障碍、物理损伤、癔症性抽搐及其他）。故本题选 D。

575.(A1 型题)11 胸骨角连接的部位是

- A.第一肋骨
- B.第二肋骨
- C.第三肋骨
- D.第四肋骨
- E.第五肋骨

答案：B

解析：胸骨角为胸骨柄与胸骨体的连接处，其两侧分别与左右第二肋软骨连接。故本题选 B。

576.(A1 型题)15 出现“三偏征”，常见的病变部位是

- A.内囊
- B.深皮质
- C.脑干
- D.脊髓
- E.基底节

答案：A

解析：因感觉、运动传导路都经过内囊，且内囊较窄，如有病变常表现为对侧半身感觉障碍及伴有偏瘫，即三偏征。故本题选 A。

577.(B 型题)24 消化性溃疡腹痛的特点是

- A.上腹部周期性、节律性疼痛
- B.右上腹持续疼痛
- C.转移性右下腹痛
- D.全腹剧痛
- E.上腹部周期性、无节律性疼痛

答案：A

解析：消化性溃疡疼痛以周期性、节律性、长期性上腹疼痛为特点，胃癌疼痛以右上腹持续

疼痛为特点。C 多为急性阑尾炎的疼痛特点。D 多为腹膜刺激征的表现。E 为慢性胃炎的疼痛特点。

578.(B 型题)28 肺部叩诊呈过清音的是

- A.肺气肿
- B.大量胸腔积液
- C.气胸
- D.支气管肺炎
- E.肺空洞

答案：A

解析：A 叩诊多呈过清音。B 叩诊呈实音或浊音。C 叩诊多呈鼓音。D 叩诊多见于浊音。E 鼓音、破壶音、空瓮音等。故 28 题题选 A，29 选 B。

579.(B 型题)33 坐骨神经痛应出现的是

- A.巴宾斯基征
- B.贡达征
- C.拉塞格征
- D.霍夫曼征
- E.布鲁津斯基征

答案：C

解析：脑膜刺激征为脑膜受激惹的体征，见于脑膜炎，同时并有颈强直、克尼格征和布鲁津斯基征。巴宾斯基征、贡达征、霍夫曼征见于椎体束损害。拉塞格征见于神经根受刺激，如坐骨神经痛等。

580.(B 型题)37 在右前斜位片上食管受压向后移位，提示

- A.左心室增大
- B.右心室增大
- C.左心房增大
- D.右心房增大
- E.以上都不是

答案：C

解析：左心室增大时，左侧位，心后间隙变窄甚至消失，心后下缘的食管前间隙消失。左心房增大时，食管向后受压移位；心右缘双弧形、心底部双心房影；心左缘可见左心耳突出；左主支气管受压抬高。

581.(B 型题)39X 线下见右下肺出现大片的浓密阴影，其内见一个含有液平面的圆形空洞，洞内壁光整，洞壁较厚。应首先考虑的是

- A.肺大泡
- B.肺脓肿
- C.浸润型肺结核空洞形成
- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.周围型肺癌空洞形成

答案：B

解析：厚壁空洞 X 线表现为空洞形状不规则的透光影，周围有密度高的实变区。内壁凹凸不

平或光滑整齐，多为新形成的空洞，见于肺脓肿、肺结核及肺癌。结核性空洞多无或含少量液体，而肺脓肿的空洞多有明显液面。癌瘤内形成的空洞其内壁多不规则，呈结节状。浸润性肺结核长期迁延未愈，可形成慢性纤维空洞型肺结核，表现为轮廓不光整规则，周围有较广泛的纤维索条影和散在的新老病灶。

582.(A1 型题)3 诊断病毒性肝炎最可靠的根据是

- A.发病季节
- B.起病方式
- C.症状及体征
- D.接触史
- E.病原学及肝功检查

答案：E

解析：根据临床资料、流行病学资料和实验室检查结果综合判断病毒性肝炎，但以病原体检查为主要标准。故本题选 E。

583.(A1 型题)7 流行性出血热的“三痛”是

- A.头痛、全身痛和腰痛
- B.头痛、关节痛和腰痛
- C.头痛、腓肠肌痛和腰痛
- D.头痛、眼眶痛和腰痛
- E.头痛、腹痛和腰痛

答案：D

解析：流行性出血热可表现为乏力、倦怠、头痛、腰痛、眼眶痛、皮肤和黏膜出血点，其中头痛、眼眶痛和腰痛称为“三痛”。故本题选 D。

584.(A1 型题)10 下列各项，不属艾滋病典型表现的是

- A.口咽念珠菌感染
- B.长期发热
- C.头痛，进行性痴呆
- D.皮肤黏膜出血
- E.慢性腹泻

答案：D

解析：艾滋病患者艾滋病期可出现发热，全身不适，头痛，恶心，肌痛，关节痛，淋巴结肿大，慢性腹泻，机会性感染如口咽念珠菌感染，神经系统症状如癫痫、进行性痴呆、下肢瘫痪等，卡波西肉瘤等。皮肤黏膜出血为流行性出血热的典型表现。故本题选 D。

585.(A1 型题)13 有关脑膜炎球菌的描述下列哪项是正确的

- A.革兰染色阳性，体外抵抗力很弱，能产生自溶酶
- B.特异性荚膜多糖抗原与其致病作用无关
- C.能产生毒力较强的外毒素
- D.目前我国流行株以 C 群为主
- E.与淋球菌一样也属奈瑟菌属

答案：E

解析：脑膜炎球菌属于脑膜炎奈瑟菌，革兰阴性双球菌，内毒素是致病重要因素，仅存于人

体，细胞内寄生，抵抗力弱，产生自溶酶，需要巧克力色血琼脂培养基培养。目前美国流行菌株以 C 群为主，B 群则在欧洲流行，我国和非洲以 A 群为流行菌株，但已有 B、C 群的出现及增多的趋势。故本题选 E。

586.(A1 型题)17 霍乱的典型表现是

- A.黏液脓血便
- B.四肢抽搐，顽固性呕吐
- C.皮肤黏膜出血点
- D.发热，盗汗
- E.腹泻，呕吐

答案：E

解析：霍乱的典型表现是剧烈腹泻、继之呕吐，无腹痛和里急后重，严重者出现脱水和周围循环衰竭。A 见于菌痢。故本题选 E。

587.(B 型题)19 感染 HBV 后出现保护性抗体的标志是

- A.HBsAg 阳性
- B.HBeAg 阳性
- C.抗-HBe 阳性
- D.抗-HBc 阳性
- E.抗-HBs 阳性

答案：E

解析：抗-HBs 是一种保护性抗体，在疾病恢复期出现，临床上作为判断急性乙型肝炎病人预后的指标。HBeAg 在血清中出现与 HBV-DNA 密切相关，是 HBV 活动性复制的标志。A 最早于 HBV 感染后 1~2 周，最迟 11~12 周出现于周围血中，在慢性感染和无症状携带者中可持续存在多年。C 出现提示病毒复制减少或终止。D 出现于 HBsAg 出现后 3~5 周，说明病毒感染处于窗口期，在“大三阳”组合中，它是 HBV 活动性复制的标志之一。

588.(B 型题)23 诊断伤寒常做的检查是

- A.血培养及肥达反应
- B.白细胞计数分类及粪便培养
- C.白细胞计数分类及尿常规
- D.脑脊液检查及白细胞计数
- E.白细胞计数及血涂片找病原体

答案：A

解析：伤寒的确诊标准是从血、骨髓、尿、粪便、玫瑰疹刮取物等任一种标本分离到伤寒杆菌；血清特异性抗体阳性，肥达氏反应“O”抗体凝集效价 $\geq 1:80$ ，“H”抗体凝集效价 $\geq 1:160$ ，恢复期效价增高 4 倍以上。怀疑流脑时首先应做脑脊液检查，若外观浑浊基本可以诊断。

589.(B 型题)26 感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

- A.志贺痢疾杆菌
- B.福氏痢疾杆菌
- C.宋内痢疾杆菌
- D.鲍氏痢疾杆菌

E.舒氏痢疾杆菌

答案：B

解析：痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属，革兰阴性杆菌，无鞭毛。目前分为A、B、C、D四群（分别是志贺、福氏、鲍氏和宋内痢疾杆菌）及47个不同的血清型。生存能力较强（D群>B群>A群）。感染后易转为慢性的是B群福氏痢疾杆菌。

590.(B型题)29 霍乱典型表现为

- A.发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B.发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C.腹泻，呕吐，水样大便，无发热，无腹痛
- D.发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E.低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

答案：C

解析：参见27~28题。

591.(B型题)32 血白细胞增多，异型淋巴细胞比例常高于10%，多见于

- A.伤寒
- B.中毒型菌痢
- C.流行性乙型脑炎
- D.急性病毒性肝炎
- E.流行性出血热

答案：E

解析：流行性出血热的血象特点为：①早期WBC增高，一般达 $(15\sim30)\times 10^9/L$ ，少数出现类白血病反应 $(50\sim200)\times 10^9/L$ 。②早期外周血中性粒细胞可略高，第二期后淋巴细胞比例升高。出现异常淋巴细胞有早期诊断意义，第一病日即可出现，一般10%~20%，部分可>30%。③发热后期、低血压期血红蛋白、红细胞明显升高血小板减少。B实验室检查主要是粪便检查，C主要是脑脊液检查，D主要是病原学检查。

592.(A1型题)1 撰写“医家五戒十要”的医家是

- A.李时珍
- B.陈实功
- C.孙思邈
- D.张仲景
- E.华佗

答案：B

解析：此题暂无解析

593.(A1型题)41976年美国学者提出的医患关系基本模式是

- A.主动-被动型，互相-合作型，平等参与型
- B.主动-合作型，相互-指导型，共同参与型
- C.主动-配合型，指导-合作型，共同参与型
- D.主动-被动型，指导-合作型，共同参与型
- E.主动-被动型，共同参与型，父权主义型

答案：D

解析：1976年美国学者提出的医患关系基本模式是主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。故本题选D。

594.(A1型题)7 下列各项，不符合道德要求的是

- A. 尽量为患者选择安全有效的药物
- B. 要严格遵守各种抗生素的用药规则，尽可能开患者要求的好药，贵重药物
- C. 在医疗过程中要为患者保守秘密
- D. 对婴幼儿、老年病人的用药应该谨慎，防止肾功能损害
- E. 钻研药理知识，防止粗疏和盲目用药

答案：B

解析：医学道德的范畴包括：①权利与义务；②情感与良心；③审慎与保密。保密是指医务人员在医疗活动中应当具有对医疗和护理保守秘密的职业道德，故不选C。

595.(A1型题)9 根据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念，不能确诊“脑死亡”的条件是

- A. 自主运动和自主呼吸消失
- B. 对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应
- C. 体温低于 32.2℃或服用中枢抑制药物者
- D. 脑电波平直或等电位
- E. 诱导反射消失

答案：C

解析：是指包括脑干在内的全脑功能丧失的不可逆转的状态。脑干是人体的生命中枢，它控制着人体呼吸、心跳、血压等重要功能。体温低于 32.2℃或服用中枢抑制药物者不属于脑死亡。故本题选C。

596.(B型题)11 概括医患关系内容的是

- A. 医患关系是一种民事法律关系
- B. 医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C. 医患关系是一种商家与消费者的关系
- D. 医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E. 医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案：E

解析：我国医患关系本质的是以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系。医患关系内容是以医务人员为一方，以患者及家属为一方，在诊断、治疗、护理过程中结成的人际关系。

597.(B型题)15 作为医学伦理学基本范畴的情感是指

- A. 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益
- B. 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C. 医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D. 医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E. 医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

答案：E

解析：医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福。A为权利，B为义务，D为荣誉与幸福。

598.(B型题)14 麻醉药品处方的保存期是

- A.6 个月
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年
- E.4 年

答案：D

解析：普通处方、急诊处方、儿科处方的保存期是 1 年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年，麻醉药品处方的保存期限为 3 年。

599.(B型题)18 各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

- A.在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B.承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C.对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D.承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E.对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案：B

解析：各级各类卫生防疫机构应承担 responsibility 范围内的传染病监测管理工作。各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作。

600.(B型题)22 国家鼓励开展中医药专家学术继承工作，培养高层次的中医临床人才和

- A.中药技术人才
- B.中医从业人员
- C.中医医疗机构
- D.中医药教育机构
- E.中医药科研机构

答案：A

解析：《中医药条例》第十五条规定：设立各类中医药教育机构应当符合国家规定的设置标准，并建立符合国家标准的临床教学基地。《中医药条例》第十六条规定：国家鼓励开展中医药专家学术经验和技术专长继承工作，培养高层次的中医临床人才和中药技术人才。