

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

临床助理医师精选300题

套卷二【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1/A2型题)诊断急性纤维蛋白性心包炎最具特征的体征是

- A.心界随体位改变
- B.心包摩擦音
- C.心音低钝
- D.奇脉
- E.颈静脉怒张,肝大

答案:B

解析:此题暂无解析

152.(A1/A2型题)急性心包炎与急性心肌梗死,下列哪一项是最主要的鉴别点

- A.心前区疼痛
- B.发热
- C.红细胞沉降率增快
- D.心电图示各导联(aVR除外)ST段弓背向下型抬高
- E.心包摩擦音

答案:E

解析:急性心包炎与急性心肌梗死均可有心前区疼痛、发热、红细胞沉降率增快,心电图ST段弓背向下型抬高,但是心包摩擦音为急性心包炎特征性体征。

153.(A1/A2型题)感染性休克救治时正确的是

- A.维持水平衡
- B.应用高效广谱抗生素
- C.禁止使用肾上腺皮质激素
- D.维持电解质平衡
- E.营养支持

答案:B

解析:此题暂无解析

154.(A1/A2型题)休克时应用血管活性药物的主要目的是

- A.提高心脏前负荷
- B.增加心脏后负荷
- C.增加心肌收缩力
- D.提高组织的血液灌流量
- E.降低组织代谢

答案:D

解析:此题暂无解析

155.(A1/A2型题)在治疗失血性休克中补充血容量时,最优越的晶体液为

- A.5%碳酸氢钠溶液
- B.5%葡萄糖盐水
- C.平衡盐溶液
- D.10%葡萄糖溶液
- E.5%葡萄糖溶液

答案:C

解析:此题暂无解析

156.(A1/A2型题)男,78岁,左下肢深静脉血栓病。准备行非手术治疗,哪项措施是不恰当的

- A.使用右旋糖酐、双嘧达莫等进行祛聚治疗
- B.抗凝治疗,使用肝素和华法林维持2个月左右
- C.卧床休息1周后,可给予尿激酶溶栓治疗
- D.卧床休息10天左右,抬高患肢
- E.起床活动时,穿弹力袜或用弹力绷带

答案:C

解析:此题暂无解析

157.(A1/A2型题)下肢静脉曲张,根据下列表现可以判断深浅静脉交通支瓣膜功能障碍的是

- A.胫前外侧出现皮肤营养性变化
- B.胫前内侧出现皮肤营养性变化
- C.胫前出现皮肤营养性变化
- D.足靴区出现皮肤营养性变化
- E.踝部出现皮肤营养性变化

答案:D

解析:单纯性下肢静脉曲张以大隐静脉曲张多见,主要临床表现为下肢浅静脉扩张、伸长、迂曲,如病程继续进展,当交通静脉瓣膜破坏后,可出现踝部轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化,包括皮肤萎缩、脱屑、瘙痒、色素沉着、皮肤和皮下组织硬结、湿疹和溃疡形成,故选D。

158.(A1/A2型题)正常摸到足背动脉搏动的位置在

- A.胫骨前肌腱的内侧
- B.内踝前方
- C.长伸肌腱的内侧
- D.趾长伸肌腱的外侧
- E.拇长伸肌腱的外侧

答案:E

解析:足背动脉在拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间(即拇长伸肌腱外侧,趾长伸肌腱内侧),越过距骨、足舟骨、第2楔骨背面,从短伸肌的下方穿过。在第1跖骨间隙近端分为第1跖背动脉和足底深动脉。

159.(A1/A2型题)食管癌的早期症状

- A.轻度的哽噎感
- B.胸背部疼痛
- C.反胃、反食
- D.进行性吞咽困难
- E.消瘦

答案:A

解析:早期食管癌的症状包括:吞咽时胸骨后烧灼感、针刺样或牵拉样痛,以咽下粗糙、过热或有刺激性食物时为著;咽下食物或饮水时,有食物通过缓慢并滞留的感觉,或有胸骨后紧缩感或异物附在食管壁上的感觉,食毕消失;轻度咽下哽噎感,时轻时重;咽部干燥和紧缩感,胸骨后闷胀等。

160.(A1/A2型题)不符合早期食管癌的描述是

- A.癌的直径小于2.0cm
- B.浸润深度不超过黏膜下层
- C.钡餐检查可有轻度局限性僵硬
- D.无明显临床症状
- E.无淋巴结转移

答案:A

解析:早期食管癌可分为0期和I期,前者病灶仅限于黏膜(原位癌),后者病变长度 ≤ 3 cm,侵及黏膜下层(早期浸润)但无淋巴结转移。

161.(A1/A2型题)女性,52岁。因类风湿性关节炎服用吲哚美辛治疗1个月。近3天解柏油样大便。无腹痛、恶心、呕吐。最可能的诊断为:

- A.急性糜烂出血性胃炎
- B.慢性浅表性胃炎
- C.慢性萎缩性胃炎
- D.消化性溃疡
- E.胃癌

答案:A

解析:此题暂无解析

162.(A1/A2型题)急性胃炎的主要临床表现是

- A.上腹痛
- B.明显反酸
- C.频繁呕吐、有宿食
- D.消瘦、贫血
- E.频繁腹泻

答案:A

解析:此题暂无解析

163.(A1/A2型题)慢性胃窦胃炎不宜使用的药物是

- A.胃复安
- B.制酸剂
- C.乙氧连氮
- D.生胃酮
- E.肾上腺皮质激素

答案:E

解析:此题暂无解析

164.(A1/A2型题)关于应激因素所致的急性胃黏膜病变的发病机制,下列哪项是不正确的

- A.肾上腺皮质激素增多,导致胃酸增多.黏液减少,黏膜细胞DNA合成不足
- B.肥大细胞释放5-羟色胺和组织胺
- C.胃壁细胞释放溶酶体
- D.十二指肠液反流直接损害胃黏膜屏障
- E.局部小静脉收缩,血流量减少,缺血缺氧

答案:D

解析:十二指肠液反流直接损害胃黏膜屏障是胆汁反流性胃炎(化学性胃炎)的病理改变。

165.(A1/A2型题)男,43岁,上腹部饱胀不适2年。胃液分析提示胃酸分泌降低。胃镜活检:胃窦黏膜萎缩, Hp(+),可见肠上皮化生和轻度不典型增生。可能的诊断为

- A.慢性浅表性胃炎
- B.癌前病变
- C.早期胃癌
- D.慢性萎缩性胃炎
- E.消化性溃疡

答案:D

解析:此题暂无解析

166.(A1/A2型题)治疗消化性溃疡,抑酸药中疗效最好是

- A.米索前列醇
- B.法莫替丁
- C.派吡氮平
- D.奥美拉唑
- E.丙谷胺

答案:D

解析:PPI作用于壁细胞胃酸分泌终末步骤中的关键酶—— H^+-K^+-ATP 酶,使其不可逆地失去活性,导致壁细胞内的 H^+ 不能转移至胃腔中而抑制胃酸分泌。因此PPI抑制胃酸分泌作用比 H_2RA 更强,且作用持久。

167.(A1/A2型题)有关胃泌素下列哪项是错误的

- A.刺激壁细胞分泌盐酸
- B.促进胃运动
- C.促进胃黏膜生长
- D.促进黏液细胞分泌黏液
- E.由G细胞释放

答案:D

解析:胃泌素是由胃幽门窦部黏膜内G细胞分泌的,主要生理作用是刺激胃底腺的壁细胞和主细胞分泌胃液、胃酸和胃蛋白酶。此外,还有促进食管下括约肌收缩及抑制小肠对盐和水的吸收作用。对胃黏膜上皮细胞的更新和生长也有作用,但不能促进黏液分泌。

168.(A1/A2型题)与胃酸分泌无关的因素是

- A.组胺
- B.乙酰胆碱
- C.胃泌素
- D.生长抑素
- E.胃蛋白酶

答案:E

解析:分泌H⁺的壁细胞表面有三种兴奋性受体——

组织胺(histamine)、胃泌素(gastrin)及乙酰胆碱(acetylcholine)受体,另有两种抑制性受体——生长抑素和前列腺素受体。

169.(A1/A2型题)女性,49岁,慢性上腹痛3年。近1个月来,胃泌酸功能检查减低,胃镜复查仍显示胃黏膜萎缩,但活检新发现有灶性胃黏膜细胞呈中至重度不典型增生。应考虑

- A.病情无变化
- B.癌前病变
- C.早期胃癌
- D.病情稳定
- E.恢复期

答案:B

解析:不典型增生属于癌前病变。

170.(A1/A2型题)男性,45岁,平素身体健康,近2个月出现上腹饱胀不适,偶有隐痛,伴食欲缺乏,近2天有黑粪,最有诊断意义的检查是

- A.腹部B超
- B.粪便隐血试验
- C.胃液分析
- D.X线钡餐检查
- E.胃镜+活检

答案:E

解析:患者为中年男性,近2个月来出现上腹部不适、隐痛,黑粪。从患者年龄、性别考虑,患者为胃癌高发人群,且有腹痛、黑粪等症状,强烈建议行胃镜+活检以排除胃癌。

171.(A1/A2型题)男性,42岁,2个月来乏力、尿少、腹胀,但胃口尚好,无腹泻,无肝炎史,无消化道出血史,有饮酒嗜好,每日黄酒2两共6年。查体:血浆白蛋白29g/L;HBsAg(+),B超示有少量腹水。应诊断为

- A.酒精性肝硬化
- B.隐源性肝硬化
- C.肝炎后肝硬化
- D.肝硬化代偿期
- E.肝炎后肝硬化失代偿期

答案:E

解析:HBsAg(+)乙型肝炎病毒重叠感染,通常为慢性活动性肝炎演变而来,称肝炎后肝硬化。血浆白蛋白29g/L和B超示有少量腹水为失代偿期(肝功能减退所致)

。

172.(A1/A2型题)在治疗肝硬化腹水时,如利尿过猛,尿量过多,最易诱发

- A.上消化道出血
- B.自发性腹膜炎
- C.急性肾衰竭
- D.肝性脑病
- E.代谢性酸中毒

答案:D

解析:在治疗肝硬化腹水时,如利尿过猛,尿量过多,引起低血钾,诱发肝性脑病

。

173.(A1/A2型题)男性,50岁,慢性肝病15年,呕血30ml,查体,巩膜轻度黄染,腹软无压痛,肝肋下未扪及移动性浊音阳性,最可能的诊断是

- A.胆道出血
- B.十二指肠溃疡出血
- C.胃癌出血
- D.食管静脉曲张破裂出血
- E.胃息肉出血

答案:D

解析:此题暂无解析

174.(A1/A2型题)女,43岁,12小时以来呕吐咖啡样物约1200ml。查体:脉搏128次/分,血压80/45mmHg,首要的处理为

- A.抗休克治疗
- B.上消化道造影
- C.气管插管术
- D.胃镜检查
- E.腹部B超

答案:A

解析:此题暂无解析

175.(A1/A2型题)给予肝性脑病患者肠道抗生素的主要目的是

- A.抑制肠道细菌生长
- B.减少真菌繁殖
- C.预防自发性腹膜炎
- D.预防肠道继发性感染
- E.消除细菌毒素

答案:A

解析:口服不易吸收的抗生素可以抑制肠道产尿素酶细菌的生长。

176.(A1/A2型题)口服乳果糖治疗肝性脑病的机制是

- A.分解为乳糖、果糖, NH_3 □
- B.乳果糖呈酸性, 增加氨排出
- C.乳果糖与 NH_3 结合
- D.促进胃肠运动, 排毒增加
- E.抑制肠菌生长和氨的形成与吸收

答案:E

解析:乳果糖口服后在结肠中被细菌分解为乳酸和醋酸, 使肠腔呈酸性, 不仅可以抑制肠道产尿素酶细菌的生长, 还可以减少氨的吸收, 并促进血液里氨向肠腔的弥散。

177.(A1/A2型题)原发性肝癌主要应鉴别的疾病是

- A.肝硬变
- B.慢性肝炎
- C.肝内胆管结石
- D.多囊肝
- E.肝肉瘤

答案:A

解析:此题暂无解析

178.(A1/A2型题)对肝癌最有诊断价值的辅助检查项

- A.自身抗体测定
- B.甲胎蛋白测定
- C.癌胚抗原测定
- D.谷丙转氨酶测定
- E.脂肪平衡试验

答案:B

解析:此题暂无解析

179.(A1/A2型题)胆囊结石反复诱发急性胆囊炎最可靠的治疗是

- A.抗生素治疗
- B.口服溶石剂
- C.口服中药排石汤
- D.手术切除胆囊
- E.碎石治疗

答案:D

解析:单纯性胆囊炎病人采用非手术或手术治疗均可。化脓性胆囊炎应尽早手术以防止穿孔。胆囊切除术适应证包括胆囊结石, 急、慢性胆囊炎, 胆囊息肉, 胆囊肿瘤等。所以胆囊结石反复诱发急性胆囊炎应首选胆囊切除术。故本题应选D。

180.(A1/A2型题)急性胆道感染常见的严重并发症不包括

- A.急性胰腺炎
- B.硬化性胆管炎
- C.胆道出血

D.感染性休克

E.肝脓肿

答案:B

解析:急性胆道感染的并发症有胆道出血、急性胰腺炎、胆管炎性狭窄、胆源性肝脓肿、感染性休克。硬化性胆管炎是一种原因不明的非细菌性胆管慢性炎性狭窄的病变。故急性胆道感染常见的严重并发症不包括硬化性胆管炎,所以,本题应选B。

181.(A1/A2型题)该病人若行B超检查,观察重点应是

A.胆囊结石的数量

B.胆囊壁的厚度

C.胆管壁的厚度

D.肝脏的大小

E.胆囊及胆管的大小

答案:E

解析:此题暂无解析

182.(B型题)急性胆囊炎疼痛是

A.阵发性绞痛

B.持续性疼痛

C.持续性疼痛阵发性加剧

D.持续闷胀痛

E.钻顶样绞痛

答案:C

解析:此题暂无解析

183.(A1/A2型题)黄疸患者合并肿大而无触痛的胆囊时,最可能是

A.肝癌

B.慢性胆囊炎、胆囊积水

C.胆囊颈部结石嵌顿

D.中下段胆管癌

E.胆总管下段结石

答案:D

解析:此为无痛性黄疸,是胆管癌的表现。

184.(B型题)Charcot三联征出现在

A.急性化脓性胆囊炎

B.AOSC

C.急性出血性坏死性胰腺炎

D.急性坏死性小肠炎

E.绞窄性小肠梗阻

答案:B

解析:此题暂无解析

185.(A1/A2型题)为预防急性胰腺炎的发生应注意哪项

- A.戒烟
- B.少食脂肪
- C.餐后剧烈运动
- D.戒酒及避免暴饮暴食
- E.避免精神紧张

答案:D

解析:酒精和暴饮暴食是最常见的胰腺炎诱因,预防急性胰腺炎应该戒酒及避免暴饮暴食。

186.(A1/A2型题)急性胰腺炎一般在起病后几个小时血清淀粉酶开始升高

- A.半小时内
- B.2小时
- C.6小时
- D.24小时
- E.48小时

答案:C

解析:此题暂无解析

187.(B型题)腹痛突然加剧,腹肌紧张,肝浊音界消失常见于

- A.溃疡穿孔
- B.急性胰腺炎
- C.胰头癌
- D.急性胆囊炎
- E.急性肠梗阻

答案:A

解析:此题暂无解析

188.(B型题) κ -ras基因第12号密码子的点突变可用于解释

- A.急性胆源性胰腺炎
- B.胰腺癌
- C.十二指肠球部溃疡
- D.慢性酒精性胰腺炎
- E.胃溃疡

答案:B

解析:此题暂无解析

189.(A1/A2型题)急性持续性疼痛阵发性加剧并休克,最可能的疾病是

- A.早期结肠癌
- B.绞窄性肠梗阻
- C.急性阑尾炎
- D.外伤性肝破裂
- E.急性单纯性肠梗阻

答案:B

解析:肠绞窄、坏死、穿孔和感染时,大量毒素被吸收,引起全身中毒反应、感染性休克、肾衰竭、呼吸衰竭乃至多器官衰竭综合征。

190.(A1/A2型题)肠套叠的三大典型症状是

- A.腹痛,发热,黄疸
- B.腹痛,发热,脓血便
- C.腹痛,血便,里急后重
- D.腹痛,血便,腹部肿块
- E.腹痛,腹部肿块,发热

答案:D

解析:急性肠套叠表现为腹痛、呕吐、血便及腹部包块;慢性肠套叠表现为阵发性腹痛,腹痛时上腹或脐周可触及肿块,不痛时腹部平坦柔软无包块,病程有时长达十余日,故选D。

191.(A1/A2型题)单纯性粘连肠梗阻手术指征是

- A.手术后早期粘连梗阻
- B.非手术治疗不见好转
- C.单纯性粘连性肠梗阻
- D.粘连不全肠梗阻
- E.广泛粘连,不全梗阻

答案:B

解析:此题暂无解析

192.(B型题)右上腹痛,向右肩放射

- A.阑尾周围脓肿
- B.阑尾炎并盆腔脓肿
- C.阑尾炎并发门静脉炎
- D.急性胆囊炎
- E.溃疡病急性穿孔

答案:D

解析:此题暂无解析

193.(A1/A2型题)结肠癌患者中血清CEA水平高于正常的约占

- A.30%
- B.40%
- C.50%
- D.60%
- E.100%

答案:D

解析:血清癌胚抗原(CEA)约60%的结肠癌病人高于正常值,但特异性不高。用于术后判断预后和复发有一定帮助。故选D。

194.(A1/A2型题)首选的诊断方法是

- A.血生化学检查

- B.纤维结肠镜检查
- C.腹部B超
- D.CEA检测
- E.X线检查

答案:B

解析:此题暂无解析

195.(B型题)Dukes分期A应是

- A.癌穿透浆膜
- B.癌限于黏膜及黏膜下层
- C.癌限于肠壁
- D.癌伴局部淋巴结转移
- E.癌伴远处转移

答案:C

解析:此题暂无解析

196.(A1/A2型题)(2013)女, 32岁。左下腹痛2个月。黄稀便, 每日3次。结肠镜示:直肠、乙状结肠糜烂及浅溃疡, 大范围充血、水肿。最可能的诊断是

- A.克罗恩病
- B.肠结核
- C.结肠癌
- D.慢性肠炎
- E.溃疡性结肠炎

答案:E

解析:此题暂无解析

197.(A1/A2型题)柳氮磺胺吡啶(SASP)治疗溃疡性结肠炎的机制是

- A.降低肠道酸度, 促使溃疡愈合
- B.抑制氧自由基形成, 能消除炎症
- C.促使肠上皮细胞再生
- D.抑菌作用
- E.肠粘膜保护作用

答案:B

解析:此题暂无解析

198.(B型题)严重的环形痔应行

- A.冷冻疗法
- B.痔切除术
- C.外痔剥离术
- D.注射疗法
- E.痔环形切除术

答案:E

解析:此题暂无解析

199.(A1/A2型题)排便时和便后肛门剧痛并带少量鲜血的病有

- A.肛管直肠周围脓肿
- B.直肠息肉
- C.肛裂
- D.混合痔
- E.血栓性外痔

答案:C

解析:此题暂无解析

200.(B型题)肛门突然出现黯紫色痛性肿块

- A.肛周脓肿
- B.混合痔
- C.血栓性外痔
- D.肛裂
- E.肛瘘

答案:C

解析:血栓性外痔是临床多发病,常因过食辛辣刺激食物,大便临厕努挣,肛周皮下静脉破裂,血液淤积皮下而成。临床常以患者自觉肛门肿胀、疼痛有异物感为主症,检查可见肛周或肛管皮下有葡萄状黯紫色肿物,有时伴表面轻度糜烂出血。故选C。

201.(A1/A2型题)下述关于肛瘘的描述中恰当的是

- A.肛瘘不与肛周皮肤相通
- B.肛瘘多为结核菌感染所致
- C.肛瘘主要侵犯直肠
- D.肛瘘最常见的类型是肛管括约肌间型
- E.肛瘘只能自愈

答案:D

解析:肛门瘘管简称肛瘘,是肛管直肠与肛门周围皮肤相通的感染性管道,其内口位于齿线附近,外口位于肛门周围皮肤上,长年不愈。肛管直肠瘘主要侵犯肛管,很少涉及直肠,故常称为肛瘘。肛瘘大多是非特异性感染,少数是结核性的。可以进行手术及非手术治疗。从临床治疗角度以肛瘘和括约肌的关系较重要,可分为:①括约肌间型——最常见;②经括约肌型;③括约肌上型——不常见;④括约肌外型——少见。故选D。

202.(B型题)低位肛瘘宜采用

- A.肛瘘切开术
- B.肛瘘挂线疗法
- C.肛瘘外口扩大术
- D.药物保留灌肠治疗
- E.肛瘘部分切开+肛瘘挂线术

答案:A

解析:瘻管切开术是将瘻管全部切开开放,靠肉芽组织生长使伤口愈合的方法。适用于低位肛瘻,因瘻管在外括约肌深部以下。切开后只损伤外括约肌皮下部和浅部,不会出现术后肛门失禁。故选A。

203.(A1/A2型题)患者男,54岁。肛门胀痛6天,为持续性痛,逐渐加重,排便和行走时出现剧痛,有里急后重感和排便困难,伴发热,全身不适。查体:T39.6°C,肛门左侧红肿,有明显压痛,肛诊:直肠左侧饱满,压痛(+),有波动感,实验室检查:WBC21×10⁹/L, N0.92。决定立即行切口引流术,最主要的依据是

- A.白细胞增高
- B.局部饱满有波动感
- C.有排便困难
- D.高热,全身症状
- E.行走时出现剧痛

答案:B

解析:根据题意,考虑诊断为直肠肛管周围脓肿,脓肿切开引流是治疗此病的主要方法,一旦诊断明确,即应切开引流。脓肿形成的指征为波动感,此时可穿刺引流。故选B。

204.(A1/A2型题)只有一个开口的病理性盲管称为

- A.窦道
- B.糜烂
- C.溃疡
- D.瘻管
- E.空洞

答案:A

解析:一个开口为窦道,两个开口相通称为瘻管。

205.(A1/A2型题)男,60岁,反复上腹痛3年,疼痛节律不明显,食欲差,体重下降。突发呕血3次,约1000ml,经积极治疗24小时,出血仍不止。血压为90/50mmHg,用下列哪种方法治疗为宜

- A.注射立止血
- B.法莫替丁静滴
- C.尽快手术治疗
- D.口服凝血酶
- E.去甲肾上腺素冰盐水灌注

答案:C

解析:此题暂无解析

206.(A1/A2型题)上消化道大出血最常见的原因是

- A.胃十二指肠溃疡
- B.门静脉高压症
- C.肝内局限性感染,肝脓肿及外伤
- D.出血性胃炎
- E.胃癌

答案:A

解析:此题暂无解析

207.(A1/A2型题)上消化道出血最常见的原因是

- A.肝硬化食管胃底静脉曲张破裂
- B.消化性溃疡
- C.急性糜烂出血性胃炎
- D.胃黏膜脱垂
- E.胃癌

答案:B

解析:引起上消化道出血的原因甚多,但以消化性溃疡最常见,其次为食管或胃底静脉曲张破裂,再次为急性胃黏膜病变,第四位是胃癌,故本题选B。

208.(A1/A2型题)女性20岁,3个月来低热、盗汗,腹痛、腹胀,巩膜无黄染,颈静脉无怒张.腹部移动性浊音(+),腹水比重1.020,蛋白定量40g/L.最可能诊断

- A.卵巢囊肿
- B.结核性腹膜炎
- C.肝硬化腹水
- D.缩窄性心包炎
- E.门静脉血栓形成

答案:B

解析:结核性腹膜炎多见于青壮年患者,有结核病史,发热原因不明2周以上,伴有腹痛、腹胀、腹水(少量腹水需借助B超检查)和(或)腹部肿块,腹部有压痛和(或)腹壁柔韧感,腹水为渗出液性质,以单个核细胞为主,一般细菌培养阴性,X线胃肠钡剂检查有肠粘连等征象,结核菌素皮肤试验呈强阳性。

209.(A1/A2型题)男,26岁,3个月来全腹胀,右上腹触及不易推动、边缘不整肿块,有压痛,近1个月低热,盗汗不明显,最大可能为

- A.胆囊肿大伴炎症
- B.肝结核
- C.结核性腹膜炎
- D.肾结核
- E.肾囊肿

答案:C

解析:此题暂无解析

210.(A1/A2型题)患者男,34岁。因低热、腹痛诊断为结核性腹膜炎,近日来呕吐,腹胀,未解大便。查体:肠鸣音亢进。最可能的并发症是

- A.肠梗阻
- B.肠穿孔
- C.中毒性肠麻痹
- D.肠出血
- E.盆腔脓肿

答案:A

解析:此题暂无解析

211.(A1/A2型题)女, 28岁, 近2个月来腹胀且腹围增大, 查体:移动性浊音阳性, 冲击诊可触及脐右下边界不清肿块。血沉40mm/h, 腹腔积液常规RivAltA试验(+), 细胞数 $600 \times 10^6/L$, 淋巴结细胞0.60, 癌细胞未查到, 最大可能的疾病是

- A.腹膜癌
- B.结核性腹膜炎渗出型
- C.结核性腹膜炎粘连型
- D.结核性腹膜炎混合型
- E.卵巢癌并腹膜转移

答案:D

解析:此题暂无解析

212.(A1/A2型题)腹膜炎典型的三联症是

- A.腹痛, 腹泻, 腹肌紧张
- B.压痛, 反跳痛, 腹肌紧张
- C.腹痛, 腹泻, 压痛
- D.压痛, 反跳痛, 腹部包块
- E.腹痛, 腹泻, 腹部包块

答案:B

解析:此题暂无解析

213.(A1/A2型题)急性弥漫性腹膜炎的体征, 下列哪项是错误的

- A.板状腹
- B.反跳痛
- C.腹部压痛
- D.移动浊音
- E.肠音活跃

答案:E

解析:此题暂无解析

214.(A1/A2型题)患者女, 54岁。诊断为急性坏疽性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎入院, 行阑尾切除术。术后第3天腹胀、腹痛、发热, 体温 $39^{\circ}C$, 大便4~6次/日, 呈水样。肛门有下坠感, 腹部有轻压痛, 未触及肿块。首先应考虑并发症是

- A.直肠穿孔
- B.阑尾残株炎
- C.门静脉炎
- D.急性肠炎
- E.盆腔脓肿

答案:E

解析:此题暂无解析

215.(B型题)盆腔脓肿的临床表现多为

- A.直肠、膀胱刺激症状

- B.发热、呃逆, 肩颈部痛
- C.腹痛、腹胀、腹部压痛并可扪及包块
- D.消化道出血
- E.膈下出现游离气体

答案:A

解析:此题暂无解析

216.(A1/A2型题)阴囊内肿物, 可触及上界, 不能扪及实质感辜丸, 透光试验阳性

- A.腹股沟斜疝
- B.隐睾
- C.交通性鞘膜积液
- D.辜丸鞘膜积液
- E.精索鞘膜积液

答案:D

解析:此题暂无解析

217.(A1/A2型题)患儿, 男性, 2岁。发现右腹股沟肿物两个月, 实质感, 可进入阴囊, 最佳处理方法为

- A.单纯高位结扎疝囊
- B.修补腹股沟管前壁
- C.修补腹股沟管后壁
- D.疝成形术
- E.采用非手术疗法

答案:E

解析:此题暂无解析

218.(B型题)嵌顿疝未及时解除导致疝内容物动脉血流减少, 最后导致完全阻断

- A.Littre疝
- B.Richter疝
- C.绞窄性疝
- D.难复性疝
- E.嵌顿性疝

答案:C

解析:疝内容物不能(或不能完全)回纳, 且无明显症状, 属难复性疝, 8题选D;嵌顿性疝内容物为Meckel憩室, 称Littre疝, 9题选A;疝内容物强行进入疝囊后不能回纳, 属嵌顿性疝, 10题选E;嵌顿性疝内容物为部分肠壁, 称Richter疝, 11题选B;嵌顿性疝进展恶化致血运障碍, 称绞窄性疝, 12题选C。

219.(A1/A2型题)腹部闭合性损伤剖腹探查手术时, 应最先探查

- A.肝、脾
- B.胃、十二指肠第一段
- C.盆腔器官
- D.胰腺
- E.结肠

答案:A

解析:此题暂无解析

220.(A1/A2型题)腹部闭合性损伤合并出血性休克的处理原则是

- A.急诊剖腹探查
- B.输血并给止血药
- C.积极抗休克同时剖腹探查
- D.积极抗休克,休克纠正后手术探查
- E.输血并给抗生素

答案:C

解析:此题暂无解析

221.(B型题)尿蛋白分子量多在60000~500000

- A.肾小球性蛋白尿
- B.组织性蛋白尿
- C.肾小管性蛋白尿
- D.溢出性蛋白尿
- E.分泌性蛋白尿

答案:A

解析:此题暂无解析

222.(B型题)微小病变病理特征是

- A.近曲小管上皮严重脂肪变性
- B.系膜细胞及系膜基质弥漫增生
- C.毛细血管袢广泛呈现双轨征
- D.基膜增厚
- E.毛细血管节段性硬化

答案:A

解析:此题暂无解析

223.(A1/A2型题)男性,25岁。感冒后1周发生全身水肿,伴尿少、血压增高。查:RB C+/HP,尿蛋白+++ ,定量检查为2.5g/24小时,SPA/GA34g/L, BUN10mmol/L, Cr180 μ mol/L。不支持下列哪种疾病

- A.慢性肾炎
- B.慢性肾炎急性发作
- C.肾病综合征
- D.急性肾炎
- E.急进性肾炎

答案:C

解析:诊断肾病综合征的必要条件有二:大量蛋白尿(尿蛋白3.5g/24小时以上)和低白蛋白血症(血白蛋白小于30g/L)。本例此两项指标均不符合,故肾病综合征可能不大。

224.(A1/A2型题)男性, 35岁, 诊断, 用泼尼松60mg/d, 2个月, 尿蛋白由++++减为±。近1周发生上腹痛、烧心。应如何处理

- A.停用泼尼松
- B.加用雷尼替丁
- C.改用环磷酰胺
- D.加用双嘧达莫
- E.改用吲哚美辛(消炎痛)

答案:B

解析:肾病综合征使用激素治疗有效, 近1周发生上腹痛、烧心, 考虑为激素使用的胃肠道副作用。此时不能停用激素, 而是要继续激素治疗, 同时使用抑制胃酸分泌的药物如雷尼替丁、奥美拉唑等。

225.(A1/A2型题)患者男, 14岁。因腰痛、发热、尿频、尿急、尿痛而求治。检查后诊断为大肠埃希菌所致的泌尿系感染, 应首选

- A.诺氟沙星
- B.红霉素
- C.青霉素
- D.一代头孢
- E.庆大霉素

答案:D

解析:泌尿系感染首选喹诺酮类抗生素, 但喹诺酮类抗生素不能用于18岁以下患者, 会影响骨骼发育, 苯唑西林适用于治疗产青霉素酶葡萄球菌感染, 红霉素及青霉素皆对大肠埃希菌无效, 只有一代头孢对大肠埃希菌有效。

226.(A1/A2型题)(2013)女, 25岁。妊娠7个月, 发热、腰痛伴恶心、呕吐、尿频、尿急、尿痛1天。查体:T38.5°C, 左肾区叩击痛阳性。血常规:WBC $11.9 \times 10^9/L$, N0.82。尿常规:RBC5~8/HP, WBC30~35/HP, 尿蛋白(±)。最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.急性胃肠炎
- D.急性胰腺炎
- E.急性膀胱炎

答案:B

解析:此题暂无解析

227.(A1/A2型题)女, 27岁, 农民。尿频、尿急、尿痛, 7-

8次/天, 加重时有终末血尿, 尿检查:红细胞、白细胞、脓细胞均满视野, 尿普通细菌培养无细菌生长, 尿路平片未见明显异常, 按膀胱炎治疗已半年未见好转。首先要考虑哪一种疾病

- A.慢性肾盂肾炎
- B.泌尿系结核
- C.间质性膀胱炎
- D.泌尿系肿瘤
- E.尿道炎

答案:B

解析:此题暂无解析

228.(A1/A2型题)男, 30岁, 顽固性膀胱刺激征, 用抗生素后症状无明显减轻。尿中有红白细胞, 3次尿培养阴性, 考虑诊断为

- A.膀胱炎
- B.泌尿系结核
- C.泌尿系结石
- D.肾盂肾炎
- E.膀胱异物

答案:B

解析:此题暂无解析

229.(A1/A2型题)患者男, 40岁。左腰部受伤后出现腰痛和镜下血尿, 生命体征稳定。应考虑诊断为

- A.肾挫伤
- B.肾部分裂伤
- C.肾盂裂伤
- D.肾实质全层裂伤
- E.以上都有可能

答案:A

解析:此题暂无解析

230.(B型题)肾部分切除术的适应证

- A.肾下极碎裂伤修补困难
- B.既往输尿管损伤, 伤侧肾积水, 大剂量IVU不显影, 肾图显示无功能
- C.肾蒂血管切割伤
- D.肾被膜裂伤
- E.肾实质深度裂伤, 破入肾盏肾盂

答案:A

解析:此题暂无解析

231.(B型题)感染性结石的性质是

- A.草酸盐结石
- B.尿酸结石
- C.混合型结石
- D.碳酸盐结石
- E.磷酸盐结石

答案:E

解析:尿路感染时尿基质增加, 使晶体粘附, 有些细菌如大肠杆菌能分解尿素产生氨, 使尿pH升高, 易形成磷酸镁铵结石。故选E。

232.(A1/A2型题)急性尿潴留病因中, 属于非机械性梗阻的是

- A.尿道结石
- B.外伤性高位截瘫
- C.尿道断裂

D.尿道肿瘤

E.尿道狭窄

答案:B

解析:此题暂无解析

233.(A1/A2型题)脑出血引起肾衰竭的原因是

A.肾小球坏死

B.肾后性肾衰竭

C.急性肾小管坏死

D.肾性肾衰竭

E.肾盂肾炎

答案:C

解析:脑出血引起血容量不足,可导致肾血流的低灌注状态,使肾小球滤过率不能维持正常而引起少尿。初时,肾实质并无损害,属功能性改变,若不及时处理,可使肾血流量进行性减少,发展为急性肾小管坏死,出现急性肾衰竭。

234.(A1/A2型题)急性肾衰竭少尿期最主要的电解质紊乱是

A.水中毒

B.高钾血症

C.高镁血症

D.低磷血症

E.低钙

答案:B

解析:此题暂无解析

235.(A1/A2型题)有助于排除肾衰竭,而支持脱水诊断的指标是

A.尿比重 \uparrow ,血浆比重 \downarrow

B.尿比重 \downarrow ,血浆比重 \uparrow

C.尿比重 \downarrow ,血浆比重 \downarrow

D.尿比重 \uparrow ,血浆比重 \uparrow

E.尿比重 \downarrow ,血浆比重正常

答案:D

解析:肾衰竭患者由于肾小球破坏,常有钠水潴留,血浆比重是降低的,而肾小管对尿液的浓缩功能下降,尿比重降低,因此尿比重 \uparrow ,血浆比重 \uparrow 有助于排除肾衰竭而支持脱水诊断,故选D。

236.(A1/A2型题)慢性肾衰竭进展过程中最早出现的临床表现常为

A.消化道症状

B.贫血

C.出血

D.反复感染

E.骨痛

答案:A

解析:本题各选项的症状均可见于慢性肾衰竭,但消化道症状常是最早出现及最常见的症状,早期常觉口中有异味及食欲下降,晚期可出现纳差、恶心呕吐、体重减轻等。病理检查可发现胃炎、消化道溃疡、出血等。故本题选A。

237.(A1/A2型题)前列腺增生症状与哪项无关

- A.梗阻的程度
- B.病变发展的速度
- C.合并膀胱炎症
- D.合并膀胱结石
- E.前列腺增生体积大小

答案:E

解析:早期为梗阻逐渐形成时,膀胱逼尿肌代偿性变厚且增生,以克服日见增加的尿道阻力。此时可能没有症状,症状的出现取决于梗阻的程度,病变发展的速度,以及是否合并感染和结石,而不在于前列腺本身的增生程度。

238.(A1/A2型题)前列腺增生症手术切除部位应是

- A.受压迫而狭窄的后尿道
- B.全部前列腺
- C.前列腺增生部分
- D.前列腺增生部分和前列腺外科包膜
- E.后尿道和精阜

答案:C

解析:此题暂无解析

239.(A1/A2型题)子宫动脉为

- A.髂外动脉后干分支
- B.髂外动脉前干分支
- C.髂总动脉分支
- D.髂内动脉前干分支
- E.髂内动脉后干分支

答案:D

解析:此题暂无解析

240.(A1/A2型题)有关肛提肌的描述,不恰当的是

- A.是骨盆底内层的肌肉
- B.肛提肌分为耻尾肌、髂尾肌和坐尾肌
- C.有加强盆底托力的作用
- D.有加强肛门括约肌的作用
- E.一旦损伤坐尾肌,可引起直肠膨出

答案:E

解析:此题暂无解析

241.(A1/A2型题)对于雌激素的生理作用,哪项是不恰当的

- A.促使子宫发育并使子宫收缩力增强

- B.加强输卵管节律性收缩的振幅
- C.有助于卵巢积储胆固醇
- D.促进钠与水的排泄
- E.促进钙质沉积

答案:D

解析:此题暂无解析

242.(A1/A2型题)对于卵巢激素下述哪项是不恰当的

- A.孕二醇是黄体酮的主要代谢产物
- B.雌激素是由卵泡膜细胞与颗粒细胞协同产生的
- C.雌三醇是雌二醇与雌酮的代谢产物
- D.孕激素是雄激素的前身,雄激素又是雌激素的前身
- E.女性雄激素只来源于卵巢门细胞

答案:E

解析:此题暂无解析

243.(A1/A2型题)首次产前检查最恰当的时期应是

- A.停经6周
- B.停经8周
- C.停经10周
- D.停经12周
- E.确诊早孕时

答案:E

解析:此题暂无解析

244.(A1/A2型题)产前检查至少应有几次

- A.8次
- B.9次
- C.10次
- D.11次
- E.12次

答案:B

解析:此题暂无解析

245.(A1/A2型题)关于分娩机制的概念中,下列哪项是恰当的

- A.俯屈:前囟位置下降最低
- B.内旋转:前囟转向母体前方
- C.仰伸:颊部紧贴胸部
- D.外旋转:胎头随肩胛的内旋转而外旋转以保持胎头与胎肩的垂直关系
- E.衔接:无论初产妇经产妇均在临产后衔接

答案:D

解析:此题暂无解析

246.(A1/A2型题)当决定行阴道手术助产时,为了确诊胎方位,应以哪条颅缝结合囟门检查做依据

- A.额缝
- B.冠状缝
- C.矢状缝
- D.人字缝
- E.颞缝

答案:C

解析:此题暂无解析

247.(A1/A2型题)下列正常分娩机转哪项是正确的

- A.衔接:无论初产妇、经产妇儿头均系于临产后衔接
- B.俯屈:大囟门下降位置最低
- C.内旋转:大囟门转向母体前方
- D.仰伸:颈部紧贴胸部
- E.外旋转:胎头随肩的内旋而外旋转

答案:E

解析:此题暂无解析

248.(A1/A2型题)对于阴道炎,下列恰当的是

- A.为预防恶性肿瘤的发生,老年妇女不能使用雌激素
- B.可应用广谱抗生素治疗复发性念珠菌阴道炎
- C.白色念珠菌耐热力强,煮沸1小时才可死亡
- D.阴道毛滴虫生活能力较强,在3~5°C下可生存21天
- E.悬滴法检查白带,发现的滴虫与白细胞大小相似

答案:D

解析:此题暂无解析

249.(A1/A2型题)急性盆腔炎中下列哪项感染常伴有脓肿

- A.大肠杆菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.乙型溶血性链球菌
- D.厌氧菌
- E.结核杆菌

答案:D

解析:此题暂无解析

250.(A1/A2型题)下面哪项不属于宫颈癌的术后并发症

- A.尿潴留
- B.淋巴囊肿
- C.感染
- D.心力衰竭
- E.输尿管瘘

答案:D

解析:此题暂无解析

251.(A1/A2型题)患者20岁,诊断为急性粒细胞性白血病M2型。治疗可選用

- A.DA方案
- B.VP方案
- C.VDP方案
- D.小剂量ArA-C
- E.马利兰或羟基脲

答案:A

解析:此题暂无解析

252.(A1/A2型题)过敏性紫癜的实验室检查中可出现异常的是

- A.PT延长
- B.APTT延长
- C.TT延长
- D.束臂试验
- E.CT延长

答案:D

解析:过敏性紫癜是一种血管因素异常引起的出血性疾病,血小板计数、出血时间(BT)、凝血时间(CT)、内外源性凝血途径筛查试验(PT、APTT)、凝血酶时间(TT)及血块收缩均正常,束臂试验可阳性。

253.(A1/A2型题)符合过敏性紫癜的实验室检查是

- A.血小板减少
- B.凝血酶时间延长
- C.凝血时间延长
- D.血块收缩不良
- E.毛细血管脆性试验阳性

答案:E

解析:此题暂无解析

254.(B型题)血管性血友病(vWD)

- A.自幼即有出血倾向,出血时间延长,血小板黏附性降低
- B.成人女性月经过多,出血时间延长,血小板数减少
- C.自幼外伤后关节肌肉出血,凝血时间延长
- D.儿童病毒感染后2周,发现皮肤黏膜出血,血小板数减少,出血时间延长
- E.皮肤黏膜出血伴有发热,肝脾淋巴结肿大,血小板数减少

答案:A

解析:此题暂无解析

255.(A1/A2型题)患者,女,38岁。因婚后3年不孕,伴月经稀少、继而闭经3个月就診。尿妊娠试验阴性。在常规体格检查时,哪一项检查最不可忽略

- A.双下肢是否水肿
- B.扁桃体是否肿大
- C.挤压双侧乳房是否有乳汁溢出

D.面肌叩击试验

E.皮肤划痕试验

答案:C

解析:催乳素瘤的典型表现是停经-

泌乳。该女性患者不孕,月经稀少,继而闭经,病史较长,有催乳素瘤的临床表现,应该挤压双侧乳房观察是否有乳汁溢出,以辅助诊断。双下肢是否水肿通常与心、肾、下肢静脉疾病相关;扁桃体肿大通常检查是否有扁桃体炎;面肌叩击试验可辅助甲旁减的诊断;皮肤划痕试验用于检查过敏性皮肤病。故选C。

256.(B型题)用甲状腺片治疗

A.Graves病,症状轻,年龄28岁

B.胸骨后甲状腺肿伴甲亢

C.地方性甲状腺肿

D.甲亢危象

E.碘甲亢

答案:C

解析:此题暂无解析

257.(A1/A2型题)MODY是指

A.线粒体tRNA^{Leu}(UUR)基因突变糖尿病

B.青年人中的成年发病型糖尿病

C.妊娠期糖尿病

D.空腹血糖过高

E.葡萄糖耐量减低

答案:B

解析:MODY英文全称为maturity-

onsetdiabetesoftheyoung,译文:青年人中的成年发病型糖尿病。故选B。

258.(A1/A2型题)头皮裂伤清创缝合时限允许放宽至

A.6小时

B.8小时

C.12小时

D.16小时

E.24小时

答案:E

解析:处理时应着重于检查有无颅骨和脑损伤,对头皮裂伤本身除按照压迫出血、清创缝合原则外,还须:①检查伤口深处有无骨折或碎骨片,如果发现有脑脊液或脑组织外溢,须按开放性脑损伤处理;②头皮血供丰富,其清创缝合时限允许放宽至24小时。故选E。

259.(A1/A2型题)男性60岁。2小时前与人争吵后突发头痛,吐咖啡色液体。查体:

血压190/120mmHg,深昏迷,双侧瞳孔小,四肢瘫,颈有阻力。四肢有阵发性强直出现,诊断为高血压性脑出血。出血部位可能为

A.内囊

- B.额叶
- C.小脑
- D.脑室
- E.枕叶

答案:D

解析:此题暂无解析

260.(A1/A2型题)患者男,64岁。6个月内出现3次突然不能言语,每次持续30分钟左右,第3次伴右侧肢体麻木,既往有房颤病史,神经系统检查正常。诊断考虑为

- A.癫痫小发作
- B.偏头痛
- C.颈椎病
- D.短暂性脑缺血发作
- E.顶叶肿瘤

答案:D

解析:短暂性脑缺血发作是指伴有局灶症状的短暂的脑血液循环障碍,以反复发作的短暂性失语、瘫痪或感觉障碍为特点,症状和体征在24小时内消失。每次发作持续数分钟,通常在30分钟内完全恢复,但常有反复发作。该患者有房颤病史,因此考虑短暂性脑缺血发作。故选D。

261.(A1/A2型题)患者女,30岁。曾患风湿性心内膜炎,近日发热,白细胞增高,皮肤黏膜有出血点,住院治疗,医嘱绝对卧床休息。今晨患者自行起床,突感头痛,呕吐,左下肢麻木,倒地死亡。该患者最可能的死因是

- A.肺炎
- B.脑出血
- C.肺动脉栓塞
- D.急性脊髓炎
- E.脑动脉栓塞

答案:E

解析:风湿性心内膜炎主要累及心瓣膜,病变以二尖瓣最多见。因患者自行起床导致栓子脱落后阻塞下肢深部静脉,出现左下肢麻木,继而阻塞肺动脉引起呼吸衰竭死亡。故选E。

262.(A1/A2型题)卒中伴发的精神障碍最常见是

- A.躁狂
- B.抑郁
- C.神经症
- D.视幻觉
- E.惊恐发作

答案:B

解析:此题暂无解析

263.(A1/A2型题)额叶肿瘤可出现的精神症状表现有

- A.反复发作,幻听、欣快等

- B.广泛性智能受损、情感障碍、人格改变
- C.失用、失写、失算、手指失认等
- D.原始性幻觉
- E.遗忘综合征

答案:B

解析:此题暂无解析

264.(A1/A2型题)下列关于嗜睡症的描述不正确的是

- A.临床表现白天睡眠过多。特别在安静或单调环境下,经常困乏嗜睡,并可不分场合甚至在需要十分清醒的情况下,也出现不同程度、不可抗拒的入睡
- B.过多的睡眠不是由于睡眠不足、药物、乙醇、躯体疾病所致,也不是某种精神障碍(如神经衰弱、抑郁症)症状的一部分
- C.过多的睡眠引起显著的痛苦或社交、职业或其他重要功能的受损
- D.常见的损害是认知和记忆功能障碍
- E.存在从唤醒到完全清醒的时间延长或睡眠中呼吸暂停;有时有发作性睡病的附加症状

答案:E

解析:此题暂无解析

265.(A1/A2型题)治疗失眠症比较有效、使用最多的药物是

- A.抗精神病药
- B.促脑代谢药
- C.抗抑郁药
- D.镇静催眠药
- E.情绪稳定剂

答案:D

解析:此题暂无解析

266.(A1/A2型题)男孩,3岁,右手被大人突然牵拉后,哭述右臂痛,活动受限。查体:右手拒绝取物,肘略屈,前臂略旋前,最可能的诊断为

- A.腕关节脱位
- B.前臂骺软骨损伤
- C.肘关节脱位
- D.桡骨小头半脱位
- E.肱骨骺损伤

答案:D

解析:此题暂无解析

267.(A1/A2型题)切割伤致示指末节掌侧约1cm×0.5cm皮肤缺损,皮下组织裸露,治疗应

- A.三角皮瓣移植
- B.游离周围皮肤予以覆盖
- C.鱼际皮瓣移植
- D.单纯缝合皮肤
- E.腹部皮瓣移植

答案:B

解析:此题暂无解析

268.(A1/A2型题)以下不是尺神经损伤表现的是

- A.Froment征
- B.手指内收、外展障碍
- C.手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍
- D.小指爪形手畸形
- E.拇指感觉消失

答案:E

解析:此题暂无解析

269.(A1/A2型题)患儿男,8岁。左膝肿痛,急剧加重,活动剧痛,伴有高热。检查左膝关节明显红、肿、热及压痛。X线片示关节间隙增宽,其诊断首先应考虑为

- A.膝关节结核
- B.风湿性关节炎
- C.类风湿性关节炎
- D.化脓性关节炎
- E.痛风性关节炎

答案:D

解析:化脓性关节炎为关节内化脓性感染,多见于儿童,好发于髋、膝关节。起病急骤,有寒战、高热等症状,甚至出现谵妄与昏迷,小儿惊厥多见。病变关节迅速出现疼痛和功能障碍,浅表的关节,如膝、肘和踝关节,局部红、肿、热、痛明显,关节常处于半屈曲位。X线检查早期只可见关节周围软组织肿胀的阴影,儿童病例可见关节间隙增宽。故选D。

270.(A3/A4型题)患者,男性,48岁。反复咳嗽、咳黄痰30余年,间断咯血4次。此次因咳嗽加重,发热入院。作为治疗支气管扩张的经验用药,下列药物可选用

- A.哌拉西林
- B.环丙沙星
- C.氨基糖苷类抗生素
- D.头孢他啶
- E.以上均可选用

答案:E

解析:此题暂无解析

271.(A3/A4型题)女性,18岁,3年来反复咳嗽,大量咳痰,1周前少量咯血,2天前出现高热。首先考虑的诊断是

- A.支气管扩张
- B.支气管内膜结核
- C.慢性阻塞性肺疾病
- D.先天性肺囊肿
- E.早期支气管肺癌

答案:A

解析:此题暂无解析

272.(A3/A4型题)男性, 26岁, 行胸腔穿刺抽液, 当抽取草黄色液体30ml时, 患者突感头晕、心悸, 脸色苍白, 四肢凉, 脉细弱。此时应立即给予的处理是

- A.胸腔穿刺抽气
- B.皮下注射0.1%肾上腺素
- C.停止抽液, 平卧观察血压
- D.高浓度吸氧
- E.静脉注射毛花苷丙

答案:C

解析:患者在行胸腔穿刺过程中突然出现休克样症状, 首先考虑为胸膜反应, 立即处理措施是停止抽液, 停止对胸膜的刺激即可。

273.(A3/A4型题)女, 30岁, 发热乏力1周, 呼吸困难2天。查体T38.4℃。右肺叩诊实音, 呼吸音消失选用下列哪种药物治疗方案

- A.雷米封+利福平+乙胺丁醇
- B.雷米封+乙胺丁醇+链霉素+强地松
- C.青霉素
- D.青霉素+丁胺卡那
- E.抗肿瘤化疗+免疫疗法

答案:B

解析:此题暂无解析

274.(A3/A4型题)男, 35岁。发热、胸痛1周。胸部X线片示右侧中等量胸腔积液。胸液常规检查示单核细胞比例为85%。给予患者异烟肼+利福平+吡嗪酰胺+乙胺丁醇抗结核治疗, 疗程一般应为

- A.6个月~9个月
- B.9个月~12个月
- C.12个月~18个月
- D.18个月~24个月
- E.3个月~6个月

答案:A

解析:此题暂无解析

275.(A3/A4型题)患者女性, 36岁, 间断反复发热2个月, 既往有风心病史5年, 查体:胸骨左缘第4肋间闻及乐音样杂音, 心尖部闻及全收缩期吹风样高调一贯型杂音, 向左腋下传导。下列哪项检查对明确诊断最重要

- A.心脏正常的吸毒者
- B.肺源性心脏病
- C.先心病室间隔缺损
- D.肺源性心脏病-
- E.风湿性瓣膜病

答案:E

解析:此题暂无解析

276.(A3/A4型题)女性, 32岁。反复发热在 $37.5\sim 38^{\circ}\text{C}$ 1个月, 伴关节肌肉酸痛就诊。体检:轻度贫血, 心界不大, 心率90次/分, 心尖有收缩期吹风样III级杂音, 并有收缩中期喀喇音。诊断为风湿性心脏病, 二尖瓣关闭不全、发热待查本例拟给予心内膜炎诊断性治疗, 对抗生素反应良好, 5天后体温降至正常。此时抗生素应用疗程是

- A.体温正常后3天可停用抗生素
- B.2周
- C.5个月
- D.4~8周
- E.10个月

答案:D

解析:此题暂无解析

277.(A3/A4型题)女性, 32岁。因不明原因发热两周来院门诊, 体检:心脏有杂音。拟诊感染性心内膜炎感染性心内膜炎最常发生于下列哪种情况

- A.心脏正常的吸毒者
- B.肺源性心脏病
- C.先心病室间隔缺损
- D.肺源性心脏病-
- E.风湿性瓣膜病

答案:E

解析:此题暂无解析

278.(A3/A4型题)男性, 30岁。原有风心病史, 因持续性发热、乏力、食欲差2周来诊。经检查拟诊为亚急性感染性心内膜炎体检时下列哪个体征不可能出现

- A.环形红斑
- B.淤点
- C.心脏杂音无变化
- D.心率40次/分, 心电图示III度房室传导阻滞
- E.脾肿大伴脾区摩擦音

答案:A

解析:此题暂无解析

279.(A3/A4型题)男, 14岁, 心悸、气短10天。患者在3周前有发热、咽痛病史, 体格检查心界向左下扩大, 心音低钝, 心电图是窦性心动过速、频发室性期前收缩。应首选下列哪项检查

- A.心肌活检
- B.心肌标记物
- C.血清病毒中和抗体
- D.X线检查
- E.血沉

答案:C

解析:此题暂无解析

280.(A3/A4型题)男性, 31岁, 转移性右下腹痛24小时, 伴恶心、呕吐、发热, 体温38.5°C, 脉搏88次/分, 右下腹压痛、反跳痛、肌紧张。血白细胞 $13 \times 10^9/L$, 中性比86%, 尿常规白细胞1~2/HP, 红细胞2~3/HP。该患者最可能的诊断是

- A.急性胆囊炎
- B.消化性溃疡穿孔
- C.急性胰腺炎
- D.急性化脓性阑尾炎
- E.急性肠梗阻

答案:D

解析:题干中给出肺部症状和体征, 且有右心衰表现, 首先考虑肺心病。故选E。

281.(A3/A4型题)女, 44岁, 因阑尾炎穿孔弥漫性腹膜炎行阑尾切除及腹腔引流术, 术后10天, 仍发热39°C, 伴恶心、腹胀, 黏液便数次及里急后重。经检查确诊已有脓液, 除支持治疗及应用抗生素外, 还需采用

- A.腹部理疗
- B.经腹手术, 脓肿引流
- C.经麦氏切口行腹腔引流
- D.温盐水保留灌肠
- E.经直肠脓肿引流

答案:E

解析:此题暂无解析

282.(A3/A4型题)男性, 46岁, 大便带血1年, 血色鲜红, 便中滴鲜血, 患者自诉在便秘或饮酒后便血更甚, 有头昏和贫血, 但无疼痛不适, 肛门外观有皮赘。如肛门镜检查确诊为第II期内痔出血, 经纤维结肠镜检查除外大肠肿瘤, 则最佳治疗方案是

- A.手术切除
- B.行内痔核硬化剂治疗
- C.服用轻泻药, 保持大便通畅
- D.减少饮酒及进食刺激性食物
- E.采用高锰酸钾每天坐浴

答案:B

解析:此题暂无解析

283.(A3/A4型题)男性, 25岁, 下船时, 会阴部骑跨在船沿上, 立即出现尿道口滴血, 之后不能排尿, 发生尿潴留, 体检发现, 会阴部、阴茎和阴囊明显肿胀。该患者术后3周, 拔导尿管后能自行排尿, 但不久出现手术切口处肿痛, 逐渐出现会阴部伤口漏尿, 考虑最可能原因

- A.吻合口愈合不佳
- B.术后伤口感染致尿瘘
- C.尿道吻合口远端狭窄
- D.尿路感染
- E.合并尿道直肠瘘

答案:B

解析:此题暂无解析

284.(A3/A4型题)男, 22岁, 汽车挤压下腹部后2小时, 因下腹部疼痛, 有尿意, 不能排尿就诊。查体:血压115/70mmHg, 心率78次/分。X线片显示耻骨支骨折, 导尿管不能插入膀胱。以下检查中最有价值的体检是

- A.肛门指诊检查前列腺
- B.下肢轴心叩击痛
- C.下腹压痛反跳痛
- D.肠鸣音听诊
- E.骨盆分离挤压试验

答案:A

解析:此题暂无解析

285.(A3/A4型题)男, 67岁, 进行性排尿困难3年, 间断性排尿中断5天。KUB膀胱区有直径3.0cm圆形致密影。确诊最有价值的辅助检查是

- A.MRI
- B.IVP
- C.CT
- D.膀胱镜
- E.侧位腹平片

答案:D

解析:此题暂无解析

286.(A3/A4型题)男性, 38岁, 左侧腰胀痛2年, 当地医院检查发现为左侧肾占位性病变, 发病以来无血尿及膀胱刺激症状。下列检查中, 该患者最不可能出现的情况是

- A.血钙增高
- B.红细胞计数增多
- C.血沉增快
- D.尿脱落细胞检查发现肿瘤细胞
- E.尿常规检查正常

答案:D

解析:此题暂无解析

287.(A3/A4型题)女, 56岁, 间歇无痛肉眼血尿3个月余。查体未发现异常。B超检查提示右肾中下部有一个直径3.5cm低回声肿物。其诊断最可能是

- A.肾细胞癌
- B.肾盂癌
- C.肾囊肿
- D.肾错构瘤
- E.肾母细胞瘤

答案:A

解析:此题暂无解析

288.(A3/A4型题)女, 56岁, 间歇性肉眼血尿伴有排血块3个月来门诊。B超示双肾未见异常, 膀胱内左侧有一约4.5cm×4cm, 低回声团块, B超怀疑膀胱肿瘤。该病

人的预后怎样

- A.容易在膀胱内有癌的再发
- B.很快就会发生淋巴或血行转移
- C.不会发生转移或复发
- D.发生尿道癌的可能性很大
- E.发生肾盂或输尿管癌的几率很高

答案:A

解析:此题暂无解析

289.(A3/A4型题)患者女, 24岁。7天来全身皮肤出现瘀点伴牙龈出血来诊。化验:PLT $35\times 10^9/L$, 临床诊断为慢性特发性血小板减少性紫癜(ITP)。该患者的首选治疗是

- A.糖皮质激素
- B.脾切除
- C.血小板输注
- D.长春新碱
- E.抗生素

答案:A

解析:该年轻女性患者患特发性血小板减少性紫癜(ITP), 支持诊断的体征是脾脏不大。若脾脏增大则多为继发性的。ITP患者皮肤可有紫癜, 但不会高出皮面, 关节出血和下肢肌肉血肿是凝血功能障碍所致的出血, 而不是ITP血小板减少引起出血的特点。口腔溃疡见于系统性红斑狼疮等自身免疫病引起的血小板减少, 也不支持ITP的诊断。ITP患者大量血小板被破坏, 导致骨髓中巨核细胞代偿性增多, 首选糖皮质激素治疗。

290.(A3/A4型题)女, 25岁, 因骑自行车不慎被汽车撞伤右胸部, 在急诊室行闭式胸膜腔引流术, 当即引流出血性液体500ml, 经快速输血输液后, 第一小时仍有血性引流液210ml。应考虑的诊断是

- A.少量血胸
- B.中量血胸
- C.大量血胸
- D.血气胸
- E.进行性血胸

答案:B

解析:此题暂无解析

291.(A3/A4型题)男, 14岁, 心悸、气短10天。患者在3周前有发热、咽痛病史, 体格检查心界向左下扩大, 心音低钝, 心电图是窦性心动过速、频发室性期前收缩。应首选下列哪项检查

- A.心肌活检
- B.心肌标记物
- C.血清病毒中和抗体
- D.X线检查
- E.血沉

答案:C

解析:此题暂无解析

292.(A3/A4型题)患者女, 45岁。间歇性发作咽下困难3个月, 伴反酸、烧心, 可因情绪波动诱发。食管造影未见异常。治疗最有效的药物是

- A.PPI
- B.H₂受体拮抗剂
- C.胃黏膜保护剂
- D.促动力剂
- E.抗酸剂

答案:A

解析:胃食管反流病的有效治疗药物是H₂受体拮抗剂或质子泵抑制剂, 但维持治疗质子泵抑制剂最有效。故选A。

293.(A3/A4型题)患者男, 64岁。右上腹剧痛17天, 伴发热10天。乙肝病史20年, 慢性支气管炎病史8年。查体:T38.3°C, 慢性病容, 颈静脉无怒张, 双肺呼吸音减弱, 未闻及湿啰音, 腹膨隆, 肝右肋下4cm, 双下肢凹陷性水肿。肝功能检查正常。该患者肝大最可能的原因是

- A.右心功能不全
- B.淋巴瘤
- C.胆道感染
- D.肝脓肿
- E.胃癌

答案:D

解析:此题暂无解析

294.(A3/A4型题)患者男, 64岁。右上腹剧痛17天, 伴发热10天。乙肝病史20年, 慢性支气管炎病史8年。查体:T38.3°C, 慢性病容, 颈静脉无怒张, 双肺呼吸音减弱, 未闻及湿啰音, 腹膨隆, 肝右肋下4cm, 双下肢凹陷性水肿。肝功能检查正常。下列检查对明确诊断意义不大的是

- A.血清AFP
- B.腹部CT
- C.腹部B型超声
- D.血乙肝病毒DNA
- E.肝穿刺活检

答案:D

解析:此题暂无解析

295.(A3/A4型题)女性, 24岁, 咽痛后2周出现肉眼血尿, 血压150/100mmHg, 尿蛋白(+++), 尿红细胞满视野, WBC8~10个/HP, 血肌酐180μmol/L。该患者的治疗, 下列不妥的是

- A.控制血压
- B.消肿
- C.低盐饮食
- D.抗生素
- E.补充白蛋白

答案:E

解析:由于此病是自限性疾病,故治疗以对症为主,包括卧床休息、低盐饮食、消肿、降血压等,对于有扁桃体等感染灶者可应用抗生素治疗,但不宜输注白蛋白,因为虽然由于尿蛋白而血白蛋白水平降低,但为一过性,该病多1~4周内好转,故没有必要补充白蛋白,故本题选E。

296.(A1/A2型题)患者女,24岁,咽痛2周后出现肉眼血尿,尿RBC满视野,尿蛋白定量0.9g/d,肾功能及血压正常,查ANA(-)。最可能的诊断是

- A.急进性肾小球肾炎
- B.隐匿性肾小球肾炎
- C.慢性肾小球肾炎
- D.急性肾小球肾炎
- E.IgA肾病

答案:D

解析:根据患者的临床表现与实验室检查(腹泻2天,为水样便带少量粘液,量多,日十余次,相继呕吐数次。无发热、无腹痛。腓肠肌痉挛。体检:体温36.8℃,神志清,皮肤弹性差,脉细速,血压70/30mmHg。化验检查:大便镜检白细胞0~2/HP,血红蛋白160pdL,血白细胞计数 $12 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.78,淋巴细胞0.12,单核细胞0.10),与霍乱的表现较为符合,故此题选D正确。

297.(A3/A4型题)患者男,48岁。间歇性水肿十余年,伴恶心、呕吐2周。查血红蛋白70g/L,血压20.7/14.7kPa(155/110mmHg),尿蛋白(++),颗粒管型2~4/HP,尿比重1.010~1.012。可能的诊断是

- A.肝炎后肝硬化
- B.原发性高血压
- C.慢性肾盂肾炎
- D.慢性肾小球肾炎
- E.急性肾炎综合征

答案:D

解析:此题暂无解析

298.(A3/A4型题)患者女,38岁。间歇性水肿十余年,伴恶心、呕吐3周。血压155/110mmHg。血常规Hb70g/L。尿常规:尿蛋白(++),颗粒管型2~3/HP。血Cr $485 \mu\text{mol}/L$ 。判断上述患者是否为慢性肾功能不全应首选的检查是

- A.肾穿刺
- B.静脉肾盂造影
- C.肾脏CT
- D.肾脏血管造影
- E.肾脏B超

答案:E

解析:此题暂无解析

299.(A3/A4型题)某产妇,会阴侧切术后5天,阴道出血不多,自觉会阴胀痛,发热,检查见局部红肿、硬结,体温38.2℃。此时考虑诊断为

- A.会阴伤口血肿

- B.子宫内膜炎
- C.会阴侧切伤口感染
- D.上呼吸道感染
- E.阴道壁血肿

答案:C

解析:此题暂无解析

300.(A3/A4型题)患者女性,50岁,掌指和腕关节反复肿痛2年余,近1个月病情加重,晨起时出现关节僵硬,活动后可缓解。最有助于确定诊断的辅助检查是

- A.抗核抗体
- B.血沉
- C.血C反应蛋白
- D.影像学检查
- E.血抗链球菌溶血素"O"测定

答案:D

解析:此题暂无解析