

2023 年护士执业资格考试



入学测试卷

参考答案及解析

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

金英杰医学教育研究院编

专业实务-答案及解析

1. 【答案】B

【解析】炎症早期用冷能通过降低细胞的代谢和降低微生物的活力控制炎症扩散；炎症后期用热可以通过增强白细胞的吞噬能力促进炎症的消散。

2. 【答案】B

【解析】医护合作性问题是指由护士与医生共同合作才能解决的问题。护士一般在当中承担及时观察病情，配合治疗抢救的职责。

3. 【答案】E

【解析】老人皮肤可变软、变薄，光泽减退，弹性减少，干燥起皱，出现色素沉着或色素减退斑等。如皮肤有硬结属于病理状态，需进一步检查。

4. 【答案】B

【解析】促胃动力药如多潘立酮、硫糖铝应餐前1小时服用。胶体铋剂餐前半小时服用，甲硝唑餐后半小时服用，抗酸药、氢氧化铝凝胶餐后1小时服用。

5. 【答案】A

【解析】护士正确坐姿：坐在椅子前部的1/2~2/3，上半身挺直、抬头、下颌微收，目光平视，两腿、两脚并拢，双手交叉相握于腹前。

6. 【答案】B

【解析】静脉留置针应使用肝素稀释液正压封管。如肝素的量不够、推注肝素时速度过快、患者肢体活动过度均会导致静脉内压力过高，可导致血液反流而堵塞导管。

7. 【答案】D

【解析】开放式提问是指提出比较概括、广泛、范围较大的问题，对回答的内容限制不严格，给对方以充分自由发挥的余地。

8. 【答案】E

【解析】类风湿关节炎是一种自身免疫性疾病，基本病变是导致滑膜炎，也可出现肺部、心脏、神经系统、肾、血液系统和干燥综合征等多脏器受损的表现。

9. 【答案】A

【解析】应对艾滋病人采取保护性隔离，不应歧视或身体约束。

10. 【答案】D

【解析】儿童生长发育是一个连续的过程，但各年龄段生长发育的速度不同，生后6个月内生长最快，特别是前3个月，出现生后第一个生长高峰，至青春期生长发育速度又加快，出现第二个生长高峰。各系统器官发育快慢不同，神经系统发育先快后慢，生殖系统发育先慢后快。生长发育遵循由上到下、由近至远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的顺序，但有一定的个体差异。

11. 【答案】D

【解析】脑死亡的判断标准：不可逆的深度昏迷；自发呼吸停止；脑干反射消失；脑电波平直。瞳孔散大而固定属临床死亡期。

12. 【答案】C

【解析】s. o. s. 为临时备用医嘱：仅在医生下达医嘱后12小时内有效，必要时用，只执行一次，过时或尚未执行即失效。

13. 【答案】B

【解析】冠状动脉粥样硬化好发部位是左冠状动脉前降支，主要供应左心室前壁中下部、室间隔的前2/3。因此，心肌梗死的最常见部位是左心室前壁。

14. 【答案】C

【解析】测量血压的正确方法是测量前安静休息 20~30 分钟，测量时将肱动脉、心脏处于同一水平，袖带松紧以一指为宜，打气至肱动脉搏动音消失，使水银柱再上升 20~30 mmHg，放气速度以 4 mmHg/s 为宜。

15. 【答案】A

16. 【答案】C

17. 【答案】B

【解析】对于抑郁症患者的护理要加强心理护理，建立良好的治疗性护患关系，鼓励其诉说自己感受的痛苦想法，帮助其分析、认识精神症状，而不是强行命令其怎样，或者如果你不怎样，将会产生什么后果。

18. 【答案】E

19. 【答案】E

【解析】卡介苗与其他抗癌药物不同，不是直接杀伤癌细胞，卡介苗与膀胱肿瘤有相同的抗原，通过激活病人体内的单核巨噬细胞系统，增加淋巴细胞的细胞毒作用和产生抗肿瘤抗体，使之有针对性地破坏肿瘤组织，手术后用卡介苗膀胱灌注，是治疗和预防膀胱癌复发的有效办法。

20. 【答案】D

【解析】钠盐可以导致水钠潴留，尿量减少。

21. 【答案】C

22. 【答案】C

【解析】护士有获得疾病诊疗、护理相关信息的权利，有获得履行护理职责相关的权利，可以对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议。

23. 【答案】D

【解析】抗厌氧菌感染的首选药物是甲硝唑。

24. 【答案】B

【解析】滴虫阴道炎多由于感染阴道毛滴虫导致，而且通常是性交传染，因此对于性伴侣，要求同时治疗；阴道毛滴虫通常在月经干净后容易繁殖，因此应连续治疗三次阴性方为治愈，对于滴虫性阴道炎的治疗选择含有甲硝唑的药物，未婚者可口服，但对于哺乳者因甲硝唑可通过乳汁分泌而供给胎儿，因此应慎用。

25. 【答案】A

【解析】本题是考查《侵权责任法》中对病人隐私的保护，医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私保密，未经患者许可而允许学生观摩属于侵犯患者的隐私权。

26. 【答案】A

27. 【答案】B

【解析】《献血法》规定，负责组织献血工作的机构是地方各级采供血机构。

28. 【答案】B

【解析】妊娠 12 周末，宫底位于耻骨联合上 2~3 横指；妊娠 16 周末，位于脐耻之间；妊娠 20 周末，位于脐下 1 横指；24 周末，位于脐上 1 横指；28 周末，位于脐上 3 横指；32 周末，位于脐与剑突之间；36 周末，位于剑突下 2 横指；40 周末，位于脐与剑突之间。

29. 【答案】B

【解析】五脏为心、肝、脾、肺、肾，六腑为胃、胆、三焦、膀胱、大肠、小肠，心属火开窍于舌，肝属木开窍于目，脾属土开窍于口，肺属金开窍于鼻，肾属水开窍于耳。

30. 【答案】A

【解析】含有红细胞的血液制品需要进行血型鉴定和交叉配血以保证用血安全。

31. 【答案】B

【解析】胰液中的胰消化酶以酶原形式存在，随胰液分泌至肠道后被肠激酶激活，首先被激活为胰蛋白酶原。

32. 【答案】A

【解析】慢性肺源性心脏病（简称慢性肺心病）是由于支气管、肺、胸廓或肺血管慢性病变所致的肺循环阻力增加、肺动脉高压，缺氧是形成肺动脉高压的最重要因素。长期肺循环阻力增加，右心负担加重，开始发生右心室代偿性肥厚。随着病情发展，肺动脉压进一步增高，超过右心室的负荷时，右心室扩张，最后导致右心衰竭。呼吸衰竭和右心衰竭共性特点都是呼吸困难加重。

33. 【答案】D

【解析】再生障碍性贫血是因骨髓造血功能低下引起。

34. 【答案】A

【解析】非语言沟通具有真实性、广泛性、持续性、情景性等特点。

35. 【答案】C

36. 【答案】B

【解析】导泻可选用乳果糖。乳果糖不仅具有轻泻作用，且在肠道内可被肠菌分解为乳酸和醋酸，酸化肠腔。当结肠内 pH>6 时，NH₃ 大量弥散入血；pH<6 时，则以 NH₄⁺ 的形式从血液转至肠腔，随粪便排出。从而减少肠道氨的形成及吸收。

37. 【答案】D

38. 【答案】A

39. 【答案】D

40. 【答案】C

【解析】人的体温 24 小时内变动大约在 0.5~1℃ 之间，一般清晨 2~6 时体温最低，下午 14~20 时最高。

41. 【答案】D

【解析】门诊护士应注意观察候诊病人的病情变化，当患者出现高热、剧痛、呼吸困难、出血、休克等状况时，应立即安排患者提前就诊或送急诊处理；对病情较重或年老体弱的患者，可适当调整就诊顺序，让其提早就诊。

42. 【答案】A

【解析】第二产程（胎儿娩出期）是从宫颈口开全到胎儿娩出。初产妇需 1~2 小时，经产妇约几分钟至 1 小时。

43. 【答案】E

【解析】子宫全切术在下腹部，通过采取半坐卧位，可减轻腹部切口缝合处的张力，避免疼痛，有利于切口愈合。

44. 【答案】B

45. 【答案】E

46. 【答案】D

【解析】痔是直肠下段黏膜下和肛管皮肤下的静脉丛淤血、扩张和迂曲所形成的静脉团；肛周周围脓肿呈持续性跳痛，局部红肿、触痛，脓肿形成后可有波动感。肛瘘是肛管或直肠远端与肛周皮肤间形成的慢性感染性瘘管，瘘口经常有脓液排出。

47. 【答案】A

【解析】约束带过紧会导致肢体远端血液循环障碍，故使用时应经常观察约束部位的皮肤颜色和感觉皮肤的温度，判断肢体远端的血液循环。

48. 【答案】C

【解析】因患者为乙肝大三阳，故处于传染期，须对其采取隔离，病房为污染区，病区走廊

为半污染区，值班室为清洁区，若隔离衣脱下后应挂在走廊清洁面朝外，或挂在病室清洁面朝内，绝对不应该带入清洁区（值班室、办公室等）。

49. 【答案】E

50. 【答案】E

51. 【答案】C

【解析】由于磺胺类药物易在尿液中形成结晶而析出沉积，造成肾功能损害，所以患者在服用磺胺类药物后应鼓励其多饮水，减少磺胺结晶形成，保护肾功能。

52. 【答案】C

【解析】为患者脱衣服时，应先近侧后对侧；如有外伤，先健肢后患肢。

53. 【答案】E

【解析】危重或呼吸微弱的患者，呼吸不易观察，可用少许棉花置于患者鼻孔前，观察棉花被吹动次数，计数1分钟。

54. 【答案】C

【解析】发热可分为低热（37.3~38.0℃）、中等热（38.1~39.0℃）、高热（39.1~41.0℃）与超高热（41.0℃以上）等。

55. 【答案】C

【解析】超声心动图是主要诊断手段，无论对梗阻性与非梗阻性的诊断都有帮助。

56. 【答案】E

57. 【答案】E

【解析】切口疝是指腹腔内器官或组织自腹壁手术切口突出形成的疝，腹内压过高，切口愈合不良，手术操作不当等都是引起切口疝的原因。患者曾有过切口裂开，故易发生切口疝。

58. 【答案】E

【解析】经腹全子宫切除术，术前1日用碘伏溶液冲洗阴道2次，动作尽量轻柔，以防宫颈出血。

59. 【答案】B

【解析】静脉注射碳酸氢钠碱化尿液，防止或减少血红蛋白结晶阻塞肾小管。

60. 【答案】B

61. 【答案】B

【解析】呼吸机辅助呼吸时，如过度通气可引起呼吸性碱中毒，钙离子浓度降低，患者表现有呼吸急促，可有眩晕、肌震颤，手足抽搐，心率加快，甚至昏迷等。

62. 【答案】C

【解析】高热患儿应给予物理降温，冰槽、冰帽主要用于头部降温，防止脑水肿，乙醇拭浴和温水拭浴不宜用于血液病患儿。

63. 【答案】B

【解析】乙醇拭浴时应调节室温至舒适程度，即21~24℃，将冰袋置于患者头部以利降温，并防止头痛；将热水袋置于足底，使患者感觉舒适，并扩张足底血管，有利于散热。擦拭以四肢和背部为主，禁擦心前区、腹部和后颈以及足底部，并于擦拭后30分钟测体温评估降温效果。擦拭中注意观察患者反应，发现异常及时停止。

64. 【答案】B

【解析】退热期其特点为散热大于产热。患者大量出汗，体液丧失，年老体弱及心血管病患者易出现虚脱或休克现象。

65. 【答案】B

66. 【答案】D

【解析】手术治疗是治疗下肢静脉曲张根本的有效方法，凡深静脉通畅，无手术禁忌症的病

人均可手术治疗。

67. 【答案】D

【解析】化疗前准确测量并记录体重，以准确计算和调整药量，一般在每个疗程的用药前和用药中各测量一次体重，应在早上、空腹、排便后测量，酌情减去衣服重量。

68. 【答案】B

【解析】PTC是在X线监视或B超监视下，用细针经皮肤穿刺将导管送入肝胆管内，注入造影剂使肝内外胆管迅速显影的检查方法。PTC为有创检查，可发生胆瘘、出血、胆道感染等并发症，以出血最常见。

69. 【答案】C

【解析】灭鼠药磷化锌中毒可用1:15 000~1:20 000高锰酸钾或0.5%硫酸铜洗胃。0.5%~1%硫酸铜溶液10 mL/次，每5~10分钟口服一次，配合用压舌板等刺激舌根引吐。磷化锌易溶于油类，应忌用鸡蛋、牛奶、脂肪及其他油类食物，以免加速磷的溶解，加速其吸收，加重中毒症状。选项中0.02%高锰酸钾是1:5 000的，一般用于坐浴或冲洗。

70. 【答案】C

【解析】护患关系工作期的主要任务是运用护理程序的工作方法，对患者进行身心整体护理。

71. 【答案】A

【解析】急性血源性骨髓炎病人病后至少2周X线才有特殊表现。

72. 【答案】A

【解析】测物质含量如血糖、血氨、尿素氮、血沉等采用的是全血标本。为防止血液凝固应加入抗凝剂。

73. 【答案】A

【解析】考查股静脉穿刺部位定位。股静脉穿刺部位在股三角区，髂前上棘和耻骨结节连线的中点为股动脉，股动脉内侧0.5 cm处为股静脉。

74. 【答案】B

【解析】在换药过程中为了使患者免受感染，避免护士被血液体液伤害，维护自身的执业安全，使用手套是护士的基本权利。

75. 【答案】B

【解析】脑疝由急剧的颅内压增高造成，处理原则为快速静脉输注高渗脱水剂降颅内压药物以缓解病情，争取时间。

76. 【答案】E

【解析】患者面对恶性肿瘤对生命的威胁以及不确定的疾病预后，还有对形象受损的担心等使得患者产生焦虑、恐惧的心理，护士应该多了解和关心病人，鼓励病人表达对疾病及手术的担心，使其能以很好的身体和心理状态迎接手术。

77. 【答案】A

【解析】血吸虫虫卵通过粪便排出，为了提高检出率，故留取全部粪便。

78. 【答案】D

【解析】护士对患者的提问应尽量在患者舒适、无痛时进行，并注意患者的感受，提问应围绕交谈目的进行，而不是数量越多越好。

79. 【答案】C

【解析】留取痰液查找癌细胞，用10%甲醛溶液或95%乙醇固定后送检。

80. 【答案】E

【解析】医疗事故中医疗过失行为责任程度依次分为完全责任、主要责任、同等责任、次要责任和轻微责任。本题护士在发现患者突发腹痛的情况后应立即报告值班医生，而该护士并没有这样做，造成患者病情恶化。该护士应承担完全责任。

81. 【答案】D

【解析】高锰酸钾适用于氰化物、敌敌畏、敌百虫、安眠药、灭鼠药；禁忌于 1605、1059、4049（乐果）。

82. 【答案】D

【解析】患者有获得全部实情的知情权的权利，也就是知情同意权，患者有权获知有关自己的诊断、治疗和预后的最新信息。

83. 【答案】D

【解析】氧浓度和氧流量的换算公式：吸氧浓度(%)=21+4×氧流量(L/min)，患者确诊为急性呼吸窘迫综合征，给予面罩吸氧。吸氧浓度要求是 53%，计算：需将氧流量(L/min)调至=(53-21) /4=8(L/min)。

84. 【答案】E

【解析】成人负压一般为 40.0~53.3 kPa，小儿应小于 40 kPa。不可随意加大负压以免造成患者损伤。

85. 【答案】C

【解析】肺部手术后，鼓励病人深呼吸，有效咳嗽，不易咳痰者协助病人排痰，鼓励病人早日下床活动以防肺不张。

86. 【答案】A

【解析】特殊干涉权是指在特殊情况下，用来限制病人的自主权利以达到完成护士应对病人尽义务的目的。保护患者安全是护士的义务，但此时患者的病情有可能伤人及自伤，护士采用约束是为了通过限制患者的自主权来保护患者的安全。

87. 【答案】A

【解析】p. o. 的意思是口服，h. s. 的意思是临睡前。常犯的错误是把临睡前和每晚 1 次混淆，每晚 1 次的缩写是 q. n.，不是 h. s.。

88. 【答案】C

【解析】口服铁剂时应注意：①从小量开始逐渐增至全量，于两餐之间服药，减少对胃黏膜的刺激；②可与稀盐酸和/或维生素 C、果汁等同服，以利于铁的吸收；③不宜与牛乳、茶、钙片、咖啡同服，以免影响其吸收；④服用液体铁剂时可用吸管服药或服药后漱口，以防牙齿被染黑；⑤服用铁剂后，大便呈黑色，这是由于未被吸收的铁随大便排出所致，停药后恢复，应向患者及家属说明原因。

89. 【答案】C

【解析】使用中如发现水槽内水温超过 50℃，须关闭超声雾化器换冷蒸馏水。

90. 【答案】B

91. 【答案】D

【解析】头孢菌素皮试结果阳性，若医生仍坚持用药，护士应做对照实验，进行两侧对比，根据对比结果决定进一步措施。

92. 【答案】C

【解析】需 24 小时连续输液者，应每天更换输液器，注意保持输液器和药液的无菌状态。

93. 【答案】E

【解析】空气栓塞表现为胸部异常不适或胸骨后痛，随即出现呼吸困难、严重发绀，伴濒死感，心前区听诊可闻及响亮的、持续的“水泡声”。发生空气栓塞的患者应安置左侧卧位并头低足高位，目的是使进入血液的气泡停留在右心室顶部，避免气泡堵塞肺动脉入口，造成机体严重缺氧。

94. 【答案】D

【解析】大量输血时，如患者的肝功能不全，枸橼酸钠未完全氧化，与血中的游离钙结合使

血钙浓度下降，表现为手足抽搐、出血倾向、血压下降、心率缓慢甚至心搏骤停。

95. 【答案】D

【解析】COPD 典型的临床表现为气流受限不完全可逆，呈进行性发展。

96. 【答案】A

【解析】妊娠试验留晨尿，晨尿中的人绒毛膜促性腺激素的含量高，容易获得阳性检验结果。

97. 【答案】D

【解析】代谢性酸中毒的患者出现的呼吸是一种深而规则的呼吸，称为深度呼吸（库斯莫呼吸）。

98. 【答案】B

【解析】氧浓度高于 60%，持续时间超过 24 小时，则会发生氧中毒，患者表现为恶心、烦躁不安、面色苍白、干咳、胸痛、进行性呼吸困难等。

99. 【答案】D

【解析】肺泡通气量 = (潮气量 - 无效腔气量) × 呼吸频率 = (0.5 - 0.15) × 14 = 4.9 L/min。

100. 【答案】C

【解析】吸痰时动作应轻柔，左右旋转，向上提拉。每次吸痰时间不超过 15 秒，如吸痰动作过于粗暴，易损伤气管内壁。

101. 【答案】B

【解析】稽留热是指持续高热，日差小于 1℃。常见于肺炎球菌性肺炎、伤寒。

102. 【答案】D

103. 【答案】B

【解析】高热持续期出现面色潮红、皮肤灼热、口唇干燥、呼吸深快等症状。

104. 【答案】E

105. 【答案】A

106. 【答案】E

【解析】蛛网膜下腔出血起病急骤，青壮年多见，常在活动或情绪激动中突然发病，表现为剧烈头痛、喷射性呕吐，脑膜刺激征阳性，一般无肢体瘫痪。

107. 【答案】D

【解析】蛛网膜下腔出血病人应绝对卧床 4 周，限制探视，一切护理操作均应轻柔，并头置冰袋防止继续脑出血。

108. 【答案】B

109. 【答案】A

110. 【答案】C

111. 【答案】D

112. 【答案】B

113. 【答案】A

114. 【答案】C

115. 【答案】D

116. 【答案】C

117. 【答案】D

118. 【答案】A

【解析】该患者大量出血，已有休克征象，应补充血容量，增加有效循环血量，增加心排血量，提高血压，促进血液循环。

119. 【答案】B

【解析】皮下注射注射的部位：上臂三角肌下缘、腹部、后背、大腿前侧及外侧。其操作方

法：①护士洗手，戴口罩，核对医嘱，查对药物；②备齐用物，携至床旁，核对患者；③协助患者取舒适体位，选择注射部位，常规消毒皮肤，待干；④再次查对，检查排尽空气；⑤左手绷紧皮肤，右手持注射器，示指固定针栓，针头斜面向上，与皮肤成 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 角迅速刺入皮内；⑥放开绷紧皮肤的左手，抽吸无回血，即可缓慢注射药液。

120. 【答案】C

【解析】患者于输液过程中突然咳嗽、呼吸困难、气促、咯粉红色泡沫样痰，此为急性肺水肿的典型表现，应考虑因循环血容量急剧增加，心脏负荷过重而引起急性肺水肿。

实践能力-答案及解析

1. 【答案】B

2. 【答案】C

【解析】各种类型肠梗阻的共有临床表现主要有“痛”“吐”“胀”“闭”，高位小肠梗阻主要表现为腹痛，频繁呕吐，呕吐物为胃内容物，腹胀不明显；低位小肠梗阻主要表现为腹痛，脐周高度腹胀，早期呕吐不明显，后期可出现溢出性呕吐，为肠内容物；结肠梗阻除腹痛外主要表现为腹周边性腹胀。

3. 【答案】C

4. 【答案】C

【解析】生长抑素及其类似物奥曲肽通过直接抑制胰腺外分泌而发挥作用， H_2 受体拮抗剂和质子泵抑制剂可通过抑制胃酸分泌而间接抑制胰腺分泌。

5. 【答案】C

【解析】二尖瓣关闭不全及主动脉瓣关闭不全引起左心室容量负荷过重，主动脉瓣狭窄引起左心室压力负荷过重，肺动脉瓣狭窄引起右心室压力负荷过重，二尖瓣狭窄引起左心房压力负荷过重。

6. 【答案】B

【解析】由于肥厚型心肌病，左心室流出道梗阻，使心排血量骤然下降，引起猝死。

7. 【答案】E

【解析】肝性脑病伴有肾脏损害的患者在药物使用时需保护肝、肾功能，避免使用对肝、肾功能有损害的药物，氨基糖苷类抗生素（如新霉素、卡那霉素、庆大霉素等）对肾功能损害较大，氨苄西林在肝肾功能有损害时应避免使用，甲硝唑对肝肾功能影响较小，可以使用。

8. 【答案】B

9. 【答案】B

【解析】流行性脑脊髓膜炎简称流脑，是由脑膜炎奈瑟菌（又称脑膜炎球菌）引起的急性化脓性脑膜炎。脑膜炎球菌入血发生脓毒症时临床表现为突发高热、头痛、呕吐等毒血症状。70%~90%患者有皮疹，先为玫瑰疹，迅速发展为瘀点、瘀斑， $1\sim 2\text{ mm}$ 至 $1\sim 2\text{ cm}$ 大小，渐成为暗紫色大疱坏死。皮肤黏膜瘀点、瘀斑为特征性表现。

10. 【答案】C

11. 【答案】D

【解析】肺心病并发呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是发绀，当动脉血氧饱和度低于90%时，口唇、甲床等处发绀较为明显；另应注意，发绀的程度与还原型血红蛋白含量相关。

12. 【答案】E

【解析】流行性乙型脑炎极期最严重的三种症状是高热、惊厥、呼吸衰竭。

13. 【答案】A

【解析】对艾滋病病毒感染者，预防、医疗、保健机构无权对患者进行身体约束。

14. 【答案】D

【解析】在心脏 X 线表现中梨型心提示二尖瓣狭窄，靴型心提示主动脉瓣关闭不全，烧瓶心提示心包积液。

15. 【答案】B

【解析】烧伤深度一般采用三度四分法，其损伤深度分别是 I 度烧伤伤及表皮角质层，浅 II 度烧伤伤及真皮浅层（乳头层），深 II 度烧伤伤及真皮深层，III 度烧伤伤及皮肤全层、肌肉甚至骨骼。该患者创面有大小不等的水疱，剧烈疼痛，提示浅 II 度烧伤，浅 II 度烧伤伤及皮肤的层次为真皮乳头层。

16. 【答案】E

【解析】闭式胸膜腔引流搬运病人时水封瓶应低于胸腔引流口，其余均正确。

17. 【答案】C

【解析】2 级高血压病患者健康教育主要通过改善生活方式，调整饮食来进行。

18. 【答案】C

【解析】诊断葡萄胎最重要的辅助检查是 B 超检查，呈“落雪状”“蜂窝状”影像。

19. 【答案】E

【解析】心室颤动是最危急的心律失常，是导致心源性猝死的常见原因。心室颤动时心室内心肌纤维发生快而微弱的不协调的乱颤，属于心搏骤停的一种类型，患者可有意识丧失、大动脉搏动消失，在查体时触摸不到脉搏。

20. 【答案】D

【解析】中暑高热时，最合适的低压灌肠溶液为 4℃ 葡萄糖盐水。

21. 【答案】A

22. 【答案】E

23. 【答案】B

【解析】阿尔茨海默病的病情不可逆。

24. 【答案】D

【解析】支气管扩张症患者在施行体位引流时引流时间 20~30 分钟。

25. 【答案】C

【解析】葡萄胎患者恶心、呕吐等早孕反应常比一般的重。

26. 【答案】B

27. 【答案】B

28. 【答案】B

29. 【答案】E

【解析】避孕药中的孕激素干扰了雌激素效应，抑制子宫内膜增殖，并使腺体及间质提早发生分泌期变化，子宫内膜呈现分泌不良，不利于孕卵着床。

30. 【答案】D

31. 【答案】C

32. 【答案】B

【解析】风湿性心脏病常见的并发症有心力衰竭、心律失常、栓塞、感染性心内膜炎等。此患者住院时突然出现偏瘫、头痛，为并发脑栓塞的表现。

33. 【答案】A

【解析】肝硬化时由于雌激素灭活减少导致血液中雌激素含量增多，出现蜘蛛痣和肝掌，而蜘蛛痣分布于上腔静脉区域。

34. 【答案】C

【解析】嵌顿性疝进一步发展使疝内容物动脉血流减少，最后导致完全阻断，即为绞窄性疝，出现压痛，肌紧张等腹膜刺激症状，提示疝内容物缺血坏死，需及时手术处理。

35. 【答案】E

【解析】患者发生幽门梗阻，应暂禁食，不应洗胃。

36. 【答案】C

【解析】小儿腹泻时常有不同程度的水、电解质和酸碱平衡紊乱，如脱水、代谢性酸中毒、低钾血症、低钙血症等。低钾血症时有精神萎靡、四肢无力、腹胀、肠鸣音减弱等神经、肌肉兴奋性降低表现。

37. 【答案】A

【解析】关节脱位后应首选手法复位固定。

38. 【答案】D

【解析】考虑为新生儿硬肿症，首优护理问题是体温过低，复温是治疗护理的关键措施。

39. 【答案】A

【解析】甲基硫氧嘧啶作用机制是：抑制甲状腺过氧化物酶，阻断甲状腺激素合成，具有一定的免疫抑制作用。

40. 【答案】D

【解析】面部“危险三角区”的疔受到挤压时，感染可沿眼静脉和内眦静脉向颅内扩散，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现眼部及周围组织的红肿和疼痛，并有寒战、高热、头痛、呕吐，甚至昏迷，死亡率很高。

41. 【答案】E

【解析】患者阑尾切除术后发生了麻痹性肠梗阻，应行胃肠减压及支持疗法。

42. 【答案】B

【解析】患者有胆道感染史，胆道化脓性感染可引起肝脓肿。

43. 【答案】D

44. 【答案】C

【解析】急性胰腺炎患者使用胃肠减压时可减少胃液对胰腺的刺激，从而减少胰液分泌。

45. 【答案】D

46. 【答案】C

47. 【答案】B

48. 【答案】B

【解析】甲状腺手术时损伤一侧喉返神经，引起声音嘶哑；损伤两侧喉返神经则导致两侧声带麻痹，引起失声；损伤喉上神经外支，可使环甲肌瘫痪，引起声带松弛、声调降低。

49. 【答案】B

【解析】肠道准备是大肠癌术前护理的重点，传统方法是术前3日进少渣半流食（术前2日起进流食）、口服肠道抗菌药物（如卡那霉素、新霉素、链霉素及甲硝唑等）、口服或肌内注射维生素K、每日番泻叶15g泡茶500mL饮用；术前1日晚及术日晨清洁灌肠。

50. 【答案】C

【解析】行肾癌根治性切除术后，由于手术切除了肾脏、肾上腺、肾周围脂肪及肾门淋巴结，故手术创面大，渗血可能较多。

51. 【答案】A

【解析】胆汁引流量一般每天300~700mL，量少可能因T形管堵塞或肝衰竭所致，量多可能是胆总管下端不够通畅。

52. 【答案】A

【解析】类风湿性关节炎病人急性发作时应卧床休息，病情缓解后应加强功能锻炼，防止出

现肢体功能残疾。

53. 【答案】B

【解析】该患者有明显颅内压增高，躁动不安时切忌强制约束，以免挣扎导致颅内压增高。

54. 【答案】B

【解析】艾滋病抗病毒治疗能最大限度地抑制艾滋病毒复制，但不能根除病毒，尽可能使患者的免疫功能得以保存，不被继续破坏，降低艾滋病的发病率和死亡率，减少各种机会性感染和肿瘤的发生率，延长患者生命，提高生活质量。

55. 【答案】B

【解析】粪便镜检发现大量脓细胞或红细胞即可确定为细菌性菌痢，无便时可行肛拭子或盐水灌肠取便镜检。

56. 【答案】C

【解析】利福平可出现黄疸、转氨酶一过性升高及过敏反应；链霉素可出现听神经损伤和肾功能损害；异烟肼可有周围神经炎、中毒反应和皮疹、避免与抗酸药物同用；乙胺丁醇可引起球后视神经炎，应注意观察患者视力和颜色分辨率；吡嗪酰胺除导致胃肠道不适、肝功能损坏外，还可导致高尿酸血症；对氨基水杨酸钠可有胃肠道刺激、变态反应。

57. 【答案】D

58. 【答案】E

59. 【答案】B

60. 【答案】B

【解析】胆瘘多发生于术后5~10日，表现为发热、腹痛及胆汁性腹膜炎症状，T管引流量突然减少，沿腹腔引流管或腹壁伤口溢出胆汁样液体。

61. 【答案】A

【解析】患儿烦躁不安，气促，口唇发绀，P180次/min，肺部可闻及较多细湿啰音，心音低钝，肝肋下3cm等都提示心力衰竭，护士应及时报告医生，减少各种刺激，给患儿取半卧位，给氧，协助用药，并减慢输液速度，备好抢救用品。

62. 【答案】B

【解析】胰岛素适用于：①1型糖尿病；②2型糖尿病急性并发症；③对口服降糖药无效的2型糖尿病；④糖尿病合并应激及其他情况：手术、妊娠、分娩、严重感染等。

63. 【答案】E

【解析】人工流产并发症：子宫穿孔，多见于哺乳期子宫、瘢痕子宫和畸形子宫。需立即停止手术，给予缩宫素和抗生素，严密观察生命体征，有无腹痛、阴道流血及腹腔内出血征象。

64. 【答案】B

【解析】2岁小儿头围48cm。

65. 【答案】B

66. 【答案】B

【解析】肾性水肿主要分为两大类：①肾炎性水肿：常见于肾小球肾炎。当肾小球滤过膜受损，肾小球滤过率下降，水、钠滤过减少，而肾小管重吸收功能相对正常，水、钠重吸收相对增多，即球管失衡导致毛细血管静水压增高而出现水肿；②肾病性水肿：见于肾病综合征患者。因长期大量蛋白尿造成低蛋白血症，血浆胶体渗透压降低，体液从血管内进入组织间隙而出现水肿。该患者出现了大量蛋白尿，从而使出现低蛋白血症、血浆胶体渗透压下降，这是水肿的主要原因。

67. 【答案】C

【解析】出现下列情况时应手术探查：①腹痛和腹膜刺激征进行性加重或范围扩大；②肠鸣音逐渐减弱、消失或出现明显腹胀；③全身情况有恶化趋势，出现口渴、烦躁、脉率增快，

或体温及白细胞计数上升；④红细胞计数进行性下降；⑤血压由稳定转为不稳定甚至下降；⑥胃肠道出血不易控制；⑦经积极抗休克治疗后，情况不见好转或继续恶化。

68. 【答案】A

69. 【答案】C

【解析】钾离子随尿液排出体外，肾衰竭体内少尿时钾离子在体内蓄积，可以引起高钾血症，其最严重的后果是导致心脏停搏。

70. 【答案】D

【解析】酒精中毒的意识变化是先兴奋、躁乱，而后转为抑制，并逐渐加深。最后可能会出现昏迷。

71. 【答案】B

【解析】产后2小时需观察血压、脉搏、宫底高度、子宫收缩情况、阴道出血量、膀胱是否充盈、会阴及阴道有无血肿。

72. 【答案】A

73. 【答案】D

【解析】该患儿未烧伤部位为头、面部、颈部及前胸、腹部约8个手掌大的皮肤，其未烧伤面积为 $9\% + (12 - \text{年龄})\% + 8\% = 9\% + (12 - 6)\% + 8\% = 23\%$ ，烧伤面积为 $100\% - 23\% = 77\%$ 。

74. 【答案】D

【解析】低血糖反应表现为疲乏、强烈饥饿感、出冷汗、脉速、恶心、呕吐，重者可致昏迷，甚至死亡。一旦发现低血糖反应，反应轻者，可用白糖以温水冲服，较严重者必须静脉注射50%葡萄糖40 mL。

75. 【答案】A

【解析】清创术应争取在伤后6~8小时内施行。

76. 【答案】D

【解析】骨折患者的锻炼原则是：动静结合、主动被动结合、循序渐进、分期锻炼。

77. 【答案】B

【解析】良性前列腺增生治疗方法包括药物治疗、手术治疗和激光等热疗治疗。而临床上选择治疗方法当然要根据患者全身情况及梗阻程度及前列腺增生部位选择治疗方法。

78. 【答案】B

【解析】膀胱炎最常见致病菌是大肠杆菌，首选氧氟沙星。

79. 【答案】C

【解析】秋水仙碱是治疗急性痛风性关节炎的特效药物。

80. 【答案】A

【解析】颅骨缺损者应避免局部碰撞，以免损伤脑组织，一般在伤后半年左右行颅骨成形术。

81. 【答案】C

【解析】慢阻肺最常见并发症之一是自发性气胸。特别是有肺大泡的病人，当剧烈咳嗽或屏气时，肺泡内压力急剧增加，可致肺大泡或肺泡破裂发生自发性气胸。如病人呼吸困难突然加剧，并伴有明显的胸痛、发绀，听诊时一侧肺呼吸音减弱或消失，叩诊时呈鼓音，应考虑气胸存在。

82. 【答案】E

【解析】化脓性脑膜炎患儿喷射性呕吐、前囟饱满，考虑颅内压增高，应使用利尿药降低颅内压，减少液体入量。

83. 【答案】E

【解析】胃大部切除术后出现倾倒综合征，患者主要通过饮食调整，如少量多餐，避免过甜（蛋糕）、过咸、过浓的流质饮食（豆浆、骨头汤、牛奶等），宜进低碳水化合物、高蛋白饮

食，进餐时限制水和汤，进餐后平卧 10~20 分钟。

84. 【答案】D

【解析】脑疝初期由于患侧动眼神经受到刺激导致患侧瞳孔缩小，对光反射迟钝；随病情发展，患侧动眼神经麻痹，患侧瞳孔逐渐扩大，直接和间接对光反射消失。

85. 【答案】C

【解析】卡马西平可抑制三叉神经的病理性神经反射，是三叉神经痛的首选药。

86. 【答案】C

【解析】根据该患者的病史及临床特点，考虑为大肠癌。大肠癌可分为直肠癌和结肠癌，结肠癌又可分为右半结肠癌和左半结肠癌。直肠癌主要表现为排便习惯改变，黏液血便，直肠指检可触肿块；左半结肠癌的临床表现为肠梗阻、便秘、腹泻便血等症状为主；右半结肠癌的临床表现常以贫血消瘦、腹部肿块为主。因该患者于右下腹触及腹肿块，可排除直肠癌和左半结肠癌。

87. 【答案】D

88. 【答案】D

89. 【答案】A

90. 【答案】D

【解析】青紫型先天性心脏病患儿血液黏稠度高，发热、出汗、吐泻时，体液量减少，加重血液浓缩易形成血栓，因此要注意供给充足液体，必要时可静脉输液。

91. 【答案】C

【解析】子宫脱垂分三度，I 度轻型：宫颈外口距离处女膜缘小于 4 cm，但未达处女膜缘；I 度重型：宫颈已达处女膜缘，但未超出，检查时在阴道口可见宫颈；II 度轻型：宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内；II 度重型：宫颈和部分宫体已脱出阴道口；III 度宫颈和宫体全部脱出阴道口外。

92. 【答案】A

【解析】当患者有间歇性无痛性肉眼血尿时首先考虑泌尿系统肿瘤，而伴有左上腹块时应考虑肾脏肿瘤。肾母细胞瘤多见于小儿，血尿出现迟，可排除；肾盂癌行 X 线造影检查表现为充盈缺损，肾癌表现为肾盂肾盏拉长变形。

93. 【答案】B

【解析】常见症状为劳力性呼吸困难、疲乏、食欲缺乏、上腹胀满或疼痛。可因肺静脉压高而导致症状如咳嗽、活动后气促，可有心绞痛样胸痛。体征有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿、心率增快，可见 Kussmaul 征。患者可能患了缩窄性心包炎。

94. 【答案】B

95. 【答案】A

96. 【答案】A

【解析】疼痛与骨质疏松症有关。

97. 【答案】A

【解析】β 受体阻滞剂的降压作用可能通过 β 受体的阻滞减慢心率、使心排血量减低，以及外周循环顺应性改变以保持外周血流量。此外可以抑制肾素分泌，使血浆肾素活性减低。常见副作用有心动过缓、疲劳、支气管痉挛。

98. 【答案】C

【解析】甲硫咪唑是治疗甲状腺功能亢进症的首选药物，但最严重的不良反应是可导致使用者出现粒细胞缺乏症。粒细胞缺乏症的危害在于可降低患者机体的免疫功能，使其抵御疾病的能力下降，因此甲状腺功能亢进患者易受病原微生物的侵犯而出现发热、咽痛、咳嗽、乏力、下颌下淋巴结肿胀、口腔溃疡以及皮疹、肌肉和关节疼痛等症状。

99. 【答案】C

【解析】患者有十二指肠溃疡病史，现突发上腹疼痛，全腹肌紧张，压痛、反跳痛明显，且血压下降，考虑并发急性穿孔，应立即禁食和胃肠减压，减少胃内容物继续外漏。

100. 【答案】C

【解析】嘌呤是导致血液中尿酸增多的主要物质，因此，痛风患者应该严格控制嘌呤的摄入量。饮食应禁吃或少吃高嘌呤食物，以减少痛风的发作，蔬菜中，应避免食用嘌呤含量较高的蔬菜，如豌豆、菠菜和蘑菇等。

101. 【答案】C

【解析】由于洋地黄类药物具有兴奋迷走神经的作用，使心率减慢，所以服用洋地黄类药物之前需要测脉搏，当患者的脉搏小于60次/min应暂停服药。

102. 【答案】E

【解析】洋地黄中毒的表现包括胃肠道反应，如食欲减退、恶心呕吐等；心脏毒性反应，易致各种心律失常；神经系统反应，如头晕、头痛、视物模糊、黄绿色视等。洋地黄中毒的处理措施包括立即停药、补充钾盐、停用排钾利尿药及应用抗心律失常药物，首要措施是停药。

103. 【答案】A

【解析】因钙剂和洋地黄类药物同时应用可导致洋地黄中毒，在使用洋地黄时应停用钙剂。

104. 【答案】B

【解析】按烧伤面积和烧伤深度将烧伤程度分为4类：①轻度烧伤，Ⅱ度烧伤总面积<10%；②中度烧伤，Ⅱ度烧伤面积在10%~30%，或Ⅲ度烧伤面积<10%；③重度烧伤，烧伤总面积在31%~50%，或Ⅲ度烧伤面积在11%~20%，或Ⅱ度、Ⅲ度烧伤面积未达到上述范围，但合并有休克、吸入性损伤或有较重复合伤者；④特重烧伤，烧伤总面积>50%，或Ⅲ度烧伤面积>20%，或存在较重的吸入性损伤、复合伤等。该患者烧伤面积=头面部(3+3)%+双上肢(18)%=24%。烧伤深度为深Ⅱ度烧伤，故为中度烧伤。

105. 【答案】A

【解析】患者因煤气泄漏爆炸致头面部烧伤，容易合并呼吸道烧伤，因此观察的重点是呼吸功能。

106. 【答案】D

【解析】脓液呈黄绿色伴有恶臭味为铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)感染的特征性表现。

107. 【答案】D

【解析】先兆子宫破裂的临床表现为病理性缩复环、下腹部压痛、胎心率改变及血尿。典型的表现是病理性缩复环。

108. 【答案】D

【解析】胎盘的位置、成熟度、羊水量和双顶径与先兆子宫破裂无明显关系。病理性缩复环、下腹部压痛、胎心率改变及血尿是子宫破裂的先兆，尿常规检查是否有血尿可以作为子宫破裂的辅助检查项目。

109. 【答案】A

110. 【答案】A

【解析】为避免术后疝复发，术前要消除致腹内压升高的因素，对有咳嗽、便秘、排尿困难者应给予对症处理。

111. 【答案】C

112. 【答案】D

113. 【答案】E

114. 【答案】D

115. 【答案】A

116. 【答案】B

【解析】怀疑气胸，首选胸部 X 线检查，由于气体将肺压缩，可见压缩的肺与胸壁间出现透明的含气区，对于肺组织压缩明显的患者，通过胸部正位片很容易做出诊断。其他检查手段不能直接检查出来。

117. 【答案】B

【解析】痰结核菌检查是确诊肺结核最具特异性的检查方法。

118. 【答案】E


【解析】化疗是结核病的关键治疗，护士要向患者及其家人解释化疗的意义和用药时的注意事项，并及时发现药物的不良反应。例如，利福平可出现肝损害；链霉素可出现耳聋和肾功能损害；对氨基水杨酸钠可有胃肠道刺激、变态反应；异烟肼可有周围神经炎、中毒性反应；乙胺丁醇可以出现球后视神经炎。

119. 【答案】A

【解析】长期胃溃疡患者，当出现疼痛节律紊乱、药物治疗无效、食欲减退、呕吐、乏力、消瘦、体重明显下降、呕血和黑便等症状，提示胃癌。

120. 【答案】C

【解析】由于该患者考虑胃溃疡恶变，为明确诊断首选内镜检查。



金英杰医学
JINYINGJIE.COM